




*Sertum Angolense, sive stirpium
quarundam novarum vel ...*

Friedrich Martin Josef Welwitsch





3 2044 106 343 585

FL
62
W46
S



THE
TRANSACTIONS
OF
THE LINNEAN SOCIETY
OF
LONDON.

VOLUME XXVII.
PART THE FIRST.

L O N D O N :
PRINTED BY TAYLOR AND FRANCIS, RED LION COURT, FLEET STREET;
SOLD AT THE SOCIETY'S APARTMENTS, BURLINGTON-HOUSE;
AND BY LONGMANS, GREEN, READER, AND DYER, PATERNOSTER-ROW.

M.DCCC.LXIX.

α

CONTENTS.

PART I.—1869.

<i>Sertum Angolense, sive Stirpium quarundam novarum vel minus cognitarum in itinere per Angolam et Benguelam observatarum Descriptio Iconibus illustrata. Tentavit</i>	
FRIDERICUS WELWITSCH	page 1

21

SERTUM ANGOLENSE,

SIVE

STIRPIUM QUARUNDAM NOVARUM VEL MINUS COGNITARUM

IN ITINERE PER

ANGOLAM ET BENGUELLAM

OBSERVATARUM

DESCRIPTIO ICONIBUS ILLUSTRATA.

TENTAVIT

FRIDERICUS WELWITSCH.

PRÆFATIO.

INTER cunctos orbis terrestres tractus quos circuli æquinoctiales includunt, illi Continentis Africanæ omnium longius scientiæ occulti remanserunt, ac nonnisi nostris temporibus, et quidem non sine perplurimorum peregrinatorum animi fortitudine et audacia prompta pariter ac doctrina et genio insignium sacrificio, scientiæ paullatim paullatimque innotuerunt.

Ingentes tamen ejusdem Continentis plagæ centrales, intra zonam æquinoctialem eis et trans æquatorem extensæ, ad hodiernum usque diem adhuc penitus ignotæ permanent, in mappis imo recentissimis solum latis spatiis vacuis delineatæ, in scientia, inprimis historiam naturalem spectante, hiatibus profundis indigitatæ.

Attamen jam hodie Africæ æquinoctialis terræ litorales plures, nec non penetralia quædam ipsis propiora, tam in orientali quam occidentali vasti continentis plaga sita, scientiæ naturalis scrutinio quodammodo aperta prostant, id quod respectu plagæ orientalis præcipue laboribus curisque celebratorum peregrinatorum Kirk, Speke, et Grant et inprimis Prof. Guilh. Peters debetur, qui Floram atque Faunam terræ Mossambicensis et descriptionibus et iconibus numerosis iisque elegantissimis illustravit.

Terras æquinoctiales in plaga occidentali sitas quod attinet, Guinææ superioris Flora tam explorationibus clar. Chr. Smith, Palisot, Thonning, aliorumque, quam, præcipue tempore ulteriore, conamine et industria nunquam satis laudanda clar. peregrinatorum E. Vogel, Barter, et inprimis G. Mann, saltem pro majore parte, jamjam cognita patet.

Floræ Guinææ inferioris fragmenta quædam colligere mihi tandem licitum fuit, dum Gubernii Lusitani jussu honoratus ejusdemque auxiliis munitus, annis 1854 usque ad 1860 Regni Congo partem, dein Angolam et denique Benguellam perlustravi. Iter hoc meum sat longum fuit ac summopere arduum; sæpius atque sæpius morbis in istis terris endemicis nec non Nigritarum invadentium bellis interruptum, aliis locis imo ipsarum terrarum ob perdurantem nimiam siccitatem desolatione perturbatum, nihilominus, Deo favente, feliciter peractum, non tamen sine gravi valetudinis meæ detrimento absolutum.

Varia hujusce explorationis eventa, inprimis quæ ad Floram Angolensem spectant, jam curis benevolis celeberr. Jos. D. Hooker, G. Bentham, Alph. de Candolle, Dan. Oliver, G. Reichenbach, fil., aliorumque rei herbariæ peritissimorum virorum in lucem edita prostant, et siquidem hæc uti et illa, in posterum edenda, quidquam ad Africæ æquinoctialis historiam naturalem elucidandam contribuunt, hoc omnino Augustissimo Regi Populoque Lusitano debetur, quorum auxilium admodum validum, durante omni itinere mihi præstitum, hic publice et gratissimo animo lætus agnosco.

Inter stirpes novas vel parum cognititas quas ex terris Angolensibus reportavi, non paucae prostant, quæ vel ob florum habitusve totius elegantiam aut singularitatem, vel ob qualitatum suarum in autoethonum colonorumque vita quotidiana et sanandis morbis præstantiam, vel denique respectu earum distributionis geographicæ præ ceteris notabiles, illustratione iconographica satis dignæ videbantur.

PRÆFATIO.

INTER cunctos orbis terrestres tractus quos circuli æquinoctiales includunt, illi Continentis Africanæ omnium longius scientiæ occulti remanserunt, ac nonnisi nostris temporibus, et quidem non sine perplurimorum peregrinatorum animi fortitudinæ et audacia prompta pariter ac doctrina et genio insignium sacrificio, scientiæ paullatim paullatimque innotuerunt.

Ingentes tamen ejusdem Continentis plagæ centrales, intra zonam æquinoctialem cis et trans æquatorem extensæ, ad hodiernum usque diem adhuc penitus ignotæ permanent, in mappis imo recentissimis solum latis spatiis vacuis delineatæ, in scientia, inprimis historiam naturalem spectante, hiatibus profundis indigitatæ.

Attamen jam hodie Africæ æquinoctialis terræ litorales plures, nec non penetralia quædam ipsis propiora, tam in orientali quam occidentali vasti continentis plaga sita, scientiæ naturalis scrutinio quodammodo aperta prostant, id quod respectu plagæ orientalis præcipue laboribus curisque celebratorum peregrinatorum Kirk, Speke, et Grant et inprimis Prof. Guilh. Peters debetur, qui Floram atque Faunam terræ Mossambicensis et descriptionibus et iconibus numerosis iisque elegantissimis illustravit.

Terras æquinoctiales in plaga occidentali sitas quod attinet, Guinææ superioris Flora tam explorationibus clar. Chr. Smith, Palisot, Thonning, aliorumque, quam, præcipue tempore ulteriore, conamine et industria nunquam satis laudanda clar. peregrinatorum E. Vogel, Barter, et inprimis G. Mann, saltem pro majore parte, jamjam cognita patet.

Floræ Guinææ inferioris fragmenta quædam colligere mihi tandem licitum fuit, dum Gubernii Lusitani jussu honoratus ejusdemque auxiliis munitus, annis 1854 usque ad 1860 Regni Congo partem, dein *Angolam* et denique *Benguellam* perlustravi. Iter hoc meum sat longum fuit ac summopere arduum; sæpius atque sæpius morbis in istis terris endemicis nec non Nigritarum invadentium bellis interruptum, aliis locis imo ipsarum terrarum ob perdurantem nimiam siccitatem desolatione perturbatum, nihilominus, Deo favente, feliciter peractum, non tamen sine gravi valetudinis meæ detrimento absolutum.

Varia hujusce explorationis eventa, inprimis quæ ad Floram Angolensem spectant, jam curis benevolis celeberr. Jos. D. Hooker, G. Bentham, Alph. de Candolle, Dan. Oliver, G. Reichenbach, fil., aliorumque rei herbariæ peritissimorum virorum in lucem edita prostant, et siquidem hæc uti et illa, in posterum edenda, quidquam ad Africæ æquinoctialis historiam naturalem elucidandam contribuunt, hoc omnino Augustissimo Regi Populoque Lusitano debetur, quorum auxilium admodum validum, durante omni itinere mihi præstitum, hic publice et gratissimo animo lætus agnosco.

Inter stirpes novas vel parum cognitatas quas ex terris Angolensibus reportavi, non paucae prostant, quæ vel ob florum habitusve totius elegantiam aut singularitatem, vel ob qualitatum suarum in autochthonum colonorumque vita quotidiana et sanandis morbis præstantiam, vel denique respectu earum distributionis geographicæ præ ceteris notabiles, illustratione iconographica satis dignæ videbantur.

Hunc in finem proinde earum plurium icones analyticas delineandas curavi et descriptiones uberiores elaboravi, quas hodie sub *Serti Angolensis* titulo Floræ Africanæ fautoribus offero, scriptuli mei imperfectionum nequaquam immemor, simulque magnopere deplorans, ejusdem absolutionem et crebris valetudinis meæ vicissitudinibus aliisque vitæ eventis omnino inopinatis longius retardatam fuisse.

Priusquam autem ad ipsarum stirpium descriptionem progredior, pauca quedam, sed non levioris momenti, præmonenda habeo, quæ inprimis circa Regni Angolensis situm, extensionem et divisionem, ejusdemque territorii in variis latitudinis gradibus variam supra mare elevationem versantur, quibus denique notulas breves, præcipue de montium fluviorumque directione et indole, nec non de temporum imbriumque introitu et decursu agentes, addere liceat, ut quæ infra de specierum singularum stationibus vel habitationibus narranda sunt, melius intelligantur.

Nomine "*Provincia Angola*" sensu generali sumpto, *Lusitani* omnem illum immensum terrarum tractum, ab ipsis olim detectum eorumque nunc dominio subjectum comprehendunt, qui in Africæ tropicæ transæquatorialis plaga occidentali inter 5° 12' et 18° lat. austr.* sese extendit, et penetralia dicti continentis nunc ad 200, nunc fere ad 350 mil. geogr. petit, limitibus tamen his orientem versus necdum ubique rite constitutis.

Vastissimum hocce territorium juxta Oceani Atlantici oram orientalem per tredecim fere latitudinis gradus extensum, quatuor illa antiqua Nigritarum regna, *Loango*, *Congo*, *Angola* et *Benguella* dicta amplectitur, quæ cuncta olim unita regique potentissimo "*Mani-Congo*" appellato subjecta, nomine communi "*Congo*" designabantur †. Postea autem, et quidem jam a seculo XV.‡ ad hodiernum diem usque hic idem terrarum tractus apud geographos et in mappis plurimis nomine "*Guinea inferior*," et apud historiographos Lusitanos "*Guiné Portuguez*," i. e. *Guinea Lusitana*, designatus invenitur, nominibus tamen antiquis pro singulis regnis nihilominus conservatis.

Antiqui regni "*Loango*" Lusitani hodierni solummodo partem meridiionalem inter flumina "*Cacondo*" et "*Zaire*" sitam, in mappa supra citata sub denominatione "*Districto de Cabinda*" indicatam, sibi vindicant, quam, cum illam perlustrare non mihi licuit, hoc loco obiter commemoratam prætermitto.

Regnum *Congo*, sensu hodierno sumptum, ad septentrionem flumine *Zaire*, ad austrum flumine *Loge*, a quibusdam geographis perperam "*Ambriez*" nuncupato, limitatur. *Angola* proprie sic dicta inter flumina *Loge* et *Cuanza* comprehenditur, dum *Benguella* a sinistris ripis ejusdem fluminis *Cuanza* ad flumen *Cunene* et quidquam ultra sese extendit, territorium *Benguellense*, sensu strictiore sic denominatum, simulque ad meridiem terras *Mossamedenses*, continentis interiora orientem versus late longeque pervagantes, includens. Secundum fluviorum indicatorum variam inter se quoad eorum ostia distantiam, etiam cujusvis adductorum regnorum extensionem litoralem variare obvium est, sique territorii

* Conf. Mappam nitide delineatam nuper Olissipone editam sub titulo: "*Angola, mappa coordenado pelo Visconde de Sá de Bandeira*, Tenente general, Ministro da Guerra, e por *Fernando da Costa Lual*, Tenente Coronel, Governador de Mossamedes. Lisboa 1864. Fol. sing. max.

† Conf. *Cavazzi* ap. *Labat* (T. I. pag. 21), & *Demaret*, Nouvelle histoire de l'Afrique etc. Paris, 1767, vol. i. pag. 13.

‡ Inter Lusitanie reges qui primus titulum "*Senhor de Guiné*" id est, *Guineæ dominus*, assumpsit, fuit Dom João II.; Conf. *De Barros* Asia, Dec. 1. Lib. III. Cap. 3, nec non *Lopes de Lima*, Ensaio sobre a statistica, etc., Lib. III. pag. v.

Congo litus circiter a 6° 10' ad 7° 50', illud Angolæ a 7° 50' ad 9° 20', Benguellæ demum ab hoc ultimo ad 18° lat. austr. usque sese extendit.

Præter flumina supra notata, non pauca alia, in longinquis penetralium terris nascentia, Oceanum Atlanticum petunt, inter quæ in Congo flumina *Lilundo* et *Ambrige*, in Angola, *Lifune*, *Dande* et *Bengo*, in Benguella denique *Curo*, *Cutumbella* et *Bero* notabiliora sunt, permultis aliis minoribus rivisque innumeris hic prætermisiss, quæ, etiamsi durante pluviarum periodo non raro sat profunda ac dilatata, hiberno tamen tempore (i. e. imbribus omnino carente) vix aquis suis oceanum attingunt, sed versus eorum ostia, arenis ardentibus absorpta sensim sensimque disparent, vel ad stagna hinc inde in lacus extensa ab oceano vicino arena accumulata separata restringuntur.

Totius hujus territorii limites occidentales sive oceanici vel planitiibus formantur nunc angustioribus arenosis suaviter undulatis, nunc latius versus terras internas extensis, hinc inde limosis aut paludosis, vel rarius collibus rupestribus clivisve abruptis, ad 100–300 ped. elevatis, quorum cacumina sæpius horizontaliter truncata, præsertim juxta litora Benguellæ australioris frequenter obvia, et jam a primis navigatoribus Lusitanis apte cum mensis comparata, illis litoribus aspectum admodum peculiarem impertiunt, simulque vegetatione peculiari, sparsa quidem sed admodum distincta, arborum pygmæarum ornantur, inter quas *Vitis macropus* et *Bainesii*, *Pachypodium Lealii*, *Sesamothamnus Benguellensis* et *Welwitschia mirabilis* maxime notabiles.

Orientem versus omne territorium ab ora maritima per gradus ad terras internas modo suavis modo abruptius ascendit, montium catenis nempe pluribus, a Lusitanis "*Serras*" sive "*Morros*" nuncupatis, interiora versus gradatim altioribus percurritur, quarum summa juga in Angolæ penetralibus ad 4000, in Benguellæ interioribus ad circiter 6000 ped. elewantur. In universum hæc montium series a septentrione austrum versus decurrunt, latere suo orientali sensim ad radices catenæ sequentis ascendentes, dum contra latere occidentali, oceanum spectante, plerumque abruptius descendunt, unde facile perspicitur quamobrem rivi plurimi et flumina fere omnia nonnisi cataractis pluries repetitis præcipitata, ex terris interioribus in regiones inferiores profluunt. Attamen harum catenarum decursus nequaquam semper continuus, neque ubique directionem supra indicatam sequitur, sed in variis locis illarum una alterave vel omnes magis versus orientem retrocedunt, uti prope urbem "*Loanda*," dum aliis locis litori propiores emergunt, uti hoc pone urbem "*Benguella*" observatur; hinc etiam catenarum singularum inter se distantia, montiumque quibus componuntur amplitudo magnopere variant, etiamsi generaliter et catenæ ipsæ et montes singuli versus territorii interiora sensim ampliores. Catenæ singulæ rarius insigniter deprimuntur, sed frequentius montibus disjunctis variæ altitudinis interceptæ vel aliis locis jugorum transversorum ope cum proxima interiore serie conjunctæ sunt vel etiam vallibus angustis plus minusve profundis, tempore pluviarum totidem torrentium alveis, persulcatæ. Seriei interioris juga excelsiora, quæ in Benguella jam ad 80–100 mil. geog. a litore distantiam eminent, in Angola autem nonnisi 150–180 mil. intervallo ab oceano divisa surgere incipiunt, pluribus in locis in planities undulatas deplanata inveniuntur, ex quibus dein iterum vel monticuli disjuncti, obtuse aut acutius conici, non raro ad summum usque cacumen silvis fruticetisque ornati, prominent, uti e. g. in Districtu *Huilla*, vel rupes ingentes,

parietibus fere perpendiculariter erectis, nunc vegetatione denudatis nunc fruticulorum variorum viriditate vestitis, columnarum angularum ad instar repentius surgunt, quemadmodum hoc in Districtu *Pungo-Andongo* observare licet, ubi petrae gigantæ undique præruptæ, a colonis nomine "*Pedras negras*" dictæ, nec non aliæ, circiter 15 mil. geog. orientem versus ab his distantes "*Pedras de Guinga*" nuncupatæ, et quoad aspectum non minus singulares, vallem fluminis *Cuanza* ad septentrionem supereminet, in eorum cacuminum rimis faucibusque numerosam herbarum aromaticarum catervam nutrientes, dum juxta basim hinc pascuis latissimis, illinc silvis sempervirentibus cinguntur.

In *Benguella* maxime australis (i.e. Districtus *Mossamedes*) interioribus, montium catenæ, inter quos illa "*Serra de Xella*" (sive *Chella*) dicta, inprimis notabilis, non solummodo latere occidentali sed simul etiam austrum versus, hoc autem latere suavius sensimque descendunt, qua ratione planitie *Huillensis* rivi omnes et imo fluvius "*Cacoloar*" qui cunctos pedetentim absorbet, directionem australem sequuntur, fluvio ipso *Cacoloar* demum prope pagum munitum "*Humbe*" in flumen *Cunene* sese effundente.

Lacus [Lusitanis "*Lagoas*"] minoris majorisve extensionis in nulla fere territorii parte desunt, sed in universum in Angola paullo quam in Congo et *Benguella* frequentiores, omnesque paucissimis exceptis, in fluminum rivorumque vicinitate siti inveniuntur, eorumque plurimi plantarum aquaticarum, inprimis *Nymphaearum* et *Pistiarum* uberima copia superbientes, *Cyperorum*, præsertim *Papyri* denso agmine marginati, simul *Crocodylorum* et, si profundiores, *Hippopotamorum* deliciae, ast accolarum Europensium sanitatis, pro dolor! inimici. Plerique, et majorum omnes, fluviis ipsis vel rivis quibus proximis originem suam et, si persistentes, etiam eorum durationem debent, quapropter una cum illis Jove pluvio ampliores, tempore sicco vero valde angustati vel omnino exsiccati, sicut æstate piscatoribus, hyeme contra agricultoribus magnum proventum suppeditantes. Margines enim fere omnium, post aquarum recessum successivum limo relicto lætificati, opimas fructuum agrestium, inprimis *Zea Mayidis*, *Phaseolorum*, *Cucurbitarum* nec non *Arachis hypogææ* messes largiuntur.

Etiamsi territorii *Angolensis* lacus, imo eorum amplissimi, nequaquam cum illis immensis lacubus comparari possunt, qui in ejusdem continentis plaga orientali cis et trans æquatores jure celebrantur, ipsis tamen quoad stirpium aquaticarum, quibus ornantur, numerum et varietatem vix inferiores sunt.

Inter illos, quos plantis natantibus præsertim abundantes vel fere omnino oblectos reperi, *Lagoa de Quizembo* in Congo, *Lagoas de Bombo*, de *Libongo*, de *Foto*, de *Quilundo* et de *Quibinda* in Angola, nec non *Lagoa de Girauil* prope Mossamedes et demum *Lagoa Icantalla* [sive *Yavantalla*] in Districtu *Huilla* sita, primum locum tenent, omnes non solummodo plantis aquaticis sed simul et aliis, quæ eorum ripas palustres vel limo humido tectas inhabitant, ditissimi, et ob stirpium culturarum messes amplas, in eorum arcibus exsiccatis quolibet anno obtentas, incolis utilissimi. Præter supra indicatos permulti alii lacus, tam in plaga litorali quam in Provinciæ penetralibus siti, nigris ac colonis ejusdem fere utilitatis sunt, inter quos ii, qui juxta ripas fluminis *Cuanza*, intra oppi-

dulum "*Massangano*" et dicti fluminis faucem se extendunt, et numero et amplitudine æque insignes.

Supra commemorata vasti territorii per gradus elevatio, quacum, uti facile intelligitur, etiam imbrim copia incrementum earumque duratio protrahitur, dum contra aëris pressio ac soli temperatura sensim diminuuntur, similem quoque vegetationis, qua diversæ elevationis terræ vestiuntur, graduationem sive modificationem provocat, quæ omni peregrinatori e regione inferiore in altiore penetranti, prompte sub oculis cadet, nam non solummodo, herbarum singularum fruticumque atque arborum, quæ tum apparent, ab iis regionis inferioris diversitate indicatur, sed simul etiam agrorum silvarumque diversa indole et vigore, fontium et rivorum numero et frigore aucto, totius demum terrarum ipsorumque habitantium caractere physiognomico mutato interpretatur.

Notabilis hæc naturæ scenarum mutatio, viatori ab ora maritima ad terras internas elatiores progredienti primum ad earum circiter 1000 pedum supra mare elevationem sese manifestat, ubi loco pratorum languescentium virgultorumque sæpius spinosorum nonnisi rarius silvulis claris interruptarum regionis inferioris modo relictæ propemodum repente prata intensius virentia, herbæ elatiores, fruticeta robustiora et silvæ extensæ arboribus altioribus densiusque sociatis ac frequenter scandentium agmine multiformi ornatis compositæ apparent, nec non rivuli et fontes nunc museorum amœna viriditate marginati alteram diversam vegetationis regionem annunciant, quæ ad peregrinatorem esurientem, terræ relictæ ardore cruciatum potu refrigerante silvarumque primævarum gratissima umbra benefaciunt, et phytologum repentina præsentia complurium stirpium prius non observatarum oblectet. Arbores nunc vastissimæ ac formosissimæ, partim solitariæ partim in sylvas densissimas congestæ apparent, inprimis ex ordinibus *Mimosæarum*, *Meliacearum*, *Myrtacearum*, *Myristicacearum* et *Rubiacearum*, et *Palmarum* plures, præcipue *Elais guineensis* et *Raphia* species, formosas suas comas ubique ostentant.

Hæc autem totius fere terrarum circumjacentium indolis immutatio ipsaque silvarum primitivarum magnificentia vix altius quam ad 2500–3000 pedum altitudinem supra oceanum ascendunt; tum enim viator iterum aliam Floræ regionem attingit, non minus generali vestitus vegetabilis sui aspectu quam generum et specierum ibidem occurrentium ab iis præcedentis regionis diversitate indigitatam. Silvæ enim nunc minus densæ et humiliores, pratorum herbæ graciliores aretiusque gregatæ, pascua extensiora et sæpius, modo *Labiatis* vel *Acanthaceis* pygmæis, modo *Orchidearum* terrestrium, *Liliacearum* *Iridiarum*que floribus fulgidis variegata sese representant, et una cum rivorum fontiumque numero aucto, fruticum quoque atque arborum species mire multiplicantur, ita quidem ut in dato quodam circuitu hujus regionis facile duplex vel hinc inde imo triplus specierum diversarum numerus quam in æquali ambitu regionum inferiorum reperitur. At non solum specierum et generum Floram constituentium numerus his locis insigniter auctus invenitur, sed etiam plures plantarum ordines, in terris inferioribus rarissime vel nullibi visi, uti *Santalaceæ*, *Daphnoideæ*, *Proteaceæ*, *Selaginæ*, *Cyrtandrea*, et *Ericaceæ*, ceteris stirpibus associatæ obveniunt, sicque alteram tertiam vegetationis regionem, stirpium habitu, numero et indole definitam pronunciant.

Accidit quidem nonnunquam ut species singulæ quædam, terris altioribus peculiare, vel ibidem frequentes, juxta fluminum aut rivorum ripas in regiones inferiores vel

imo ad fluminum ostia usque descendant, sed hoc rarius obvenit, tumque stirpes tali modo migrantes in his locis potius ceu hospites adventicii quam incolæ stabiles considerandæ, et plerumque etiam habitus sui quadam mutatione originem suam denunciant. Sic exempli gratia *Phœnix spinosa* Thon., riparum fluminis *Cuanza* in Districtu *Pungo Andongo* decus formosissimum, hinc inde fere ad limites internos territorii litoralis descendit, sed ibidem, etiamsi fructifera, nana sæpiusque fere acaulis, vel solummodo trunco brevi 1-4-pedali munita permanet. Pari modo etiam Umbelliferarum arbor (*Alvordia* spec.) quæ in Districtu *Golungo Alto* silvis primævis trunco ad 25 ped. alto et semipedem crasso vel crassiore occurrit, in territorii litoralis collibus quos hinc inde invadit, solummodo fruticulus vix bipedalem, trunculo fere herbaceo, ægæ digitum crasso donatum representat.

Hac stirpium diversarum per tres diversos terrarum elevationis gradus inter limites definitos distributione inductus, etiam tres Floræ Angolensis Regiones phytogeographicas statui posse opinor*, quarum prima *regio litoralis* est †, quæ ab ora maritima ad terras internas circiter 1000 pedes elevatas, nunc longius nunc brevius sese extendit; secunda dein sive intermedia, "*montoso-sylatica*" denominanda, terras inter 1000 et 2500 circiter pedum altitudinis sitas comprehendens, inprimis silvarum primævarum late extensarum præsentia distincta ‡, et denique *regio superior* sive *alto-plana*, quæ omnes illas terras internas amplectitur quarum elevatio supra oceanum 2500 pedes excedit §.

Harum regionum indolis expositionem fusiorem jam olim in commentatione Annalibus maritimis Olissipone editis inserta||, exhibere tentavi, eodemque loco etiam ordinum singulorum fere omnium Floram Angolensem constituentium inter dictas tres regiones distributionem indicare studui, simulque plantarum ab autochthonibus vel colonis in qualibet regione cultarum enumerationem cuivis ordini adducto adnexi, persuasus quod tam totius territorii quam regionum singularum qualitates ac relationes climatologicæ, ex plantarum in una alterave vel in omnibus tribus regionibus majore vel minore abundantia cultarum indice melius tutiusque pateant, quam si istæ solummodo secundum observationes thermometricas, ombrometricas etc. alioquin durante itinere vix sat exacte instituendas interpretentur.

Imbres primi, post hibernum mensibus Junio, Julio, et Augusto regnantem, pluvisque omnino carentem, versus medium vel finem Septembris, veris initium, advenire solent, plerumque, ne dicam semper, inter fulgura et tonitrua summæ vehementiæ de cælo

* Conf. Journ. Linn. Soc. Lond. 1858, vol. iii. pag. 150 seq., et Diar. ejusdem, 1861, pag. 182 seq.

† Conf. respectu hujus regionis indolis, "Observations on the Origin and the Geographical Distribution of the Gum Copal in Angola," by Fred. Welwitsch, Journ. Linn. Soc. Lond. vol. ix. pp. 287-302. Neeson: *Sertum Benguellense*, &c. Bearbeitet von Med. Dr. H. Wawern und T. Pryritsch. Wien, 1860.

‡ Quoad arbores notabiliores silvas istas constituentes conf. 'Synopse explicativa das amostras de madeiras e drogas medicinas, &c., collegidas na Provincia de Angola, enviadas a exposicão internacional de Londres em 1862, por Frederico Welwitsch.' Lisboa, 1862.

§ Conf. "Lettre du Dr. Welwitsch à M. Alph. de Candolle, sur la végétation du plateau de Huila, et observations de M. de Candolle, à ce sujet," in Bibliothèque Universelle [Archives des Sciences Physiques et Naturelles], Livr. Juillet 1861.

|| Apontamentos phytogeographicos sobre a Flora da Provincia de Angola, etc., por Fred. Welwitsch. [Annaes do Conselho ultramarino, 1858, n. 55.]

cadentes. Sunt autem hæc pluvie vernaes, etiamsi non raro et imprimis in terris interioribus ad Novembris finem vel Decembris medium repetitæ, nec tam continuæ nec tam copiosæ quam autumnales, quæ mensibus Martio et Aprili adveniunt, quapropter hæc a colonis *pluvie magnæ* [chuvas grandes] et illæ *pluvie parvæ* [chuvas pequenas] nominantur. Quibusdam vero annis pluvie vernaes per longius tempus, etiamsi nequaquam quotidie cadentes, continuantur, simulque autumnales præcoecius cadunt, ita ut ab Octobris initio ad Aprilis finem, pluvia paucis tantum hebdomadibus interrupta perdurat, et tum plantarum omnium, ac totius naturæ vegetabilis ubique luxuria summa, sed, pro dolor! etiam inundationes, arva et segetes, pascua et silvas nec non raro domicilia pagosque integros repentino impetu devastantes, præsertim in regionibus inferioribus timendæ. Hoc autem rarius accidit, et in universum cunctæ totius Provinciæ Angolensis terræ, præcipue vero australiores et oceano propiores, magis siccitate quam humiditatis excessu laborant. Perpensa hac imbrum tam in totius territorii ambitu quam in ejus districtibus singulis vicissitudine facile colligitur quod de pluviarum quantitate annua generatim vix aliquid certi ac definiti statui possit.

Idem fere de aëris temperatura valet, quæ in diversis terrarum elevationibus, et in ejusdem elevationis locis nunc ventis magis expositis nunc in vallibus profundioribus reclusis, uti facile expectandum, admodum variat. Generaliter tamen temperatura anni media in regione superiore altopiana, et quidem non ob calorem diurnum, qui ibidem, jugis excelis exceptis, fere idem, sed ob noctes insigniter frigidiores, ab illa regionum inferiorum 15–20 grad. thermom. F. recedit; in regione superiore secundum observationes plures in Pungo Andongo et Huilla institutis temperatura anni media inter 55° et 60° F., in regionibus vero inferiorioribus inter 77° et 80° F. vacillare videtur, excepto tamen districtu litorali de *Mossamedes*, qui ob ventorum refrigerantium, sæpius ex austro vel austro-occidente flantium accessum liberum, nec non minus ob oceani aquarum ex austri regionibus frigidis affluentium et juxta hæc litora maximo impetu septentrionem versus decurrentium vim moderantem, climate multo frigidiore gaudet, quam hoc in territorio circulum æquinoctialem tangente vel imo pro parte ab ipso incluso, esset expectandum. Hac eadem ex ratione etiam Flora Mossamedensis vix indolem reapse tropicam representat, sed potius subtropicam vel fere Capensem, uti hoc præsentia specierum plurium ex generibus *Juncus*, *Triglochin*, *Ceratogonum*, *Cressa*, *Euclea*, *Mesembryanthemum*, etc., et ipsius *Fogelie Africanæ* aliarumque stirpium Capensium frequentia indigitatur, et simul cerealium Europæorum atque *Vitis vinifera* cultura prospera illustratur.

Generalibus hisce de Provinciæ Angolæ constitutione physica et vetegabilium in ejusdem territorio distributione præmissis, pauca quædam adhuc de mensuris et numeri signis adhibitis, nec non respectu nominum locorum natalium specierum describendarum hic adjungere liceat.

Mensuræ hinc inde in specierum descriptione usitatæ, uti et illæ quæ ad terrarum supra mare elevationem spectant, *pedem Anglicum*, in 12 pollices et pollicem in 12 lineas divisum, indicant. Terrarum altitudines methodo thermometrica a cl. Princep * indicata determinare studui, observationibus hunc in finem institutis in eodem loco pluries et non

* Conf. Table for ascertaining the Heights of Mountains from the Boiling-point of Water. By James Princep. London, 1841.

raro etiam ad diversas diei horas repetitis demumque inter se comparatis; valores haece methodo partes non omnino exactos esse, omnibus notum est, sed ad stirpis ejus-cumque loci natalis altitudinem statuendam satis habere veritatis videntur.

Nomina locorum natalium specierum descriptionibus appensa secundum orthographiam Lusitanicam scripsi; sunt autem haec nomina nunc linguae Nigritarum illis terris autochthonum omnino propria, nunc Lusitanica, id est a colonis Lusitanicis ibidem introducta, nonnumquam etiam ex ambabus his linguis hybrida, sed jam longo usu vindicata simulque indigenis bene cognita et proinde peregrinatoribus futuris quam nomina scriptis quibusdam vel mappis antiquioribus exarata, duces fideliores.

Nomina vernacula, quibus stirpes quaedam vulgariore vel frequentius obvenientes in locis suis natalibus a Nigritis vel colonis designantur, non nisi rarius et caute speciebus singulis adnexi, quoniam ex istorum perplurium, primum sedule collectorum et dein inter se et una cum stirpibus quibus addicta fuerunt comparatorum studio cognovi, eorum plurima nonnisi ambigui valoris, vel solummodo paucis incolis ejusdem loci cognita esse, vel non raro, et ino in uno eodemque loco, stirpibus inter se valde diversis, vel vix habitu aliquantulum similibus attribui.

His missis restat ut viris illustribus qui in conficienda hac commentatione mihi opem tulerunt, gratias meas maximas atque sincerissimas agam, quos inter clarissimi Dr. Jos. D. Hooker, Horti Muscique botanici Kewensis omnium amplissimi ac ditissimi Director, nec non Prof. Dan. Oliver, ejusdem Musei custos et bibliothecarius, primo loco praedicandi: viri generosi, eruditione et humanitate aequae insignes, quorum benevolo consilio auxiliumque efficacissimo, si quid meriti huic scriptulo inhæret, omnimodo et juste tribuendum.

Pariter clarissimis viris Joh. J. Bennett, herbarii Musei Britannici praefecto, et Guilh. Carruthers, ejusdem herbarii curatori, pro singulari et semper prompta urbanitate, qua illius herbarii locupletissimi usum mihi faciliorem reddiderunt, me summopere gratum confiteor; lectoris autem benignae indulgentiae harum paginarum imperfectiones iterum atque iterum commendo.

DESCRIPTIONES.

Ordo ANONACEÆ.

Trib. III. MITREPHORÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. p. 21.

MONODORA ANGOLENSIS, Welw. n. sp.* (Tab. I.) Glaberrima, foliis membranaceis vel demum plus minusve coriaceis, obovato- vel elliptico-oblongis, breviter acuminatis cuspidatisve, basi cuneatis, herbaceo viridibus, floribus pendulis, sæpius in ramulis brevibus lateralibus foliiferis solitariis oppositifoliis; sepalis e basi latiuscula lanceolatis crispatis, petalis exterioribus amplis ovatis acuminatis incurvis, lateribus utrinque reflexis, interioribus unguiculatis conniventibus laminis transversim ellipticis

* Primam tam hujus speciei novae quam *Monodora Myristice*, Dun., olim perperam Floræ Americanae vindictae, in Angola certe indigenae notitiam jam olim clar. W. W. Saunders in litteris (Loandæ, Sept. 1857) communicavi, denique anno sequente, ambas species in "*Apontamentos phytogeographicos sobre a Flora de Angola*, p. 587," commemoravi.

abrupte cuspidatis basi exauriculatis; fructu ovato-ellipsoideo longitudinaliter sulcis levibus latiusculis percurso.

Habitat in silvis primævis editoribus Distr. Golungo Alto et paulo frequentius in silvaticis rupestribus Distr. Pungo-Andongo ad 2500-3500 ped. altit. A Novembr. usque Januarius florens, Maius-Julio fructificans. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 774 et 776.

Arbor 20-30-pedalis, coma densiuscula ovoidea, trunco recto ad basim 1-1½ ped. diametri, cortice obiter rimoso aspero nigrescente; rami primarii erecto-patentes, secundarii et ramuli patentissimi cylindraci, juniores et floriferi purpurascetes, subdistiche foliati. *Folia* alterna, petiolo brevi 2 lin. longo canaliculato suffulta, obovato-vel elliptico-oblonga, nunc ovato-lanceolata, 4-5½ poll. longa, 2 poll. lata, basi cuneato-angustata, apice abrupte acuminata vel breviter cuspidata, margine integro, penninervia, supra intense viridia nitidula, subtus absque nitore pallide virentia, secundum expositionem arboris nunc membranacea et decidua, nunc plus minusve coriacea et persistens. *Flores* speciosi, totius ordinis facile elegantissimi, multicolores, suaviter odori, in ramulorum extremorum ramellis abbreviatis solitarii, longius pedunculati, nutantes, demum penduli, pedunculo oppositifolio, gracili, circiter 2 poll. longo, medio bractea ampla, membranacea, herbaceo-viridi, late ovata, vel cordato-ovata acuminata, longitudinaliter plurinervia, semiamplectente, demum decidua munito. *Sepala* a lata basi lanceolata, petalis multoties breviora, herbaceo-viridia, undulato-crispa, a basi supra pedunculum reflexa, longe persistens. *Petala* (basi semper inter se coalita mox post fecundationem a calyce annulatum soluta et junctim secedentia) tenuiter carnosa, exteriora elongato-ovata sensim acuminata, obtusiuscula, 2-2½ poll. longa, utraque superficie reticulatim scrobiculata, a basi patula arcuatim incurva, lateribus undulato-crispis recurvis, primum et viridi purpurascens basi nivea, demum maculis circularibus rubris, aurantiacis et flavicantibus undique variegata, interiora exterioribus multoties breviora et duplo angustiora, erecto-conniventa, omnino albidula vel albidulo-rosea, levia, margine plano, spatulata, unguibus latiusculis fere laminæ æquilongis, lamina nunc transverse elliptica, nunc obcuneata abrupte cuspidata, cuspidate obtusiuscula barbulata. *Stamina* et *gynæcium* generis; antheræ badio-albidæ, loculis contiguæ; pollen albidum. Ovarium bene efformatum, mox post fecundationem verticaliter pluristriatum; stigma nunc integrum peltatum, nunc obscure plurilobulatum vel solummodo obiter radiato-striatum. *Fructus* in pedunculo nunc lignose indurato et incrassato pendulus, suberoso-lignosus, glabrinsculus, ovato-vel oblongo-ellipsoideus, 6 poll. circiter longus, 3½-3¾ poll. diametro, basi obtusus, vertice breviter apiculatus, secundum longitudinem sulcis pluribus latis sed parum profundis costisque obiter prominentibus percursus, unilocularis, pulpa farinosa fuscescente semina involvente factus, indehiscens, vel rima longitudinali apertus. *Semina* numerosa, oblongo-obovoides, 5-7 lin. longa, ad hilum oblique truncata, mutua pressione non raro varie gibba vel angulata; testa tenuiter coriacea, tenax, levigata, fusco-badia, nitida; albuminis ceraceo-carnosi gratissime et fortiter fragrantis lamellæ numerosæ, planiusculæ, æquali fere inter se crassitudine, respectu peripheriæ seminis verticaliter seriatae. Embryo minutus, hilo proximus.

Observatio.—Semina *Monodora Angolensis*, uti illa *Monodora Myristica* ab autochthonibus ob nucleî aroma gratissimum, illud *Myristica moschata* æmulans, nec non ob virtutem egregie stimulantem et restaurantem magni æstimata, hinc inde etiam in condiendis cibis usitata multoque commercio circumvecta, in omnibus mercatoriis Angolensibus prostant et sub nomine "*Xipepe*" vel "*Gipepe*" venduntur. Arbores ipsæ amborum specierum in Angola plerumque "*N-pepe*", in Insula Sti. Thomæ autem "*Jobo*" nuncupantur. Nomen vero "*Xipepe*" vix idiomati *Bundico* proprium, sed spurium, et ni fallor, a vocabulo "pepper" (Piper) olim a mercatoribus Anglicis ibidem introducto, derivatum et a Nigritis, commercii gratia, genio linguæ *Bundicæ* accommodatum.

Trib. IV. XYLOPIÆ, Benth. et Hook. f. l. c. p. 27.

XYLOPIA ODORATISSIMA, Welw. n. sp. Arbor parva ramosissima, ramulis pubescentibus, foliis petiolatis coriaceis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, obtusis, basi rotundatis, supra glabrescentibus, subtus præcipue in costa piloso-pubescentibus; floribus axillaribus subsessilibus vel breviter pedicellatis solitariis vel 2-3 fasciculatis; calyce trifido lobis ovato-deltoides; petalis exterioribus elongatis, interioribus sæpius paulo brevioribus lineari-subulatis; antheris connectivo truncato leviter dilatato, disco staminifero denique deciduo; ovaris circa 10, pilosis, stylo subulato andrœcium superante, ovulis 4-6; carpellis maturis obliquis, breviter stipitatis, mono-oligospermis, longitudinaliter nervosis glabris.

Habitat frequens in montosis silvaticis editoribus ad plagam australem de Morro de Lopollo Distr. Huilla, inter 5000 et 5500 ped. altit., Decemb.-Febr. florens, Apr. et Maio fructificans. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 757.

Arbuseula in silvis densioribus circiter 10-15 pedes alta, comæ tunc laxioris forma sat variabili, ramis valde inæquilongis fere horizontaliter patentibus, ramulis extimis vario modo curvis inter arborum vicinarum ramificationes subscaudentibus; in declivibus vero apriciis petrosisque plerumque frutex 4-6-pedalis, jam paulo supra basim ramosus, ramis erectiusculis, cylindricis, glabris, crebre et patentim ramulosis cumulas dense foliosas efformantibus; ramuli juniores et floriferi plus minusve sericeo-pubescentes. *Folia* persistentia, in vivo molliter coriacea, supra habitu glaucescente lætius, subtus pallide viridia, exsiccatione utrinque multo pallidiora et rigidiora, petiolo 2 lin. longo, leviter canaliculato eum ramulo articulo suffulta; lamina 1½-2 poll. longa, 1-1½ poll. lata, apice obtusa vel rarius subacuminata, basi rotundata vel hine inde subcordata, subtus inprimis ad petiolum et costam molliter pubescens. *Flores* ereberrimi, suavissime fragrantés, ad axillas foliorum solitarii vel plerumque 2-3 fasciculati, brevissime pedicellati, carnosuli, rigidi, fragiles, extus undique sericotoментelli, primum albi, demum flavescentes. *Calycis* profunde 3-partiti lobi deltoidei, circiter lineam longi, apice apiculati. *Petala* exteriora ¾-1 poll. longa, obtuse carinata, a basi ovata concava abrupte linearia obtusiuscula; interiora angustiora, paulo breviora et apicem versus subulata, sub anthesi erecto-patula, prompte decidua. *Andrœcium* et *ovaria* descripta. *Carpella* matura 4-8, omnino glabra, nitidulo-rubra, stipite recto 2-3 lin. longo, crassiusculo, subangulato suffulta, nunc monosperma, obovoidea, pisi majoris mole, nunc 2-4-sperma, oblique obovoidea vel claviformia pollicaria, omnia juxta apicem appendice alaeformi rostrata.

Observatio.—Stirps ob florum miram copiam eorumque odorem gratissimum, quem late spargunt, inter affines insignis, nec non propter corticem aromatico-amaricantem pharmacographis de futura Africæ tropicæ materia medica scripturis commendanda. Autochthonum illius regionis medici circumforanei (*quibanda* dieti), non semper omnino imperiti, e florum vix apertorum infusione tepida potum parant stimulantem simulque subnarcoticum, de cujus tamen applicatione speciali non edoctus fui.

Ordo VIOLARIÆ.

Trib. III. ALSODEIÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. p. 118.

ALSODEIA (CERANTHERA) ILICIFOLIA, Welw. n. sp. (Tab. II.) Fruticosa vel subarborescens, glabra; foliis coriaceis, ovali-oblongis, elongatis, acutis, argute et grosse spinuloso-serratis; floribus flavis, brevissime pedicellatis, recurvis, in paniculas angustas terminales folio breviores fasciculatim dispositis; sepalis ovato-ellipticis,

obtusis; petalis obtusis (sepalis subbrevioribus*); tubo stamineo brevi, extus haud producto, antheris connectivo dorsali ovato obtuso, appendicem anteriorem ovalem integram vel emarginatam superante; capsula coriacea, ruguloso-aspera.

Habitat sporadica in rupum convallibus umbrosis Distr. Pungo Andongo, ubi prope Præsidium ipsum, loco dicto "Barrancos de Catete," Febr. c. alabastris et fructu submaturo, Maio denique iterum cum alabastris legi, ad altit. circiter 3500 ped. supra mare. *Ersic.* Welw. Iter Angol. no. 889.

Frutex validus, sive arbuscula, 8-12-pedalis, *Ilicia aquifolie* habitum quodammodo simulans, rigiditate omnium partium insignis, sempervirens. Trunculus rectus cortice cinereo-virescente parum aspero, ligno albidio compacto, sæpius jam ad 3 vel 4 pedes altitudinis supra basim ramosus; rami erecto-patuli, laxè ramulosi, cylindrici, adultiore levigati et nitenti-virides; ramuli novelli plus minusve angulati, erectiusculi, firmi et tenaces. *Folia* alterna, breviter petiolata, rigidicoricea, glaberrima, supra intense viridia, subtus ex albidio virentia et prominule venulosa, nunc ovali-oblonga, elongata et acuminata, nunc breviora et late elliptica, penninervia, nervo mediano valido subtus valde prominente, in petiolo firmo erecto-patula; petioli in uno eodemque ramo longitudine variantes, nunc vix semipollicem, nunc plus quam sesquipollicem longi, semiteretes, canaliculati, ad insertionem laminae dorso gibbi; lamina 7-9 poll. longa, 2-2½ poll. lata, basi breviter angustata vel obtusiuscula, apice acuta vel acuminata, margine argute serrata, serraturis sinu lato obtusissimo sejunctis apice rigido-spinulosis, epinulis 1-½ lin. longis, subulatis. *Panicula* terminalis, erecte, angustæ, 5-7 pollices longæ, aphyllæ; pedunculi communis angulati, sub lente tenuiter velutino-pubescentis rami basi bracteis brevibus crassiusculis ovatis muniti, inferiores 1-2 poll. longi, parce ramulosi, erectiusculi, superiores sensim breviores, summi brevissimi. *Flores* (nonnisi in alabastris observati) flavi, ceraceo-carnosuli, pedicellati, juxta ramulos pedunculi per fasciculos paucifloros ½-¾ pollicis inter se distantes dispositi, ex pedicello ipsis sæpius dimidio breviorè basi bibracteolato, crassiusculo, angulato, arcuatim recurvato nutantes vel fere penduli, vix tres lineas longi. *Sepala* a basi lato ovato-elliptica, erecto-imbricata, concava, obtusissima, margine ciliolata, crassiuscula, rigida, dorso tenuiter pubescentia et sulcato-striata, petalis latiora, in fructu persistentia. *Petala* juvenilia ejusdem fere figuræ ac sepala, sed iis angustiora et breviora. *Stamina* descripta. *Ovarium* glabriusculum; placentæ pauci-(uni-?)ovulatæ; stylus terminalis, rectus, pro more floribus crassiusculus, cylindricus, medio quidquam incrassatus, apice obtusiusculo stigmatosus, staminibus paullo brevior. *Capsula* ovoides, coriacea, calyce indurato stipata, extus rubro-purpurea, undique rugulis papillisque aspera, elasticè dehiscens, 3-valvata, 3-sperma, vel placentæ unius abortu disperma, valvis cymbimorphis sublignosis, medio placentiferis. *Semina* (vix bene matura) subglobosa vel sublenticulari-compressa, diametro longiore circiter 5 lineas longa, pone umbilicum excavatum obtuse rostrata, testa crustacea, levigata, nitidula badio-flavescente. Embryo in albumine copioso axillis excentricis, umbilico approximatus; cotyledones obovato-ellipticæ, planiusculæ, vaginatim conferruminatæ, radícula hilo proxima.

Ordo BIXACEÆ.

Trib. II. ONCOBEE, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 125.

ONCOBA WELWITSCHII, Oliv. Flora of Trop. Afr. MS. (Tab. III.) Arborescens, inermis, glabra; foliis membranaceis, longe petiolatis, ovatis, acuminatis, basi late rotundatis; floribus pedunculatis, ad ramulos annotinos vel vetustiores nascentibus 3-5 fasciculatis; sepalis 3 late ellipticis; petalis circiter 10 obovatis longiuscule unguiculatis, sepalis plus quam duplo longioribus; antheris linearibus quam filamenta capillaria multo brevioribus; ovario papilloso-setoso, placentis 5-6; stylo gracili longiusculo

* Flores in nostris specimenibus necdum bene evoluti et solummodo in alabastris anthesi proximè examinanti; relatio proinde inter sepala et petala in postero accuratius statuenda.

apice in lobos 5-6 breves patentes diviso, stigmatibus truncatis; capsula ovoidea, dense echinata, 5-6-valvata, valvis intus nudis medio placentiferis post dehiscentiam recurvis; seminibus dense verruculosus.

Habitat sporadica in silvis primevis Distr. Golungo Alto prope Bungo Aquitamba, ad 2300 ped. altit., necnon sub forma fruticis in silvis secundariis circa Sange. Floret Novemb. usque Febr., Martio usque Jul. fruct. maturat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 537.

Arbustula 12-15-pedalis, hinc frutex vix 8 pedes altus. Truncus in forma arborescente rectus, diametro semipedali, raro crassior, cortice minute rimuloso badio-cinerascente, ligno albidio denso, saepius jam ad altitudinem 4-5 pedum supra basim ramosus, ramis robustis elongatis ascendentibus, infra longe denudatis, apicem versus parce ramulosus; ramuli graciles, patentes, tenuiter sulcati, lenticellis ellipticis obsoletis, novelli levigati apice densius foliosi. *Folia* alterna, longe petiolata, ampla, ovata, longe acuminata, supra late viridia, verniceo-nitidula, subtus pallide virentia, glabra; petioli 3-4½ pollices longi, graciles, patuli, basi obiter canaliculati, ad insertionem laminae quidquam incrassati et curvati; lamina (in foliis adultis ex apice petioli fere pendula) 6-10 poll. longa, 3-5 poll. lata, margine integro vel obscure repando, basi rotundato-obtusae, apice nunc sensim, rarius abrupte in acumen 1 poll. circiter longum attenuata; stipulae laterales geminae, foliaceae, lineari-subulatae, semipollicem circiter longae, erectae, deciduae. *Flores* polygami, ex speciosissimis inter congeneres, diametro 4-pollicares, quondam in eodem ramo multo minoribus mixti, ad ramulos vetustiores vel imo ad truncum ipsum nascentes, plerumque 3 vel 4 fasciculati, pedunculis 1-1½ poll. longis coloratis basi minute bracteolatis suffulti, evolutione successiva aperti. Alabastra globosa, apiculata, paullo ante anthesim vesiculose turgescens. *Calyx* tenuiter coriaceus, triphyllus, sepalis aestivatione late imbricatis, concavis, obtuse carinatis, pollicem longis, semipollice latioribus, extus pube minutissima caduca subvelutinis, fusco-rubentibus, demum deciduis. *Petalae* 9-12, plerumque 10 vel 11, alba vel albidio-rosae, obovato-spathulata, patentia, membranacea; lamina obovata 1-1½ poll. longa, venulis sursum divergentibus percursa, margine integro obiter undulata, sensim in unguem ½-¾ poll. longum compresso-planum 1 lineam latum attenuata, una cum staminibus decidua. *Stamina* numerosissima; filamenta filiformis, ascendentia, albidia, pollicem longa; antherae terminales, intense flavae, oblongo-lineares, basi subcordatae, quam filamenta multoties breviora, biloculares, longitudinaliter dehiscentes; pollinis granula globoso-ellipsoidea, levia. *Ovarium* ovoideum, papillis acutiusculis undique echinulatum; ovula juxta placentas parietales 5 vel 6 perplurima; stylus rectus, cylindricus, fere pollicem longus, apice radiato 5-6-lobus, demum indurescens, in fructu persistens. *Capsula* matura globosa vel saepius ovoidea, undique aculeis rigidulis 1 pollicem longis late auro-flavis echinata, tarde dehiscentis, 5- vel 6-valvata, valvis crassis, lignoso-duris, demum arcuato-recurvis, intus nudiusculis, medio placentiferis. *Semina* permulta in pulpa nidulantis, parvula, duabus lineis vix longiora, ovoidea, fuscula, crebre verruculosa, vertice truncato areola in centro umbonata instructa; testa crustacea; embryo rectus; cotyledones planae, ovatae; radícula crassiuscula cotyledonum fere longitudine, hilo proxima.

Ordo POLYGALEÆ.

POLYGALA GOMESIANA, Welw. n. sp. (Tab. IV.) Perennis, herbacea; caule erecto 2-5-pedali; foliis lineari-lanceolatis linearibusve, utrinque saepius angustatis, glabris vel sparse pilosulis; racemis terminalibus amplis multifloris, bracteis bracteolisque membranaceo-scariosis ovato-lanceolatis acuminatis persistentibus, pedicellis patentissimis pilosis; sepalis anterioribus liberis, alis suborbicularibus diametro semipollicaribus, coloratis; capsulis obcordatis, alis dimidio brevioribus anguste marginatis.

Habitat in pratis humidis altius herbidis juxta rivulos Distr. Huilla, frequens circa Lopollo, ad 5000 ped. altit. A Decembr. usque Apr. florens et fructificans. *Ersic.* Welw. Iter Angol. no. 1032.

Herba elata, radice lignescente oblique descendente, oligocephala, perennans. *Caulis* e radicis collo 1-3 erecti, virgati, tri- vel quatuor- rarius quinquipedales, simplices vel apicem versus parce ramosi, cylindrici, obiter sulcato-angulati, pilis raris mox deciduis glabrentes, a basi ad medium densius, supra remote foliati. *Folia* alterna, erecto-patula, subsessilia, plerumque omnino glabra, late herbaceo-viridia; inferiora et media approximata, linearilanceolata, 1½-3 poll. longa, semipollice vix latiora, utrinque sensim angustata, subacuta vel apice obtusiusculo breviter apiculata, margine integro, nervo inprimis subtus ad basim prominulo flavescente percursa; superiora magis distantia, sensimque angustiora, breviora et acutiora, saepius linearia; floralia sub anthesi plerumque decidua. *Racemi* in caule et ramulis terminales, erecti, stricti, amplii, ½-1-pedales, multiflori, juveniles bracteis apice densius congestis breviter comosi. *Flores* ex majoribus et speciosissimis totius generis, in pedunculo communi pilis brevibus patulis vestito densiuscule gregati, una cum bracteis, bracteolis pedicellisque amoenissime rosei vel roseo-purpurascens, subnutantes. *Bractes* tenuiter membranaceo-scariosae, 3-4 lin. longae, ovato-lanceolatae, longe acuminatae, patulae, una cum bracteolis itidem patulis paullo brevioribus obtusioribusque persistentes. *Pedicelli* graciles, ½-¾ poll. longi, albidopilosii, sub anthesi horizontaliter patentes, demum arcuato-deflexi, fructiferi cernui. *Sepala* 5, omnia libera; tria exteriora inter se subaequalia, parva, 1½-2 lin. longa, obovato-elliptica, obtusiuscula, extus sparse pilosa; interiora (alae) multo majora, lactissime roseo-purpurea, oblique lato-obovata vel fere orbicularia, diametro circiter semipollicaria, ima basi abrupte attenuata, glabra, tenuiter venulosa, obiter convexa, petala occultantia. *Petala* tria, basi inter se et cum staminum vagina conercta; inferius (cariua) concavo-galeatum, dorso crista latiuscula intense purpurea profunde bifida auctum, ad verticem leviter emarginatum, ad marginem prope basim utrinque plus minusve profunde sinuatum et pilosum; lateralibus quam carina breviora, ovato-oblonga, margine superiore inflexa laxe crispata, ad faciem internam laminae partis cum vagina staminali connatae piloso-pubescentia, ad ejusdem partem liberam glabra, verticaliter sursum curvata, apice obtusa vel subtruncata. *Stamina* vagina basi juxta margines piloso-ciliolata; antherae oblongo-ovoides, obiter compressae, subtiliter puberulae vel saepius omnino glabrae, apice oblique truncato biporosae (septulo parum efformato vel deliquescente?) *uniloculae*. *Pollinis* granula (in una eademque anthera) nunc spheroides nunc breviter-ellipsoidea, longitudinaliter costato-striata, sensu directioni costularum contrario et non raro jam intra antheras necdum apertas tubificantia. *Ovarium* obovatum, vertice circa styli insertionem pilosum; stylus compressus latiusculus, medio dilatatus, paullo supra medium arcuatus, ad apicem plus minusve oblique truncatus vel obscure angulatus, anguste stigmatosus. *Capsula* oboordata, rigidulo-membranacea, 2½-3 lineis vix longior, compressa, anguste marginata, ad apicem nunc pilis raris obsita nunc omnino glabra, disco utrinque bigibba. *Semina* oblongo-obovoides, circiter 1½ lin. longa, pilosa, vertice areola depressa notata, caruncula pro seminis mole parva; albumen parcum.

Observatio.—Nomine specifico hujusce stirpis elegantissimae ac culturae dignissimae virum saluto, doctrina et urbanitate pariter insignem, clar. *Bernard. Ant. Gomes*, Med. Doctorem, horti scholae medico-chirurgici Olissiponensis fundatorem, Florae fossilis Lusitaniae scrutatorem sedulum, nec non medicum expertissimum, studiorumque meorum fautorem.

Ordo DIPTEROCARPEÆ.

VATICA AFRICANA, Welw. n. sp. (Tab. V.) Frutex vel arbor parva; ramulis novellis tomentoso-pubescentibus, raro glabris; foliis coriaceis, oblongo-ellipticis, obtusis, basi vel obtusis vel anguste rotundatis, nunc subcordatis, supra glabrescentibus, subtus ferrugineo vel albo tomentosis; cymis racemiformibus axillaribus folio brevioribus vel

floribus apices ramulorum versus fasciculatis; sepalis subliberis ovatis obtusis, petalis oblongo-lanceolatis sepalis triplo longioribus; staminibus indefinitis bi- (vel pluri-) seriatis, filamentis filiformibus, antheris ellipticis ovatisve, connectivo breviter apiculatis; fructu globoso subapiculato, calycis fructiferi lobis inter se subaequalibus patentibus oblanceolatis vel oblongo-obovatis, obtusis acutisve, nervis anastomosantibus prominulis grosse reticulatis.

Habitat in silvis et dumetis arenosis Distr. Huilla, inter 4000 et 5500 ped. altit., imprimis frequens ad basin de "Morro de Lopollo." Floret Octobr. usque ad Januar., Apr. et Maio fructificat.

Stirpis hujusce polymorphæ præcipue duæ in Angola mihi obvenerunt formæ, inter se habitu et magis adhuc foliorum indumento diversæ, junctimque vix commode describendæ, quapropter eas hic seorsim tractandas et characteribus utrique peculiaribus limitandas esse existimavi, ut sequitur.

α. denudans. (Tab. V. fig. 1.) Forma plerumque fruticosa, foliis subtus laxe ferrugineo-tomentosis pubescentibusve vel glabratiss.

Frutex humanæ altitudinis resinosis, paullo supra basin ramosus, rarius arbuscula vix 8-pedalis, habitu *Grevie* speciem æmulans; rami cylindrici, inferiores et superiores breves, medii elongati, patentes, glabrentes, ramulis novellis et florigeris gracilibus subangulatis tomento laxiusculo pubescentibus vel hinc inde furfuraceo tomentellis. *Folia* alterna, petiolata, chartaceo-coriacea, quoad figuram sat varia, plerumque oblongo-elliptica, ad basin et apicem rotundato-obtusæ, nunc ad basin angustato-rotundata vel subcordata, ad apicem emarginata, rarius utrinque subangustata fere lanceolata, supra glabrescentia, habitu flavescens virentia, nervis impressis oblique striata, prope basin paullo supra petioli insertionem glandula concava rubra orbiculari vel subelliptica notata, subtus basi ferrugineo-tomentosa vel villosa-pubescentia, aut fere deglabrata aeneo-viridia, nervo medio et lateralibus valde prominentibus elevatim costata, inter nervos prominule reticulato-venulosa*; petioli 3-6 lin. longi, cum ramulis articulati, cylindrici, villosi-pubescentes, nunc adultiores glabrentes vel tenuiter verruculosi; lamina 1-2½ poll. longa, ¼-1½ poll. lata, sæpè plerumque pollice angustior. *Stipule* petiolares geminæ, linearilanceolatae acuminatæ, sub folii evolutione caduæ. *Inflorescentia* cymoso-racemosa, axillaris vel spurie terminalis, pedunculo communi tunc ex penultimi folii axilla infra gemmam apicalem evoluto. *Pedunculus*, pedicelli, bracteolæ et calyx villosi-pubescentes. *Sepala* basi breviter coalita, in alabastrum lineæ vix longiora, evidenter imbricata, ovata, obtusæ, erecto-subpatula, persistentia, post anthesin sensim aucta. *Petala* oblongo-lanceolata, sepalis duplo subtriplove longiora, sub anthesi patetia, extus tenuissime velutino-tomentella albidæ, intus flavicantia glabra, solum medio basin versus pilosula, prompte decidua. *Stamina* perplura, ultra 50, circa ovarium annulatum seriata, patula; filamenta gracilia, compressiuscula, plerumque biserialia, albidæ; antheræ flavæ, connectivo nunc magis producto et robustiore ovate, nunc illo breviori subellipticæ, loculis inter se fere semper magnitudine inaequalibus, introrsum dehiscentibus. *Ovarium* ovoideum, pilosum, tri-, rarissime biloculare, loculis biovulatis; stylus firmulus, rectus, cylindricus, apicem versus parum attenuatus, stigmatibus breviter tri-, rarissime bilobis, lobulis teretibus patulis apice subtilissime fimbriatis. *Fructus* calycis nunc valde aucti fundo insidens, globosus vel ovoideo-globosus, pisi magni mole vel imo paullo major, plus minus pubescens vel subtomentosus, durus, styli basi indurata apiculatus, vix delinens, univ-, rarissime bilocularis, mono-, rarissime dispermus; calycis fructiferi sepala basi breviter coalita in alas subaequales filiformes

* Facies inferior foliorum, oculis nudis aspecta, tomentosa quidem apparet, et in quibusdam formis revera tomento tenui undique obducta est; sed lente fortiori examinata plerumque solum nervi et venularum acies pilis crispulis plus minus dense obsita inveniuntur, areolæ autem et venularum anastomosi ortæ solummodo pilis raris adpersæ vel plerumque centro omnino glabras sese manifestant, id quod in varietate *β. hypoleuca* nunquam observare mihi licuit.

scarioso-rigidulas, oblanceolatas, apice obtusiusculo apiculatas, late rubentes, obiter pubescentes, 1½ poll. longas, 6-8 lin. latas, utrinque elevatim reticulato-venosas expansa. Semina perfecta non visa. Crescit hæc varietas satis frequens in collinis apricis arenosis inter pagum Lopollo et Morro de Lopollo, ad 5000 circiter pedum elevationem; Decembr.-Januar. florentem, Maio demum 1890 fructificantem legi. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1035.

Observatio.—Stirps, ut videtur, late per Africam austro-tropicam diffusa, a clar. Dre. Kirk (fide spec. herb. Kew.) etiam in Zambesiæ editoribus (Highlands of Batoca-country, Jul.-Octobr. 1860) lecta.

β. *hypoleuca*. (Tab. V. fig. 12.)

Forma arborea, foliis subtus dense albo-tomentosis.

Arbor parva, 12-pedalis et altior, habitu *Cratægo Arise* Linn. non dissimilis, trunco recto, ¼-1 ped. prope basin crasso, coma laxissima, depresso-dilatata; rami patenti-divaricati, crassi, varie curvi, ramulis abbreviatis robustis, apice ad ultimorum foliorum axillas florigeris. *Folia* quoad figuram iis varietatis præcedentis subsimilia, etiam ad petioli insertionem glandulifera, sed omni sensu triplo majora et crassiora, petiolis ½-1 poll. longis, lamina 2½-3½ poll. longa, 1½-1½ poll. lata, apice obtuso sæpius emarginata, basi non raro subcordata; juniora utrinque tomentosa, adultiora supra late viridia et tenuiter pubescentia, subtus tomento denso albido oblecta. *Flores* majores, petala villosa-tomentosa. *Fructus* non observatus. Crescit sporadica et rarior in silvis subumbrosis maxime e *Leguminosis* constantibus ad altit. 4000-4500 ped., inter Mumpulla et Nene, ubi Octobr. 1859 c. alabastris et Decembri cum flore legi. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1036 [*Vatica hypoleuca*].

Observatio.—Varietas admodum conspicua, extra Angolæ limites hucusque nondum observata, forsân species propria, sed fructu nondum cognito vix bene limitanda. Ceterum monendum habeo, stirpes perennes generatim, et inprimis arborescentes Floræ Huillensis aliorumque districtuum Angolæ et Benguellæ interiorum, ob silvarum incendia a pastoribus ibidem vagantibus per secula quolibet anno repetita, quoad habitum et variarum partium indumentum maximopere variare, id quod præcipue in variis *Syzygii*, *Parinari*, *Anonæ* et *Fici* speciebus observare licet, quæ in silvis nullo adhuc incendio mutilatis qua arbores proceræ superbiunt, dum eadem species in pascuis proximis post combustionem silvarum enatis (a nobis nomine "*dumeta secundaria*" indicatis) nonnisi sub formis pygmæis, ceu fruticuli humiles sæpius vix palmares sive pedales, ast densis cæspitibus crescentes, et nihilominus hocce in statu late florentes atque fructificantes occurrunt.

Ordo STERCULIACEÆ.

Trib. 1. STERCULIÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. i. p. 217.

OCTOLOBUS, Welw. gen. n.

Flores unisexuales. *Calyx* campanulatus, tubo subcylindrico limbo octofido; lobi coriacei marginibus late membranaceis indupliatis undulato-crispulis. *Petala* nulla. *Staminum* columna brevis, cylindrica, androphoro elongato-conico tomentoso imposita; antheræ perplurimæ in discum orbicularem vertice depressum connatæ. *Ovarii* carpella perplurima, multiseriata, in capitulum globosum gynophoro brevi impositum conferta, capitulo basi verticillo staminum imperfectorum cincto; carpella turgida, libera, elongato-ovoides, dense tomentosa, unilocularia; stylus subnullus; stigma sessile obiter bilobum; ovula plurima biseriata. *Carpella* matura 8-10 distincte stipitata, turgida, obovoides vel

clavata, gibba, rostro oblique terminata, tarde dehiscentia, 1-3-sperma. *Semina* subglobosa, hilo lato sessilia, testa laevigata, subcoriacea; albumen nullum. *Embryo* subglobosus; cotyledones crassae, hemisphaericae; radícula brevissima, inclusa; plumula pilosa.—*Arbor* Africae tropicae austro-occidentalis, laxa comosa, ramulis robustis. *Folia* alterna, indivisa, longiuscule petiolata, petiolis apice incrassatis, obovato-lanceolata, obtuse acuminata, obscure sinuata, coriacea, glaberrima. *Stipulae* geminae laterales caducae. *Flores* magni ad ramulos sessiles, subsolitarii, fulvo-villosi. Genus antheris uniseriatim annulatis, albuminis defectu et ovarii loculis pluriovulatis *Colae*, Schott, proximum et affine, sed calyce constanter 8-fido, coriaceo, carpellorumque numero indefinito sine negotio distinguendum. Species unica.

OCTOLOBUS SPECTABILIS, Welw. sp. n. (Tab. VI.)

Habitat sporadica in silvaticis rupestribus Distr. Pungo Andongo, praesertim prope Praesidium loco dicto "Barranco da Pedra Songue" Jan. 1857 cum flore, Apr. c. fr. legi. *Ezic.* It. Angol. no. 1202.

Arbor 15-20-pedalis, rarius altior, trunco recto, gracili, basi 1-2 ped. circumferentiae, cortice albidogrisco leviter rugoso, coma laxa sursum dilatata vertice depressa. *Rami* vagi, elongati, erecto-patentes, longe denudati, albicantes, apicem versus parce ramulosi, ramulis patulis, cylindricis, paeunae anserinae vel hinc olivinae crassitudine, novellis et junioribus angulato-sulcatis villosque fulvescente mollissimo demum deciduo vestitis, adultis glabris, longitudinaliter rugulosis, albescentibus. *Folia* alterna, versus apicem ramulorum congesta, integra, petiolata, obovato-lanceolata, coriacea, supra laete, subtus pallide viridia, juvenente bistipulata; petiolos 1-2½-pollicaris, angulatus, junior laxe villosus demum glabratus, basi tumescens, subcanaliculatus, apice abrupte calloso-incrassatus, callo subcylindrico 2-3 lin. longo transverse ruguloso, subviscido, modice arcuato ad basim laminae terminante; lamina utriusque glaberrima, 5-9 pollices longa, 1-2½ poll. lata, plerumque obovato-lanceolata, nunc, praesertim in ramulorum extremis, lanceolata, basi sensim attenuata, ad insertionem subtruncata, apice oblique obtusiuscule acuminata, margine integro vel hinc inde obscure sinuato, penninervia, nervo medio basi valido ad apicem usque producto, lateralibus multo tenuioribus in utraque pagina sed subtus argutius prominentibus, versus marginem evanescentibus. *Stipulae* geminae, juxta basin petiolorum laterales, liberae, anguste lineari-lanceolatae, subulato-acuminatae, erectae, rigidae, 2-3 lineas longae, ad ramulorum novellorum apices comoso-gregatae, caducissimae. *Flores* unisexuales, monoici, apicali, sat magni, imo totius tribus maximi, ad ramulos infra foliorum comam apicalem sessiles vel breviter pedunculati, solitarii, vel rarissime 2-3 gregati, bracteis pluribus brevibus, scariosis, late ovatis, extus tomentellis, intus nudis, striatis, demum deciduis, quodammodo calyculati. *Alabastra* globosa vel obovacea. *Calyx* turbinato-campanulatus, sesquipollicem longus, carnosus-coriaceus, extus undique villosus-tomentosus, villo fulvo-cinnamomeo, post fecundationem deciduus; tubus cylindricus sursum quidam dilatatus, diametro semipollicari, intus plurisulcatus et papillis minimis cinnamomeo-aurantiacis plus minus dense obsitus; limbi octofidi, aestivatione induplicato-valvati; laciniae lanceolatae, ¾ pollic. longae, erecto-patulae, margine circumcirca membrana laticuscula, tenuiter caruosa, fragili, induplicata, undulato-crispula cinctae, facie interna papillis tenuibus brevissimis cinnamomeis densissime gregatis velutino-tomentosae. *Androphorum* anguste conicum, dense tomentellum, una cum staminum columna brevi glaberrima et antherarum disco circiter calycis tubo aequilongum; antherae numerosae (25 et plures), rectae, biloculares, arcte inter se in dicum vertice truncatum connatae, singulae fere lineam longae, cinnamomeae. *Gynaeii* circumscriptione obovoidei carpella plurima (60-80) pluriseriatim dense congesta, ascendencia, iuter se libera, oblique elongato-ovoides, dense canescentia, unilocularia, biseriati pluriovulata, ovulis horizontalibus; stigma ad carpellorum apicem oblique sessile, turgidum, obtusum, plus minusve evidenter bilobum, atropurpureum, dense papillosum. *Staminum* imperfectorum basim gynophori annuli ad instar cingentium antherae liberae, plus minusve arcuatae, dorso connectivo crasso sursum curvato adhaerent, illis androphori plerumque breviores, vel varie defigurate, omnino steriles. *Carpella* matura 6-10, rarius plura,

distincta, stipite 2-3 lin. longo, cylindrico vel subcompresso villosa suffulta, magnitudine et figura inter se inaequalia, obovoidea vel clavata, lateribus subcompressa, ceteroquin turgida, 1½-1¾ poll. longa, coriacea, oblique vel recurvato-rostrata, extus tomentosa e viridi flavicantia, interna facie plicato-rugulosa denesque resinoso-punctata, unilocularia, 2- rarius 3-4-sperma, tarde dehiscentia. *Semina* subglobosa vel obovoidea pisi maximi mole et majora, hilo latissimo orbiculato vel ellipsoideo sessilia; testa subcoriacea, laevigata, atra vel atropurpurea, nitida, strato interiori tenaci reticulatum fibroso. *Embryo* exalbuminosus, semini conformis, rectus; cotyledones crasse, hemisphaericae, radicula brevissimam obtuse conicam, plumula pilosa superatam, arcte includentes.

Observatio.—Gynaeii structura et configuratio generis praesentis notabilem cum illa quarundam *Anonacearum* offert similitudinem, etiamsi vera affinitas has inter et *Sterculiaceas*, in systemate sub cohorte longius distante militantes, vix, ac ne vix quidem inveniunda.

Ordo ZYGOPHYLLAE.

ZYGOPHYLLUM. Sectio A. FABAGO.

Subsectio a. *Simplicifolia*.

ZYGOPHYLLUM ORBICULATUM, Welw. n. sp. Glabrum, glaucum, fruticosum, caulibus obliquis vel ascendentibus vix sesquipedalibus, crassis, succulentis, rigidis, cylindricis, subflexuosis, ramis patulis, articulatis, ad nodos leviter incrassatis, foliis planis crassissimis, flabellato-orbiculatis vel summis obovato-spathulatis, bene adultis 2-2½ pollices latis, glaucis, glaberrimis, margine rotundato integris, basi in petiolum brevem euneato-angustatis, internodiis longioribus, stipulis carnosius ovatis obtusis 3-4 lin. longis, pedunculis geminis (vel ternis!) 3-5 lin. longis, fructiferis pollicaribus, floribus pentameris, calycis tarde decidui carnosuli laciniis obtusis, petalis albis longe unguiculatis, calyce duplo longioribus, stamina superantibus, squamis quam filamenta paulo brevioribus, subliberis, albido-membranaceis, apice fimbriatis; ovario clavato, obtuse 5-gono, stylo staminum longitudine; fructu majusculo late pentaptero, depresso obovoideo, vertice parum emarginato stylo apiculato (axi 9-diametro 7-8-lincari, alis semiobovatis elevatim reticulatis), loculicide 5-valvi, loculis endocarpio solubili 1-2-spermis, seminibus dense foveolatis, raphe ex parte libera.

Habitat frequentissimum in sabulosis et petrosis maritimis Distr. Mossamedes, ex Giraul usque Cabo negro, saepius in *Zygophylli simplicia*, *Sesuviorum* et *Vogelia Africana* consortio. Maio-Julio flor., mox et usque ad Sept. fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1637.

Fruticulus dumosus, rigidissimus, 1-2-pedalis, succulentus, quibusdam *Scaevola* vel *Crasnula* speciebus habitu non absimilis, plagae maritimae sabulose vel rupestris decus triste. Caulis pennae olivinae vel hinc inde digiti minimi crassitudine, plerumque tortuosi, ligucescentes epidermide tenui flavofuscescente facile secedente tecti, nunc oppositae nunc dichotome ramosi. Internodia circiter pollicaria. *Folia* simplicia (anne ceu *phyllodia* consideranda?), inferiora et adultiora, petiolo brevi euneato excepto, fere orbiculata, diametro non raro bipollicari et majore (lamina ¼ poll. crassa, succoso-carnosa, in viva planta, more phyllodiorum *Acaciarum* verticaliter sita), ea ramulorum novellorum flabellato-spathulata, nervis 3-5, solum in folio exsicato prominentibus percursa et minus glauca; pedunculi 2 vel 3 (rarius sed quondam certe plures ad 5) ex eadem stipularum axilla erecti, fructiferi elongati et patentes. *Calycis* herbaceo-viridis lacinae carnosae-tumidulae, obovato-oblongae, obtusae, concavusculae, post anthesin reflexae. *Petala* flabellata, ungue longo, lateribus integra, apice rotundata

denticulata, nervis purpurascensibus flabellatim partitis percuraa, una cum ungue $3\frac{1}{2}$ –4 lin. longa. *Squamæ* circiter $\frac{1}{2}$ longitudinis filamentorum, filamenta quasi vaginantes. *Ovarium* in disco leviter concavo sessile 5-loculare, ovula in loculis 4 vel 5. *Fructus* plene maturus scariosus, plerumque calyce reflexo suffultus, circumscriptione obovoideus, basi truncatus, vertice quidquam depresso sive emarginato styloque indurato 1–1 $\frac{1}{2}$ lin. longo superatus, ad axim usque pentapterus; alæ compressæ, nervo hinc inde evanescente marginatæ, demum ab axi centrali solubiles; loculorum endocarpium solubile, tenuiter pergameum, nitidulum. *Semina* in loculis 1 vel 2, obovato-subreniformia, lenticulari-compressa, marginata, 2–2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, testa brunnea foveolis alveoliformibus dense obsita.

Ordo BURSERACEÆ.

Trib. I. BURSEREÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. v. i. p. 321.

PAIVAËUSA, Welw. gen. nov.

Flores unisexuales, axillares, apetalæ; masculi subsessiles, plures in capitula involucreta breve pedunculata dense congesti; feminei solitarii vel foliorum abortu subfasciculati, breviter pedunculati.

FLORES MASCULI. *Calyx* subobliquus, profunde 6–8-fidus, laciniis obtusis, erectis, sepius inæqualibus, æstivatione imbricatis. *Stamina* 6–8 fundo calycis circa discum crenatum inserta, exserta; filamenta filiformia glabra; antheræ breves, erectæ, biloculares, loculis basi subliberis lateraliter dehiscensibus. *Ovarii* rudimentum obsoletum.

FLOR. YEM. *Calyx* maris, sed amplior et basi ad latus externum tribracteolatus. *Ovarium* ovoideum in stylum attenuatum, basi squamulis 6–7 brevibus minutis ciliatis non raro in discum confluentibus cinctum, biloculare; stylus brevis; stigmata duo reniformia; ovula in loculis gemina prope apicem loculi septo inserta, pendula. *Fructus* (immaturus) pedunculo elongato tribracteolato et calyce persistente stipatus, ovoideus, longitudinaliter bicostulatus, stigmatibus persistentibus terminatus, tomentosus; epicarpium coriaceum bivalve; putamen chartaceum incomplete biloculare, pyrenibus 1–2 in quoque loculo; pyrenes ossei, compressi, membrana carnosulo-mucosa obducti, ex apice columellæ centralis funiculo crasso penduli, liberi, monospermi. *Semen* loculo conforme, inversum, compressiusculum, testa membranacea, endopleura solubili. *Albumen* 0. *Cotyledones* rectæ, planæ, late obcordatæ, ad radiculae insertionem emarginatæ, tenuiter membranacæ, virides; radícula brevis, recta, cylindrico-conoidea, obtusiuscula, supera.

Arbor parva Africæ austro-tropicalis, coma laxa ramulis crassis tuberculato-cicatratis, cinerascensibus, gemmis novellis rufo-tomentosis. *Folia* ad apices ramulorum patentia, longe petiolata, digitato 5-foliolata, foliolis subsessilibus lanceolato-vel obovato-oblongis obtusiusculis integerrimis cum petiolo articulatis, coriaceis, subtus tomentosis. *Flores* parvi, inconspicui; feminei solitarii, masculi numerosi cymoso-fasciculati, cymis in capitula densa bracteis involucreta contractis.

Genus insigne sed valde anomalum, *Burseraceis* quidem absque fere dubio adnumerandum, ast nulli ex generibus cognitis arcte affine, imo ab omnibus hucusque descriptis floribus apetalis, cotyledonibus omnino planis foliisque digitatim 5-foliolatis longius distans, et probabiliter novæ inter tribum *Burseracearum* sectionis typus. Calyx 6–8-fidus una cum staminibus 6–8 prope marginem disci insertis et inæqualibus necnon pyrenes liberi aliquam cum genere *Protium* affinitatem indignant; petalorum defectus forsitan ex cymularum perplurium arcta condensatione florumque singulorum mutua pressione explicandus.

Dicatum est genus hocce clarissimo domino Barão do Castello de Paiva, botanices in Academia Portensi Professori, Faunæ malacologicæ Maderensis etc. fortunato exploratori.

Species unica :—

PAIYAEUSA DACTYLOPHYLLA, Welw. (Tab. VII.)

Habitat in silvis parum densis siccioribus Districtus Huilla, ad 5000 ped. circiter altitud., inprimis inter pagum Lopollo et flumen Monino, ubi specimina c. flore et alia cum fructu immaturo legi Februario 1860. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 452.

Arbuscula 8–15-pedalis, aspectu *Viticia* speciem quodammodo referens, trunco recto $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ped. diametri, cortice aspero late rimoso, cinerascens vel fere nigrescens, coma laxiuscula sursum dilatata; rami patuli arcuato-ascendentes, crassi, rigidissimi, fere cinerei, undique foliorum delapsorum cicatricibus in tubercula aspera elevatis obsiti, saepius varie curvi vel tortuosi, parce ramellosi, ramellis crassiusculis abbreviatis, novellis fulvo-sericeis vel rufo-tomentosis, apicem versus foliiferis. *Folia* patentia, alterna, longe petiolata digitato-5–rarius 3–rarissime 7-foliolata, paulo ante florescentiae periodum decidua; petioli 2–3 pollices longi, rigidi, subteretes, molliter sericeo-tomentosi, basi tumescens cum ramulo articulati, apice subcompresso-dilatati; foliola penninervia, obovato-oblonga, nunc fere lanceolata vel lineari-oblonga, apice obtusa vel rarius breviter acuminata, basi sensim angustata, subsessilia vel breve petiolulata, cum petiolo communi articulata, supra, inprimis juniora, pube tenui adpersa pallide virentia, juxta costam mediam densius pubescentia, adulta fere glabra et nitida, subtus nervo mediano crasso pinnatim venuloso percurta, dense molliter tomentosa, tomento primum ex albidio cinereo, demum flavo-fuscescente; foliola 3 superiora inter se subaequalia, $2\frac{1}{2}$ –5 poll. longa, 1– $1\frac{1}{2}$ poll. lata, intermedium longius petiolulatum, infima duo reliquis duplo triplove breviora angustioraque et plerumque sessilia vel brevissime petiolulata. *Flores* dioici, versus apicem ramulorum axillares, nunc foliorum summorum lapsu vel abortu spurie terminales, utriusque sexus apetali. *Masculi* plures 30– ∞ minuti ad pedunculum communis perbrevis crassiusculi cylindrici apicem carnosum-incrassatum [quasi anthodium fingentem] sessiles vel uno alterove brevissime pedicellato, subcymuloso-fasciculati, densissime in capitulum involveratum congesti; involucrum obliquum 6–8-lobum, lobis ovato-oblongis vel suborbicularibus, florum capitulo fere dimidio brevioribus ipsoque adpressis. *Calyx* viridescens, saepius obliquus, plus minusve profunde 6–8-fidus, lacinii erectis, aestivatione imbricatis, lineari-oblongis vel spatulatis, inaequilongis, etiam latitudine inter se non raro variantibus, dorso, inprimis apicem versus, barbulatis, margine ciliatis, intus nudis. *Stamina* 6–8 circa basim disci crenulati parum elevati, ob mutuum florum pressionem sat polymorphi inserta, calycis lacinii longiora; filamenta filiformia, compressiuscula, glabra, albidia; antherae erectae, filamentis multo breviores, paulo supra basim insertae, flavae, loculis turgidis, minute glanduloso-punctatis basi subliberis, latere dehiscentibus. *Ovarii* rudimentum rarissime minimum, plerumque nullum. *Flores feminei* quam masculi multo ampliores, nunc solitarii, rarius folii unius alteriusve abortu 2–3 fasciculati, subsessiles vel breve pedunculati, rigidi. *Calyx* maris sed ipso multoties major et crassior, minus profunde et plerumque 6-partitus, dense rufo-tomentosus, intus glaber, basi tribracteolatus, bracteolis calycis lacinii similibus, pariter rufo-tomentosis sed iis multo brevioribus. Squamulae ovarii basim cingentes saepius in anulum disciformem confluentes, minutae, tenuiter ciliatae. *Ovarium* ovoidum, aequae rufo-tomentosum, calycis limbum erecto-patulum parum superans; stigmata turgida fusco-purpurea. Cetera ex caractere generis.

Ordo MELIACEAE.

Trib. MELIEAE, Hook. et Benth. gen. pl. i. 330.

NAREGAMIA ALATA, Wight et Arn. β *Africana*, Welw. Forma vel, si mavis, varietas, a specie typica in Wight Icon. Pl. Ind. Orient. i. tab. 90 depicta, et in ejusdem auctoris Prodr. Florae Penins. Ind. Orient. i. 116, descripta, *caulibus* et *foliis calycibusque hirtulo-pubescentibus* nec non calycis lobis *latioribus* fere *deltoido-ovatis acutiusculis* discrepans.

Habitat in arenoso-humosis subumbrosis juxta margines silvarum pro maxima parte e *Macrobobii* et *Pterocarp*i speciebus consistentium Distr. Pungo-Audongo, ad 3100 ped. circiter altit. supra mare, inprimis ad sinistram rivi Lutete. Ineunte Octobr. cum fl. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1301.

Suffrutex humilis, subscapitose crescens, totius *Meliacearum* Ordinis stirps minima, ast floribus pro more permagnis ornata, habitu quodammodo *Turrae* speciem pygmaeam referens; rhizoma repens vel oblique dependens, pœnæ corvinæ vel rarius anserinæ crassitudine, dure lignosum, tortuosum, fibris lateralibus tenacibus stipatum, collo pluricipite. *Cauliculi* 2-3 vel interdum plures, 1-3 pollices alti, teretes, subsimplices, basi nudiusculi, superne pubescentes, foliis alternis paucis (5-8), superioribus in eorum axillis flores gerentibus vestiti. *Foliorum* trifolioratorum petioli 3-6 lin. longi, anguste alati pubescentes; foliola subsessilia obovata, apice rotundato integra vel obiter emarginata, rarius ovato-acuminata, omnia facie utraque pubescentia et margine densæ ciliata. *Pedunculi* axillares petiolis subaequilongis, erecto-patuli, puberuli, saepius bi- triflori, pedicellis bracteolatis inaequilongis, lateralibus abbreviatis plerumque flores abortientes gerentibus, intermedio longiore, calycem versus quidquam dilatato et flore perfecto terminato. *Calyx* vix lineam longus, pubescens hirtulusve; corolla 1-1½ poll. longa, splendide alba, parum sed suaviter odora; petala anguste spatulata longe unguiculata apice obtuso concaviuscula, sub prima anthesi conniventia, demum apice patula. *Antheræ* quidem saepius 5, ast hinc inde etiam 6, et in uno flore imo 7 observavi, earumque appendicule fere semper latiores et obtusiores quam in speciminibus Indicis herbarii Kewensis, ab ipso clar. Wight collectis. Ceteroquin stirps Angolensis quoad characteres essentialia et habitum omnino cum specie Indica convenit, novumque Floræ Indiæ Orientalis cum Tropicali-Africana nexus argumentum sistit.

Ordo HAMAMELIDEE.

MYROTHAMNUS, Welw. gen. nov.

Flores dioici spicati; spicæ amentiformes squamis unifloris.

FLOS MASC. *Perianthium* nullum. *Stamina* 4-5, saepius 5; filamenta brevissima in stipitem brevem basi squamæ iusertum concreta; antheræ magnæ, basifixæ, oblongo-quadratæ, loculis aduatis, rimis lateralibus dehiscentibus, connectivo in rostrum subulatum breviter producto. *Ovarii* rudimenta nulla.

FLOS FEMIN. *Perianthium* nullum. *Staminum* rudimenta nulla. *Ovarium* sessile, squama longius, oblongo-ovoidæum, obtuse trigonum, tricarpellare, trilobulare, apice trilobum, carpellis apice in stylos breves recurvos subspatulatos intus late stigmatosos productis; ovula numerosa, angulo interiori loculorum biserialiter inserta. *Capula* coriacea, ovario similis, sed paucio turgidior, carpellorum apice divaricato intus dehiscente, polysperma. *Semina* minuta, ovoides, oblique pendula, funiculo brevi, hilo vix conspicuo, testa tenuiter coriacea, raphe tenui; albumen copiosum carnosum. *Embryo* minutus, albumini immersus, oblongus, cotyledonibus brevissimis, radícula brevi crassa.—*Fruticulus* 1-3-pedalis, rarius frutex 6-7-pedalis, Africæ australis tropicæ et subtropicæ, balsameo-resinosus, rigidus, virgatus, glaberrimus, a basi ramosus, ramis ramulisque strictis oppositis, petiolis stipulisque persistentibus subspinulosis. *Folia* opposita brevissima petiolata, cum petiolo articulata, coriacea, flabellato-cuneiformia, subacuta, apice crenato-dentata, longitudinaliter plicato-nervosa, in petiolum brevem latiusculum subvaginantem angustata; stipule parvæ, subulatae, in apice vaginæ petioli sitæ. *Spicæ* strictæ, cylindraceæ, erectæ, ramulos breves crebros terminantes.

Myrothamnus flabellifolia, Welw. Apont. phytogeogr. Angol. p. 578, nota 8 (1858).

C.iffortia? flabellifolia, Sond. in Harvey et Sond. Fl. Cap. ii. 597 (1862).

Planta exogena anomala, &c., Thomson in Append. ad Speke, 'Journ. of the Discovery of the Source of the Nile,' p. 468 (1863). [Clar. Dr. Thomson solum pl. masc. vidit.]

Genus summopere curiosum ast quoad ordinem, cui subscribendum, quidquam dubium, secundum acutissimi Hook. fil. sententiam *Hamamelideas* inter et *Saxifragaceas* ambiguan. *Hamamelideis* tamen affinius videtur. Habitu hinc *Tetracarpæam Tasmanicam* Hook. fil. (*Saxifragacea*) illinc quasdam *Myricæ* vel *Cliffortie* species simulat, a quibus tamen florum, inprimis femineorum, et fructus forma longius distat. A *Saxifrageis*, cum quibus genus nostrum notis non paucis, et præcipue gynæcii structura trimera, ovulorum numero et situ nec non albumine copioso congruit, tamen floribus strictim dioicis, absentia omnis perianthii et disci, staminibus denique basi in stipitem concretis nec liberis et, quod forsitan non omnino prætervidendum, succo balsameo-resinoso omnium partium differre videtur. A *Rosaceis*, quas inter planta nostra *Spiræarum* tribui gynæcii fabrica aliquantulum accedit, nihilominus ob flores dioicos, calycis et corollæ defectum, staminum numero diminuto et albuminis copiosi præsentiam excludenda erit.

Juxta systematis Endlicheriani principia genus *Myrothamnus* prope *Salicinas* collocandum esse videtur, quocum ordine floribus unisexualibus, absque ullo perianthio, in amentis ramulos terminantibus dispositis, staminum numero variante et filamentis inferne coalitis, carpellorum stigmatumque dilatatorum structura, eorumque ovulis numerosis, succo denique balsameo, in quibusdam *Populi* speciebus pariter obvio, et quodammodo etiam habitu et vitæ tenacitate convenit, etiamsi imo hac in vicinitate ob ovarium trimereum, albumen copiosum et folia opposita anomalum genus remanet.

Species unica.

MYROTHAMNUS FLABELLIFOLIA, Welw. l. c. t. viii.

Habitat in dumetosis rupestribus editioribus Distr. Pungo Andongo, inprimis in Serra de "Pedras de Guinga" inter 3000 et 4000 ped. altit., nec non in Distr. Huilla ad 5000–5500 ped. altit. loco "Morro de Lopollo" dicto. Decembr. Jan. floret; Apr. Maio fructificat. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1278 et 1279.

Stirps singularis fruticulus sistit plerumque 1–3-pedalem, sed in editis Distr. Huilla etiam humilem vidi et prostratum, *Salicem alpestrium* more Lichenum Muscorumque caespitibus incumbentem; e contrario, expositione et solo magis faventibus semper erectus crescit et altitudinem multo majorem attingit; sic in Distr. Pungo Andongo, ubi in rupibus giganteis "Pedras de Guinga" dictis circa earum summam juga ultimam et fere unicam vegetationem fruticosam offert, frequens ceu frutex 5–7-pedalis occurrit, trunco interdum prope basim circumferentia 3–5-pollicari. Cortex cinerascens, longitudinaliter late lamellosus, lamellis tenuibus facile secedentibus. Lignum album, densum, durum, grate aromaticum. Rami inferiores pauci, distantes, medium caulis versus frequentiores et densiores ramulisque crebre ramellosis decussatim oppositis, strictis, virgatis, novellis quadrangulis late purpurascensibus, adultioribus cylindricis et cinereis, $\frac{1}{2}$ –1 pollicem inter se distantibus, ad apicem usque foliosis. Folia 5–7 lineas longa, 3–4 lin. lata, quoad figuram descripta apice plus minusve profunde dentata [dentibus 3–10, sæpius 6, obtusis vel acutiusculis, apice glandula terminatis], tempore humido erecto-patula, flabellatim expansa, utriusque glauco-viridia, durante autem hieme sicco arete plicata et convoluta, brunneo-nigrescentia, et ramulis strictim adpressa; petioli semamplectentes, longe decurrentes, superiore parte carinati, apice excepto adnati et internodium vaginantes, adultiorum foliorum lamina delapsea, a ramulis subsoluti et una cum stipulis induratis per

longius tempus persistunt, demum per lamellas secedunt ramulosque denudant. *Spice* utriusque sexus amentiformes, in ramellis lateralibus crebris abbreviatis foliosis terminales, strictiusculæ, graciles, $\frac{3}{4}$ -1 pollicem longæ, ad $1\frac{1}{2}$ -2 lin. latæ, cylindricæ, obtusiusculæ, masculæ fere semper omnino rubentes, feminæ virscentes. *Squamæ* florigeræ lato-ovatæ, obtusiusculæ, basi subcoarctatæ, rachin semiamplexantes, per paria oppositæ, concavæ, dorso obiter carinatæ, herbaceo-virides vel leviter rubentes, margine subscariosæ, quoad substantiam subcoriaceæ et rigidulæ, illæ florum masculorum staminibus fere æquilongæ, dum quæ flores femineos stipant, ovario multo breviores. *Stamina* 4-8, sæpius 5, basi squamæ inserta, sub anthesi ob squamam patulam exserta; filamenta perbrevia, supra libera, basi in stipitem brevem coalita; antheræ ex aurantiaco rubentes, loculis valde turgidis, post deliscentiam late hiantibus exsiccato-induratis; pollen intense flavum. *Ovarium* herbaceo viride; stigmata atropurpurea, dense papillosa. *Ovula* in quoque carpello 12-16, quorum tamen perpauca plenam maturitatem attingunt, nam sæpius solummodo 2-5 semina in capsula deliscente inveniuntur. *Capsula* $1\frac{1}{2}$ lin. longa, lineam lata, stylis induratis persistentibus tricornis, trivalvis, valvis (carpellis) apice hiantibus, interne juxta suturas omnino solutis, unilocularis, pleiosperma. *Semina* etc. descripta.

Observatio.—Stirps in vivo admodum elegans et ob aroma gratissimum quod spargit, apud Nigritas Angolenses nomine "*Cachinde candange*" ceu *tonicum* validum celebrata, per Africam austro-tropicam, ut videtur, late diffusa, a celeb. peregrinatoribus Speke et Grant etiam ex Africa centrali [6° lat. austr.], sed solum floribus masculis adlata, a clar. Zeyher quoque trans Cancrum, in interioribus territorii Capensis [Magalisberg], ast solum modo sterilis, lecta.

Vis vitalis fruticis hujus ingens est; per anni dimidium enim, nempe a Maio ad Octobrem, imbris tum omnino deficientibus solis ardore adustus, in statu quasi exsiccato perdurat, foliis nunc arcte convolutis, induratis, ramulo strictim adpressis, nigrescentibus siccisque, imo digitorum tritu facile pulverizandis, fere emortuus adparet, patriæ suæ ardentis tristis imago; ast statim primas post pluvias vernaes omnimodo reviviscit, foliorum nunc de novo viridium flabella expandit, sicque læto virore ornatus flores fructusque progignit.

Ordo COMBRETACEÆ.

Subordo I. COMBRETÆÆ.

CACOUCIA, Aubl. nec Walp.* [Schousboæ, Willd. nec Schum.]

CACOUCIA PLATYPTEA, Welw. n. sp. *C.* fruticosa, scandens, hinc arbuscula stans, ramis patentibus, elongatis, arcuatis, ramulisque rigidis cylindricis juventute pubentibus; foliis oppositis v. rarius alternis, coriaceis, glabris, lucidis, breviter petiolatis, oblongis, ovatis v. ovato-lanceolatis, integerrimis apice sensim v. abrupte in cacumen obtusum productis, basi breviter attenuatis, rotundatis v. subcordatis; racemis ad ramulos laterales et apices caulis terminalibus, amplis, elongatis, subdensis, undique sericeo-tomentosis, strictis; bracteis flore evoluti plus quam dimidio bre-

* *Cacoucia cordifolia*, Walp. Rep. ii. p. 68, certe non est *Combretaceæ*, sed *Euphorbiaceæ*, et probabiliter *Alchornea* species, a Schum. Deser. of Guin. Plant. ii. p. 223 [edit. separ.] sub nomine "*Schousboæ cordifolia*" descripta. Beati Schumacher l.c. expressis verbis affirmat *Schousboæ* suam a genere homonymo Willdenovii *diverzam* esse, et ab ipso institutam, quoniam Willdenovii *Schousboæ*, lege prioritatis, generi "Cacoucia," Aubl., ceu *synonymum* subscribenda.

vioribus; tubo calyceino obtuse pentagono, limbo intus ad basin disco carnosio cupuliformi margine libero 5-plicato fasciculatimque piloso vestito; fructu membranaceo late 5-alato, circumscriptione, alis inclusis, ellipsoideo-sphaerico, diametro sesquipollicari, alis aequalibus, semiorbicularibus, levigatis, chartaceo-rigidulis, transverse striolatis, singulis medio 8-9 lin. latis, margine obscure denticulato-vel crenulato-ciliatis, nucleo lineari-oblongo, medio tumidulo verticaliter impositis.

Habitat in Districtu Golungo Alto dumetosis altioribus juxta margines silvarum primitivarum, inprimis in Serra de Alto Queta, ad 2000-2300 ped. alt. Floret Aprili, Maio; fructificat Aug., Sept. *Excic.* Welw. Iter Angol. no. 1752.

Caulis primarius rectus, cylindricus, cortice e viridi cinerascete sublevigato, ad altitudinem 3-5 ped. nudus, mox inordinate elongato-ramosus, ramis plerumque sursum arcuatis, vetustioribus glabris et viridi purpurascens, ramulis oppositis, novellis pube albido-sericea obtectis. *Folia* majora una cum petiolo $\frac{1}{2}$ -1-pollicari basi plerumque plus minusve curvato 5 pollices longa, 2-2 $\frac{1}{2}$ poll. lata, perennantia, utraque facie et inprimis supra valde nitentia, intensissime viridia, rigida, subtus paullo pallidiora, costa valida elevatim semicylindrica percursa, penninervia, reticulatim venosa, non raro in eodem specimine opposita vel alterna, rarius ternatim verticillata. *Racemi* spicaeformes, validi, substricti, cloungati, robustiores pedales vel etiam sesquipedales, nunc simplices nunc basi patentem ramosi, subdensi, undique, id est inclusis bracteis, calycibus et dorso petalorum, tomento sericeo, in vivo albido, exsiccatione demum ferrugineo vel fuscescente obduti. *Bractee* florum inferiorum perfecte evolutorum calycis medium vix attingentes, lanceolatae, acutae, demum deciduae. *Flores* speciosi, demum staminibus longe exsertis pollicares vel paullo longiores, amantissime roseo-coccinei, breve pedicellati, sub plena anthesi plus minusve patentes, subcaroso-rigiduli, in racemos ambitu cylindrico-conicos apicem versus densiores dispositi. Tubus calycinus, ovarium obducens, obtuse pentagonus, vix 2 lin. longus, lineam latus, medio tumidulus, supra ovarium abrupte in limbum (demum caducum) tubuloso-campanulatum, modice arcuatum, intus pilosulum dilatatus, ore 5-fido, lobis deltoidicis crecto-subpatulis; discus fundum limbi calycini ovario insidentem vestiens, carnosus, cupuliformis, adnatus, ore libero 5-crenato, crenis plicaeformibus obtusis, laete flavis, glandulas fingentibus, apice fasciculatim barbatis. *Petala* ovata vel ovato-lanceolata, brevissimae unguiculata, calycis lobis parum longiora, abrupte acuminata, intense coccinea, carnosula, dorso pube albida, in vivo vix sine lente perceptibili, demum rufescente vestita, planiuscula et recta. *Stamina* 10, calycis limbo prope medium inserta, longo adnatis decurrentia, alterna altius adnata, omnia longe exserta; filamenta filiformia juxta tubi calycini directionem curva, aestivatione inflexa; antherae cordato-ovoides, dorso ad emarginaturam fixae, intense flavae. *Ovula* plerumque 4, ex apice pendula. Stylus filiformis, staminibus vix brevior, stigmatibus subtruncato vel rarius tenuissimè lobulato. *Fructus* adulescentes primum lineari-oblongi, dein oblongo-ellipsoidei, una cum alis, illo tempore adhuc brevibus, flaccidis et margine subundulatis carnosuli et ex albido virentes, solummodo versus ulteriorem maturitatis periodum formam in diagnosi notatam coloremque roseum et rigiditatem chartaceam acquirunt. *Fructus* maturi corpus, dentis alis, elongato-ellipsoideum, obtuse pentagonum, utriusque aequaliter attenuatum, membranaceo-fibrosus et subspongiosus. *Semen*, a me nonnisi in speciminibus siccis examinatum, fructus cavitati pentagonae conforme, aliquantulum compressum, circiter 9-10 lin. longum, testa membranacea laxiuscula fusca. *Embryonis* recti cotyledones crassiusculae, carnosae, convexo-planae vel subsemicylindricae, anguste oblongae, obtusae, dorso convexo longitudinaliter paucisulcatae, interna facie plana levigatae, apicem versus quidpiam concavae ibidemque marginibus breviter inflexis semivaginatim conjunctae. Radicula perbrevis obtuse conica.

Stirps perbella, sempervirens, ob fructus pro more amplos et colore roseo insignitos in statu fructifero non minus quam in florifero decora, inter Combretaceas Angolae et forsitan Africae totius facile

formosissima, quodammodo florum *Alois arborescentis* spicas fulgidas frutici lucide frondoso impositas exhibens; nunc ad arbores vicinas altius scandens, nunc sub forma arbusculæ 6-8-pedalis laxè comosæ in dumetis silvas densas cingentibus hinc una cum *Bandiera speciosa* et *Dalhouisia bracteata* superbiens, illinc in *Camoënia maxima* et *Eureiandra formosa* societate fruticeta adornans et una cum socialibus indicatis Adonistis admodum commendanda.

Observatio.—Species typica hujus generis *Tropico-Americana*, *Cacoucia coccinea*, Aubl. Plant. Guian. i. p. 450, t. 159, habitu cum nostrate *Africana* fere omnino convenit, sed præter alias notas inprimis fructu *coriaceo pentagono exalato* facile a nostrate distinguenda.

Subordo II. GYROCARPÆ (Benth. & H. f. Gen. Pl. i. p. 689).

ILLIGERA PENTAPHYLLA, Welw. n. sp. *I.* caule basi lignescente, obiter angulato, sparse hirtulo, late scandente, ramis patentibus elongatis, junioribus cano tomentellis; foliis sparsis longe petiolatis, digitatim quinquefoliatis, foliolis breve petiolulatis, ovatis, oblongo-ellipticis vel ovato-lanceolatis obtuse acuminatis, basi rotundata subemarginatis, margine integerrimis, utrinque glabris, juvenilibus crebre pellucidopunctatis, adultis coriaceis, intense viridibus, subtus pallidis, inter nervos pilis adspersis venis atropurpureis elevatim reticulatis, sub lente dense punctulatis; floribus laxè cymosis, in paniculis axillares et terminales foliis longioribus dispositis, pedunculo, cymarum ramulis bracteisque et calycis tubo dense cano tomentellis; petalis calycis lobos herbaceos subæquantibus sed iis angustioribus et flavescentibus, sub anthesi stellatim patentibus; fructu rigide chartaceo, corpore elongato-ovoideo subcompresso-4-gono, utrinque attenuato, late verticaliter bialato, alis circiter 15 lin. altis et sesquipollicem latis, rotundato-obtusis, planis et dense transversim parallelivenosis.

Habitat in Districtu Golongo Alto editoribus de "Serra do Alto Queta" juxta oras silv. primitivarum, sed sporadica. Nov.-Decbr. florens, Martio-Majo fructificans. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1753.

Frutex parum alte lignescens, sempervirens, habitu et crescenti modo varias *Cissii* vel *Vitis* species eximie æmulans. *Caulis* primarius cylindraceus, mox ad 2 vel 4 ped. altitudinis in ramos 6-15 pedes longos divisus. *Rami* paullo supra foliorum axillas oriundi, late patentés, parum angulati, tenuiter dense sulcati, etiam adultiores hinc inde pilis raris adspersi, petiolorum reflexorum ope vel ipsorum torsione spirali per arborum vicinarum coronas scandentes vel ex iis penduli; ramuli novelli et inflorescentia tota, calycis limbo petalisque exceptis, tomento plus minusve denso, canescente, exsiccatione demum rufescente obducta. *Petioles* circiter 2 pollices longi, rigiduli, basi gibboso-incrassati, initio recti, horizontaliter patentés, demum deorsum flexi, medio non raro bis terve spiraliter intorti, apice paullo incrassato in petiolulos quinque circiter 3-5 lineas longos, canaliculatos, juxta excavationem hirtulos, cum petiolo articulatos, fere umbellatim dispositos divisi. *Foliola* quoad laminæ figuram inter se æqualia (terminale tamen ceteris majus, paullo longius petiolulatum, circiter 3 poll. longum, medio 2 poll. latum), penninervia (nervo mediano costisque utrinque binis tribusve arcuatis inferne prominentibus, apicem versus sensim evanescentibus), supra intusissime lucido-viridia, subtus multo pallidiora, juxta nervos pilis raris rectis rigidulis obsita, margine integerrimo obiter reflexo. *Panicule* laxè, pyramidatim thyrsoides, terminales, non raro sesquipedales, axillares breviores. *Pedunculus* communis obtuse angulatus, aphyllus, ramis fere horizontaliter patentibus, ad insertionem tumidis, inferne longius nudis, a medio ad apicem usque ramulis cymuligeris, pluries dichotome partitis, extremis basi bractea elongato-ovali munitis, vestitus. *Pedicelli* brevissimi cum flore articu-

lati ibidemque bracteolis tribus ovato-lanceolatis, tubum calycis longitudine vix superantibus, patulis vel recurvatis instructi. *Florum* sub plena anthesi diameter transversalis circiter semipollicaris vel saltem 5-linearis. *Calycis* tubus oblongus, rectus, linea una vix longior, obtuse tetragonus, dense canescens, supra ovarium abrupte in limbum subcampanulatum, carnosulum, glabrescentem, herbaeco-viridem, 2½–3 lin. longum, fere ad basin 5-fidum (in alabastro late ovoideum) dilatatus, laciniiis sub anthesi stellatim patentibus. *Petala* calycis laciniiis æquilonga sed iis angustiora, acutiora, tenuiora et pallide flavescentia, basi pilosula. *Staminodia* ad externam ejusvis filamenti basin gemina, in alabastro late ovata, obtusa, filamentis paulo breviora, in flore expanso angustiora, subspatulata, dorso obiter excavata, filamentis multoties breviora, turgidula, albidia. *Filamenta* filiformia, firma, pubescentia; antheræ ample, aduatae, oblongo-clavatae; loculi oppositi connectivo crassiusculo late purpureo apice obtuso separati, valvulis modice convexis, flavis, rigidulis, oblique *extrorsum* [nec uti in *Laurineis sursum*] flexis dehiscences; pollinis granula intense flava, pro more sat magna, spheroidica et undique tenuissime echinulata. *Disci* pilosi glandulæ in pluribus floribus oblitteratæ, vel saltem mihi non conspicuæ. *Ovarium* generis. *Stylus* staminibus vix longior, inferne cylindricus puberulus, apicem versus infundibuliformis, hinc latere fissus, limbo reniformi-dilatato margine iucrassato undulatoque stigmatoso. *Fructus* plene maturus, inclusis alis transversim ¾ poll. latus, 1½ poll. altus, subsiccus, rigidus, fusco-badius, corpore [drupa] spongioso-coriaceo, elongato-ovoidico, compresso tetragono, angulis facierum brevissime vel vix alatis, lateralibus vero in alas amplas supra descriptas extensis. *Semen* e cylindrico subcompressum, circiter semipollicem vel 7 lineas longum, testa membranacea. *Cotyledones* rectæ, crassæ, amygdaloideo-carnosæ, fere semicylindricæ, 5 lin. longæ, interna facie concaviuscula, *evidenter petiolata*, radiculam superam, retractam, acutiuseculi conicam, plumula sat conspicua coronatam amplectentes.

Observatio.—Omnes sex *Illigeræ* species hucusque descriptæ aut indicatæ [De C. Prod. xvi. p. 250] vel Indiæ orientalis peninsulam, vel insulas Java, Sumatra et Timor inhabitant, omnesque a specie supra proposita Tropico-Africana foliis *tri-* nec *quinquefoliolatis* sine negotio distinguendæ. In eodem territorio distr. Golungo Alto, sed locis humidioribus magisque umbrosis varietas obvenit, a forma supra descripta folioli duplo longioribus nec tamen latoribus sed basi evidentius emarginatis discrepans, ceteris autem characteribus omnibus optime cum forma typica conveniens.

Ord. PASSIFLOREÆ.

I. BASANANTHÆ (Peyr. in Schlecht. Bot. Zeit. 1859, p. 101, et in Wawra und Peyr. Sert. Benguel. p. 29.)

CHARACT. REFORMATUS.—*Flores* hermaphroditi. *Calyx* profunde 5-partitus, tubo brevi explanato, limbi laciniiis lineari-oblongis, obtusiusculis, campanulatim conniventibus vel patulis. *Petala* 5, linearia, calycis laciniiis subæquilonga, iisque angustiora. *Corona* membranacea simplex, filameutosa. *Gynophorum* cupulare, breviter stipitatum, stipite simplici vel annulo carnosio cineto. *Stamina* 5, basi ovarii inserta, filamentis hypogynis filiformibus; antheræ lineari-oblongæ, sagittatæ, apice obtusæ, connectivo non producto. *Ovarium* ovoidicum, sessile, basi attenuatum; stylus gracilis, mox trifidus, cruribus filiformibus, stigmatibus capitellatis. *Ovula* 3 placentis totidem inserta. *Capsula* ovoidea, subcoriacea vel crustacea, 3-valvis, 3-sperma. *Semina* oblongo-subreniformia, compressa, testa scrobiculata, uno latere tenuiter marginata, arillo nullo, funiculo crasso elongato arcuato.

Herbæ perennes vel suffrutices graciles, in regni Benguellæ littore nec non interioribus editis hucusque observatæ, a basi ramosæ, caulibus ascendentibus vel decumbentibus, undique glaberrimæ. *Folia* alterna, petiolata, cordata vel lanceolata, serrata. *Stipulæ* subulatæ vel filiformes. *Cirrhii* proprii

nulli, nisi pedunculorum in caulis parte inferiore frequenter abortientium cruribus, apice obtuso glanduliferis, bracteolis setiformibus induratis et varie incurvis instructis, representati. *Flores* axillares pedunculati, in pedunculo bifurco gemini vel rarius solitarii, albidii, suberecti vel nutantes, pedicellis 3-bracteolatis. *Fructus* penduli. Genus floribus hermaphroditis et corona filamentosa *Eu-Pasifloreis*, placentis autem pauciovulatis et habita, quodammodo *Tryphostemati*, Harv., simili, *Modeccaram* Tribui accedens, inter ambos, uti optime monuit clar. generis auctor, intermedium. Duæ hucusque mihi cognitæ species: typica nempe, ob characteris speciei expositionem huc inserenda, et altera nova, mox infra exponenda.

1. *BASANANTHE LITORALIS*, Peyr. Sert. Beng. p. 30. Suffruticosa, 1-2-pedalis, a basi ramosa, ramis virgatis arcuato-ascendentibus, simplicibus vel medio patenti-ramulosis, foliis membranaceis, petiolatis, lanceolatis, basi in petiolo utrinque papillis elongatis fimbriato decurrentibus, apice mucronatis, margine acute serratis; pedunculis bi-, rarius unifloris, erecto-patulis; pedicellorum bracteolis verticillatis, calycis laciniis petalisque sub anthesi stellatim expansis. Descript. uberior apud Peyr. l. c.

Habitat in arenosis maritimis breve dumetosis inter urbem Benguella et flumen Catumbella, præcipue ad dextram rivi Maribondo, ubi Junio 1860 floriferam et fructiferam legi. In eodem fere loco a cl. Wawra mense Januario c. flore et fr. lecta fuit. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 872.

Observatio.—Specimen typicum hujus speciei examinare non mihi licuit, ast mea specimen cum descriptione auctoris optime congruunt, notis solummodo minoris momenti, ex. gr. petiolorum fimbriis etc. discrepantia.

2. *BASANANTHE NUMMULARIA*, Welw. n. sp. (Tab. IX.) Herbacea, basi suffruticulosa, vix palmaris, caulibus cæspitosis decumbentibus crebre ramulosis, ramulis ascendentibus foliosis, foliis chartaceo-rigidulis, breve petiolatis, cordato-suborbiculatis, basi in petiolo canaliculato breviter decurrentibus, apice rotundatis vel emarginatis, margine undique dentato-serratis, pedunculis arcuatim deflexis uni-, rarius bifloris, bracteolis pedicellorum subalternis, calycibus petalisque sub anthesi campanulatum conniventibus.

Habitat in pascuis breve herbidis, subarenosis District. Huilla, non procul a Lopollo, inter 5000 et 5500 ped. alt.; mensibus Januar. et Febr. c. flore et fructu legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 871.

Herba perennis cæspitosa, vix palmaris, glaberrima, c. glauco virescens. Radix carnosio-fibrosa, digitum fere crassa, cylindrica vel subfusiformis, multiceps, plerumque oblique descendens, infra in fibras paucas elongatas, terram profunde penetrantes partita. Caules numerosi, basi nudiusculi, angulati, decumbentes, mox in ramos graciles 3-5 pollices longos, ascendentes vel erectos, subflexuosos, obiter angulatos, dense foliosos divisi, cæspites non raro semipedalis diametri et latiores formantes. *Folia* alterna, approximata, petiolis $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ lin. longis suffulta, utrinque glaucescentia, carnosula, rigidescentia, cordato-orbicularia vel subreniformia; lamina semipollice paullo latior, apice plus minus emarginata vel rotundata, basi in petiolo canaliculato breviter decurrens, circumcirca inequaliter dentato-serrata, dentibus nunc acutis nunc obtusioribus, omnibus mucronulatis, nervo medio et lateralibus divergentibus subtas magis prominulis. Stipulæ geminae, filiformes, gracillimæ, petiolo æquilongæ vel ipso paulo breviores, erecto-patulae, longius persistentes. *Pedunculi* axillares 2-4 lin. longi, plerumque bifurci, inferiores fere semper abortientes, cruribus tunc in apice truncato glandulifero bracteolis subuliformibus varie flexis coronatis; superiores, crure uno sæpius abortiente, plerumque uni-, rarius biflori, nantes, pedicellis basi articulatis et tribracteolatis, bracteolis subulatis,

alternis vel saepius approximatis, patulis. *Calycis* herbaceo-viridis tubus brevissimus ima basi gibberosus; laciniae lanceolato-oblongae, obtusae, sub anthesi campanulatum conniventes, 2-2½ liu. longae, dorso nervis tenuibus parallelis percurae, intus e viridi flavescens. *Petala* lineari-oblonga, calycis lacinias paulo breviora iisque dimidio angustiora, albida, tenerima, una cum calyce (in fructu) marcescenti-persistentia. Coronae tenuiter membranaceae tubus filis biserialibus, iis seriei internae basi deorsum appendiculatis, dimidio brevior. Gynophori cupularis stipes brevissimus, crassiusculus et simplex. *Stamina* petalis subbreviora; antherae lineari-oblongae, basi sagittatae, lobis obtusis, in filamentis subulatis erectae, apice obtusae vel leviter emarginatae. *Ovarium* basi attenuata subsessile. *Ovula* 3, e funiculis longiusculis, medio placentarum trium insertis, demum ascendentibus pendula. *Stylus* staminibus altior, profunde trifidus, cruribus aequilongis erecto-patulis, apice capitellatum stigmatosis. *Capsula* ellipsoidea, basi calyce emarcescente cincta, pendula, 3½-4½ liu. longa, crustacea, levigata, e badio flavescens, 3-2-sperma. *Semina* pro more capsulae et totius plantae sat magna, oblongo-subreniformia, compressa, funiculo crasso arcuato suspensa, testa fusca scriatim scrobiculata, latere convexiore membranae marginata.

Observatio.—*Basananthe litoralis* habitu *Sauvagesiam erectam* simulat, dum *Basananthe nummularia* habitum *Viola* æmulat, adeoque genus hoc affinitatem inter *Passifloreas* et *Violaricas*, ab Endlichero aliisque auctoribus, inprimis ex fructus structura indicatam, etiam habitu ambarum specierum indigitat.

II. MACHADOA, Welw. gen. nov.

Flores hermaphroditi. *Calycis* tubus infundibuliformi-campanulatus, limbi 5-lobi lobis coriaceis obtusis, patentibus, imbricatis. *Petala* 5, basi calycis inserta et eo inclusa, ligulata, apice dentata. *Stamina* 5, hypogyna, filamentis filiformi-subulatis, basi breviter connatis, processibus totidem alternis; antherae lineares, connectivo subulato breviter producto. *Ovarium* breviter stipitatum, oblongum; stylus brevis, integer, stigmate capitato, trilobo; ovula ex placentis tribus biserialiter inserta. *Capsula* longius stipitata, e calyce erecto pendula, obovoideo-oblonga, obscure trilobata, polysperma. *Semina* ovoideo-oblonga, compressa, testa scrobiculata; embryo non vius.

Herba glaberrima, radice crassa fusiformi, caule tereti, erecto, brevi, parce ramoso. *Folia* anguste lineari-lanceolata, utrinque angustata, integerrima. *Stipulae* parvae, subulatae, petiolo adnatae. *Cirrho* nulli. *Flores* inter minores, in racemos breves axillares pauciflores dispositi, pedunculis bracteatis, bracteis subulatis, pedicellis articulatis.

Genus *Modecca* absque dubio affine, attamen ab ipsa inprimis floribus hermaphroditis, styli indivisi stigmate capitato, glandularum demum coronae vices gerentium absentia et habitu alieno differt. Dicitur est memoriae beati Joach. Januarii de Saldanha Machado, de horticultura inter Olisiponenses optime meriti.

Species unica:—

MACHADOA HUILLSENSIS, Welw. (Tab. X.)

Habitat in collinis breve dumetosis atque petrosis subsiccis territorii de Huilla, ad 5000 ped. circiter altitudinis, non procul a Lopo, ubi sociale cum variis *Daphnoideis* et *Irideis* Decbr. 1859, c. flore et fructu necdum bene maturo legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 865.

Herba perennis, erecta, omnino glabra. *Radix* crasse fusiformis, intus dense farcta, sublignosa, inferne fibris paucis simplicibus elongatis stipata, perpendiculariter terram penetrans. *Caules* e colo radices pauci, 1-3, recti, palmares vel pedales, penna corvina paulo crassiores, obiter sulcati, e livido virescentes, vix ramosi, juniores jam a basi, fructiferi solummodo apicem versus foliati. *Folia* alterna, remotiuscula, tenuiter carnosula, rigidula, e livido glaucescentia, integerrima, elongato-lineari-lanceolata, 4-5 pollices longa, medio ad duas lineas lata, apice longe acutata, basin versus in petio-

lum brevem angustata, secundum nervum medium parum prominentem longitudinaliter plicata, subtus inter nervum et marginem transverse venulosa, patula, hinc subfalcata. *Stipulae* breves, subulatae, petiolo utrinque adnatae. *Flores* axillares, in racemo breviusculo depauperato erecti, $3\frac{1}{2}$ lin. longi, breviter pedunculati, pedunculis cum pedicellis vix lineam longis, articulatis. *Calycis* extus e flavo rubescentis modice carnosus et subcoriacei lobi oblongi, obtusi, margine membranaceo cincti, duo interiores magis concavi et margine crispuli, sub anthesi erecto-patuli. *Coronae* sive glandularum in fundo calycis vestigium nullum. *Petala* ligulata, apice denticulata, albidia, tenerima, calycis lobis alterna usque multo breviora. *Stamina* petalis paulo breviora; filamenta erecta, subulata, basi in anulum brevissimum connata, cum denticulis singulis, quam filamenta ipsa dimidio brevioribus, alternantia. *Antherae* lineares, basi obiter cordatae, sinu fixae et erectae, apice connectivo subuliformi superatae. *Ovarium* et *stylus* generis. *Capula* e calyce erecto marcescenti-permanente pendula, pro more plantae sat magna, obovato-ellipsoidea, ultra pollicem longa et plus quam semipollicem lata, coriacea, flavicans, levigata, trisulcata, sulcis cum costis tribus parum prominulis alternantibus, apice obtuso styli residuo apiculata, polysperma. *Semina* ovoideo-oblonga, modice compressa, uno latere marginata, testa fusciscente, seriatim scrobiculata, perfecte matura non visa.

Observatio.—Habitum omnino erectum plantae nostrae, inter *Passifloreas* rarius obvium, quod attinet, hoc loco observare liceat quod, saltem in Africa tropica, plures plantarum ordines, qui in regionum inferiorum silvis umbrosis humidisque e speciebus fere semper scandentibus componuntur, in regionibus elevatis et in apricis solo macro, arenoso-petroso donatis, speciebus vel harum varietatibus habitu erecto insignibus representantur. Sic, exempli gratia, *Ampelideae*, quarum species numerosae in silvis primitivis Districtus Golungo Alto et vicinis omnes scandentes sunt, in regione Huillensi, ad 6000 fere ped. supra mare elevata, plures species caule omnino erecto vix unquam scandente offerunt. Idem inter *Cucurbitaceas* de generibus *Heterosicyos* et *Acanthosicyos*, mox infra describendis valet, nec non de *Gloriosa abyssinica*, quae, in editoribus Districtuum Pungo Andongo et Huilla non rara, tantum non *Gloriosae superbae*, Linn., formam vel, si mavis, varietatem erectam sistit; *Clematides* etiam, quae in regionibus inferioribus et silvaticis humidis omnes scandunt, in Districtibus elevatis speciebus erectis representantur, et pariter *Dilleniacearum* genus *Tetracera* in Angolae inferioris silvaticis species sat late scandentes, in regione autem elevata interiore, speciem humilem, caule erecto vel ascendente insignem offert.

Ord. CUCURBITACEAE.

Subordo CUCURBITEAE.

I. ACANTHOSICYOS, Welw. gen. nov.

Flores dioici? Masculi solitarii vel fasciculati. *Calycis* tubus turbinatus, limbi quinquefidi lobi breves, crasse coriacei, saepe inequales, late ovati vel suborbiculares, apice cornei vel ungue corneo terminati. *Petala* quinque, coriacea, sulcata, obtusiuscula, ima basi cohaerentia. *Stamina* tria, calycis fauci inserta; filamenta brevia, libera; antherae exsertae, unica unilocularis, ceterae biloculares, connectivo dilatato, sinuato, loculis sigmoideo-flexuosis. *Ovarii* rudimentum nullum. *Flores* feminei ignoti. *Fructus* globosus, corticatus, polyspermus. *Semina* breviter oblonga, tamida, testa crustacea levi. *Frutex* Africae tropicae et subtropicae occidentalis, erectus vel ascendens, rigidus, a basi ramosissimus, foliis ad squamas reductis aphyllus, *Ulicem* vel *Salsolam* quodammodo referens, ramis ramulisque divaricatis, sulcatis, spinis geminis (? stipulis in spinas abortientibus) horridus. *Flores*

tomentosi, in axillis foliorum squamiformium inter spinas subglomerati, mediocres, inexpansi tantum visi. *Fructus* diametri Aurantii vel majores, edules.

Species unica :—

ACANTHOSICYOS HORRIDA, Welw. n. sp. Tab. XI. A et B.

Habitat in desertis sabulosis maxime aridis ad austrum territorii Mosamedensis prope Cabo negro (16° L. a.) nbi, inter "Porto Pinda" et Pagum Nigritarum "Caroca" dictum, ad 10–15 mill. distantiam ab oceano, Septembre 1859 frequentem atq. parce florentem vidi. Similibus locis hæc cadem stirps in terris Numacensibus (Namaqua Land) et in interioribus de Whalfish Bay a cel. peregrinatoribus Anderson, Baines, et Chapinan, observata fuit. *Exsic.* Iter Augol. no. 806.

Plante juvenilis, nunc in horto Kewensi cultæ, cauliculus palmaris est, simplex et rectus, sed jam hæc ætate spinularum paribus, squamula parva suffultis, pollicem circiter inter se distantibus obsitus, dum basi adhuc foliis cotyledonariis spatulatis, crassiusculis, margine integerrimo leviter revolutis, pollice paulo longioribus onustus. Planta adulta, qualis in loco natali a me observata, plerumque 2–3-pedalis, caule erecto vel ascendente, sed hinc inde etiam 5-pedalis et altior evadit; dum nempe individua plura agmine densiore crescentis, ventorum vehementia arena volatili obtinentur, nihilominus vegetationem continuant, ramulis extimis suis stratum sabulosum perforant, statimque ramificant et cespites plus minus densos et extensos cfformant, qui demum, arenæ accumulatione sæpius repetita monticulos arenosos sistunt, 5–7 ped. altitudinis et 15–30 ped. circumferentiæ, undique ramulis spinosis matricis sepultæ horridos. Sed hoc de vivendi modo plantæ singularis dictum sit. *Caulis* patentim ramosissimus, tenacissimus, cylindricus, pennæ olivine crassitudine, profunde plurisulcatus, ceteroquin levigatus, pallide virescens, hinc inde flexuosus, succo viscido resinoso scateus, qui circa ramorum basin exsudans ibidemque inspissatus, gummi elastici speciem æmulat, colore tamen intense aurantiaco insignis. Rami et ramuli alterni, subvirgati, extimi pubescentes. *Folia* squamiformia, cauli adpressa, crustacea, ovata, vix lineam longa, apice cornea, plerumque cito decidua, in eorum axilla ramos emittunt, ad basim utrinque spina recta, subulata, sulcata, apice cornea, semipollicem longa, rigida et patente (stipularum vel cirrhorum vices gerente?) suffultis. *Ramuli floriferi* 2–5 pollices longi, erecto-patuli, tomento laxo undique obducti. *Flores* in axillis foliorum sæpe abortientium inter spinas geminas subsessiles, singuli vel plerumque glomerato-fasciculati, extus cano tomentosi, nobis solummodo in alabastris visi, quoad magnitudinem pro more ordinis mediocres. *Calycis* crasso-coriacei tomentosi lobi sæpius inæquales, duo vel tres eorum ovati, ceteris vel suborbiculatis apice obtuso cartilagineo-marginatis, vel obcordatis cum unguiculo corneo emarginaturæ inserto; rarius omnes 5 inter se inæquales, et tum a lata basi ovato-acuminati, vel apice obtuso corneo-unguiculati. *Corollæ* lutescentis petala basi (in alabaistro saltem) subcoadita, late ovata, obtusiuscula, extus tomentella, intus levigata et obscure striata. *Staminum* filamenta carnea, flabelliformia, ad basim internam pilis tenuibus hyalinis articulatis barbulate; antheræ descriptæ. *Fructus** (pepo) globosus, aurantiacus, quoad magnitudinem secundum soli et expositionis diversitatem inter pomi Aurantiæ et ovi Struthionis molem varians, vertice depressiusculo calycis rudimentis apiculatus, cortice crustaceo 1 lineam circiter crasso, levigato sed verrucis distantibus hemisphaericis, in centro aculeo recto breviter conico acutiusculo armatis obsito, demum irregulariter rumpente, pulpa aurantiaca grate acidula, semina numerosa involute, fartus. *Semina* latiuscule oblonga vel subellipsoidea, 6–7 lineas longa, 4–5 lineas lata, ex albido pallide flavescentia, faciebz turgida, circiter 2½–3 lin. crassa, basi suboblique truncata, margine obtuso, solum basim versus magis prominulo cincta; testa levigata, suberose crustacea; endopleura tenuissima, albescens,

* Tab. XI. B. Fructus maturus exsiccatus, una cum seminibus et pulpæ fragmentis nuper ab ill. peregrinatore Alfred B. Wollaston ex Namaqua Land adlatus fuit, et a clar. Frid. Curry, F.R.S., Secr. Linn. Soc., mecum benevole communicatus.

diaphana, demum a testa solubilis. Cotyledones semini conformes, oleoso-pingues, facie externa tumidulæ levigatæ, interna subplanæ ast sulcis 3-5 latiusculis obtusis longitudinaliter percursæ; plumula parum conspicua; radícula brevis, late conica, quidpiam compressa, apice suo hilum attingens.

Observatio.—Stirps omni respectu memorabilis et habitu suo ab omnibus hucusque cognitis Cucurbitacearum speciebus omnimodo discrepans, a Nigritis per ista deserta errantibus *Nara*, *M-nara* sive *Naras* dicitur, et ab ipsis ob fructus satis ampli pulpam succoso-carnosam grate acidulam nec non propter semina edulia summo jure magni aestimatur. Ob vivendi modum in arenosis, vitæque ipsius tenacitatem, qua climatis ardentissimi efficientiæ fortiter resistit, stirpis hujusce cultura etiam colonis Europæis Africæ tropicalis maximopere commendanda, nam planta ipsa, e seminibus sat facile educanda, ad solidandas arenas volatilibus inprimis idonea videtur, dum ejus fructus hominibus sub cælo fervente degentibus jusculum grate refrigerans simulque pluribus animalibus pabulum jucundum præbent. Monendum tamen est pulpam hujusce peponis, majore copia ingestam, nauseam causare nec non dolores prurientes faucium excitare, quod quidem ego non expertus sum, sed hic juxta relationem peregrinatorum supra laudatorum refero.

II. CORALLOCARPUS, Welw. gen. nov.

Flores monoici, masculi ad apicem pedunculi elongati aggregati, feminei sessiles vel breviter pedicellati, solitarii vel aggregati.

MASC. *Calyx* tubus late campanulatus; lobi 5, breves. *Corolla* 5-partita, segmentis ovato-oblongis. *Stamina* 3, tubo calycis inserta, filamentis brevissimis; antheræ glabræ, integræ vel 2-partitæ, unica unilocularis, ceteræ biloculares, loculis rectis, connectivo simplici vel denticulato, ultra loculos producto. *Ovarii* rudimentum nullum vel minutum.

FEMIN. *Calyx* et corolla maris. *Staminum* rudimenta nulla vel minuta. *Orarium* ovoideum, rostratum, 1-3-loculare; stylus rectus, disco basi nullo, stigmatibus 3-, rarius 2-4-lobato. *Ovula* in loculis pauca, horizontalia. *Bacca* carnosa, ovoidea vel ellipsoidea, obtusa vel rostrata, basi operculatim dehiscens, parte inferiore coriacea-carnosa, oligosperma. *Semina* obovoidea, tumida basi plus minus truncata. *Herbæ* Africæ et Asiæ tropicæ, scandentes vel prostratæ, subscabulæ v. subtomentosæ. *Folia* rotundata vel cordata, lobata vel palmata. Cirrhi simplices. *Flores* minuti. Genus, quoad florum structuram et habitum, *Rhynchocharpæ* absque dubio affine, sed fructus dehiscentia valde distinctum, duas species Africanas et tres Asiæ tropicæ includit, hic infra post speciem typicam breviter enumerandas.

CORALLOCARPUS WELWITSCHII, Hook. fil. MS. Tab. XII.

Rhynchocharpa Welwitschii, Naud., Ann. Sc. Nat. ser. 4, xviii. p. 198, t. 10 (planta culta).

Habitat non infrequens in dumetis arenosis maritimis Districtus Loanda, circa urbem Loanda et prope Cacuaco, ad varios frutices scandens, per totum fere annum, maxime mensibus Januar. et Febr. florens et fructificans.

Herba glaucescens, radice juvenili fibrosa, mox circa ejus column et caulis basim infimam fusiformi-vel napiformi-incrassata perennans. *Caulis* gracilis, succulentus, glaberrimus, 5-8-pedalis, inferne subangulatus, simplex, demum parce et distanter ramosus, late scandens, ramis carnosulis, rigidiusculis, fragilibus, subtercibus ramulisque flagelliformibus ad nodos geniculatis, glaucissimis, fructiferis non raro aphyllis et dependentibus. *Folia* petiolo 1-2-pollicari suffulta, lamina 2-2½ pollices longa, 1-3 poll. lata, quoad figuram et indumentum nec non respectu coloris sæpe in

uno eodemque individuo mirum in modum ludentia; nunc fere simplicia cordato-orata, basi subinæqualia, margine repando-dentata vel breviter lobata, apice acuminata vel obtusiuscula; nunc palmato-3-5-loba, lobis lateralibus divaricatis, obtuse bilobulatis, medio magis producto et latiore breviter acuminato, vel obtuso et cuspidato; hinc inde in aliis individuis profunde quinquepartita lobis elongatis, lineari-lanceolatis, repando-dentatis, apice cuspidatis; nervo in facie superiore laminae parum, subtus vero magis promiunlo et pilis brevibus rigidulis aspero; indumentum denique foliorum secundum plantæ expositionem et ætatem nunc pilis densis rigidulis scabrum vel papuloso-asperum et cinerascens, nunc (præsertim in unihrosioribus) velutino-pubescentis et coloris glaucescentis; in ramulis demum extimis, hyme sicca fructiferis, folia fere omnia abortiunt, ramulique ipsi aphylli, solum fructibus coralliformibus onusti, solito crassiores fiunt et fragiliores, nec non ad nodos evidentius geniculati et eximie glaucescentes. *Cirrho* simplices, elongati, demum arete spiraliter torti. *Flores* crebri, in ordine ex minutissimis, e viridi pallide flavescentes, masculi et feminei coaxillares. *Fl. masculi* in pedunculo circiter pollicari crassiusculo, erecto-patuli, apice 3-6 cymulatum gregati, brevissime pedicellati; calycis campanulati lobi ovato-lanceolati, patuli; corollæ segmenta late ovata, obtusiuscula, margine tenuissime ciliata, erecto-patula, calycis lobis latiora et longiora; antheræ subsessiles, una connectivo simpliciter apiculato unilocularis, ceteræ connectivo apice denticulato biloculares, loculis rectis, turgentibus. *Rudimentum* germinis vix ullum. *Fl. feminei* nunc solitarii et subsessiles, nunc 2-3 gregati, uno alterove tunc quidpiam longius pedicellato, pedicello crassiusculo, firmo et erecto; calyx et corolla maris sed paullo majores. *Ovarium* oblongo-ovoideum 2-, rarius 3-, rarissime 1-loculare, loculis pauciovatis. *Stylus* firmulus, sursum modice incrassatus, stigmati 2-3 vel imo obscure 5-lobulato, lobulis patulis obtusis, ciliolatis, intus stigmatosis. *Baccæ* elliptico-ovoideæ, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ poll. longæ, intense rubræ vel coccineæ, molliter carnosæ, apice obtuso calycis et corollæ limbo exsicco coronatæ, paullo supra basim a pedunculo nunc incrassato-dilatato operculatim secedentes. *Semina* in pulpa viscidula subhyalina nidulantia, obovoidea, tumida, fuscula, margine tenui, versus basim truncatam incrassato cincta, faciebus minute et seriatim transverse squamulata.

Observatio.—*Corallocarpi* generi denique ceu species subscribendæ sunt:—1, *Echmandra epigæa* Arn.; 2, *Echmandra conocarpa* Dalzell; 3, *Echmandra velutina* Dalz., et probabiliter etiam planta Africæ australis subtropicæ herbarii *Burchellii* no. 2031, in herb. Kewensi deposita et foliis lanceolatis basi sagittato-lobatis insignis.

III. HETEROSICYOS, Welw. gen. nov.

Flores dioici.

FLORES MASculi solitarii, bini vel racemosi. *Calycis* tubus cylindricus, dentibus quinque minutis. *Corolla* rotata, profunde quinquepartita, segmentis oblongo-vel lineari-lanceolatis papillois, tubum calycis subæquantibus. *Stamina* tria, tubo calycis inserta, filamentis liberis; antheræ incluse, lineari-elongatæ, leviter coherentes, unica unilocularis, ceteræ biloculares, loculis longitudinaliter conduplicatis, connectivo apice villosus vel papilloso. *Ovarii* rudimentum globosum vel conicum.

FLORES FEMINEI solitarii. *Calyx* et *corolla* maris. *Staminum* rudimenta setiformia. *Ovarium* ovoideum, apice productum; stylus columnaris, apice clavatus, stigmatibus tribus subulatis incurvis; ovula 2, horizontalia. *Fructus* ovoideus, oblongus vel subglobosus, oligospermus. *Semina* oblonga vel obovoideo-pyriformia, lincis duabus exsulptis circumdata; testa ossea.

Herbæ Tropico-Africane, parvulæ, erectæ, puberulæ, radice tubera napiformia emittente, collo bi- pluricipiti, caulibus flexuosis sulcatis. *Folia* breviter petiolata vel subsessilia, integra, lobata vel 3-partita. *Cirrho* nulli. *Flores* inter minores, breviter pedunculati, penduli vel cernui.

Genus quoad florum structuram *Trichomeria* Hook. fil. (Benth. et Hook. f. Genera Pl.) arete affine, ast præter alias notas inprimis habitu omnino erecto nec non cirrhorum absentia diversum.

1. *HETEROSICYTOS POLYMORPHA*, Welw. n. sp. Caule erecto subramoso flexuoso; foliis breviter petiolatis 3-7-nerviis polymorphis, lanceolatis, ovato-lanceolatis vel late ovatis aut obcuneatis, basi breviter attenuatis vel subcordatis, apice integris acutis vel plus minus profunde 3-, rarius 5-lobis, lobis sursum spectantibus, intermedio reliquis latiore et longiore; corollæ limbo fusco-purpureo; bacca obovoidea vel subglobosa, levigata, 2-8-sperma.

Habitat nequaquam frequens in collinis breve herbida petrosis apricis, Districtus Huilla circa Lopollo, socialis cum Daphnoides, Thesii atque Trideis pusillis; mensibus Novembri et Decembr. 1859 c. flore et fr. legi. *Essic.* It. Angol. no. 804.

Herba Ψ , pumila, in vivo obscure viridis. *Radix* tuberosa, globosa vel napiformis, dense farcta, fibris paucis elongatis subsimplicibus stipata, tubere non raro ad medium usque epigæo. *Caulis* ex collo radicis crasso subliguoso plures, 3-6 pollices alti, erecti, pennæ corvinæ vix crassiores, inter angulos obtusos sulcati, simplices vel ramo uno alterove patulo muniti, ad nodos $\frac{1}{2}$ -1 pollicem inter se distantes angulis obtusis flexuosi, juniores pubescentes, demum glabrati, mox supra basim foliis vestiti. *Folia* petiolo brevi, lineam circiter longo, latiuscula, obiter canaliculato suffulta, undique sed præcipue subtus et ad nervos pilis brevibus rigidulis adpressis pubescenti-scabrulis, quoad figuram et circumscriptionem laminæ in speciminibus utriusque sexus, imo non raro in uno eodemque caule admodum polymorpha, nec minus quoad magnitudinem variantia; nunc integra, lanceolata, ovato-lanceolata vel imo cordato-ovata, apice plus minus acuminata et mucronulata, nunc late ovata, obcuneata, vel fere lyrata, basi abrupte attenuata vel subcordata, apice 3- vel rarius 5-loba, lobis sursum spectantibus, lateralibus non raro inter se inæqualibus, hinc dentiformibus, intermedio semper longiore latioreque, plerumque ovato-triangulari, omnibus acutiusculis herbaceo-mucronulatis; lamina angustiorum 3 pollices longa, semipollicem lata, latiorum $2\frac{1}{2}$ poll. longa et sesquipollicem lata; in quibusdam individuis omnia folia integra lanceolata, in aliis omnia apice 3-5-loba, vel inferiora lobata, superiora integra et angustiora occurrunt. *Cirrhorum* vel stipularum vestigium nullum. *Inflorescentia* axillaris, tota puberula. *Flores* dioici; masculi cernui, in racemulos depauperatos 2-6 flores, basi nonnumquam bractea foliiformi, anguste linear-lanceolata, clongata, quasi stipulam mentientem, munitos collecti, vel solitarii, pedunculo gracili foliis multo brevior, pedicellis vix lineam longis bracteolatis, bracteolis caducis. *Calycis* tubus 2- $2\frac{1}{2}$ lineas longus, sursum parum dilatatus. *Corolla* fusco-purpurea, limbi segmentis oblongo-lanceolatis $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longis, horizontaliter patentibus, intus dense tenuiter papillosis. *Flores* feminei masculis similes, primum erecto-patuli, post fecundationem nutantes, tubo calycino magis elongato, supra ovarium constricto. *Stamina* et *ovarium* generis. *Bacca* obovoidea, late elavata vel subglobosa, c. viridi flavicans, nunc nucis avellanæ majoris mole, nunc multo minor, levigata, non raro ex seminibus maturitate valde turgescitibus inæqualiter plurigibbosa, septis pro parte resolutis unilocularis, pulpa viscida parca farcta, 2-7-, rarius monosperma, indehiscens. *Semina* pro more plantæ sat magna, obovoideo-pyriformia, recentia albidia, mox badio-fuscula, basi obtuse conica subrostellata, circumcirca profunde bisulcata, testa dura leviuscula.

2. *HETEROSICYTOS STENOLOBA*, Welw. n. sp. Caule erecto, subramoso, flexuoso, dense pubescente; foliis subsessilibus, isomorphis, omnibus profundissime tripartitis, segmentis elongatis, anguste linearibus, uninerviis, apice abrupte acutatis, intermedio lateralibus parum latiore sed multo longiore; floribus masculis nutantibus, solitariis vel rarius depauperato-racemosis, corollæ limbo stramineo-flavescente.

Habitat in collinis parce dumetosis Distr. Huilla prope Lopollo, socialis cum priore specie, at ea multo rarior. Cum florib. masc. Decembr. 1859 legi.

Herba gracilis, pallide virescens, radice napiformi perennans. *Caulis* ex collo radicis duo vel plures,

erecti, flexuosi, 5-8 pollices alti, plurisulcati, dense pubescentes, pennæ corvinæ crassitudine vel ino-
teuiora. *Folia* brevissime petiolata, nunc fere sessilia, utrinque pubescentia, ad basin usque tripar-
tita, segmentis elongatis, divaricatis, anguste linearibus, $\frac{1}{2}$ -1 lineam latis, 2-4 pollices longis, apice
breviter acutatis, per totam longitudinem nervo unico subtus latiore et magis prominulo densiusque
pubescente et asperulo percursis, margine pilis brevibus spinuliformibus patulis, ciliatis. *Flores*
masculi axillares nutantes, plerumque solitarii, rarius racemosi, pedicellis bracteolatis, quoad
structuram et formam iis speciei præcedentis sat similes, sed corollæ stramineo-flavescentis limbi
lacinii angustioribus acutioribusque. *Flores* feminei et fructus non visi.

Observatio.—Species habitu multo graciliore et præsertim foliorum isomorphorum
figura ab antecedente (*H. polymorpha*) absque difficultate distinguenda, sed in paucis
solummodo specimenibus masculinis a me lecta, proinde ulteriori peregrinatorum obser-
vationi commendanda.

Ordo CACTACEÆ.

Trib. OPUNTIEÆ, Benth. et Hook. f. Gen. Pl. i. 846.

RHIPSALIS CASSYTA, Gärtn. Sem. i. 137 (Pfeif. Enum. p. 133).

Habitat omnino indigena in Angolæ interioris silvis primævis et rupestribus editis. Distr. Golungo Alto
et Pungo Andongo, inter 2400 et 3500 ped. altit., ex arborum ramis vel rupium fissuris longe pen-
dula. Novembr.-Jan. floret, Febr.-Mart. fructus maturat. *Essic.* Welw. Iter Angol. n. 876 et 878.

Rhipsalis, spec., Welw. Apontam. p. 555!

Caules 4-9 ped. longi, cylindrici, glauco-virides, in juventute fasciculis setularum rubrarum obsiti, adulti
glaberrimi, di-, trichotome vel fasciculatim ramosi, internodiis a pollicari ad pedis usque longitudinem
variantibus, hinc inde radicantibus. *Flores* crebri, laterales, horizontaliter patentes, una cum calyce
3 lin. longi, 2 circiter lin. diametri, albi vel pallidissime flavescentes. *Stigma* fere semper 4-fidum,
lobulis oblongis obtusiusculis. *Bacca* plene matura albidula, pisi minoris mole, ceraceo-niteus, sub-
pellucida, pulpa aquoso-viscosa facta. *Semina* minuta, 12-20, oblique obovata vel plerumque sub-
reniformia, testa atra nitidula, sub lente fortiore dense striolata.—Specimina Angolensia cum stirpe
Americana, ex insula Jamaica Ind. occid. oriunda, in horto Kewensi Apr. 1866 læte florent et
fructifera accuratius comparavi, nullamque inter plantam Americanam et Angoleensem discrepantiam
notabilem observare mihi licuit.—Plantæ juveniles, e seminiibus enatæ, quales ad *Colæ acuminata* et
Adansonia ramos mucosos in silvis primitivis Distr. Golungo Alto mihi sæpius obvix, a planta
adultâ quoad aspectum magnopere differunt; rami nempe atque ramuli stirpis junioris solito crassi-
ores, apice clavati et undique setulis rubris 2-3 lin. longis, fasciculatim gregatis, ad apicem ramulo-
rum novellorum in comam congestis horriduli.

Observatio.—*Cactearum* in Africæ continente præsentia indigena inter phytogeogra-
phos acriter disputata, imo a R. Brown, Endlicher* et Lindley† prorsus negata fuit. Hæc
nostra quidem, *Rhipsalis Cassyta* nempe, etiamsi simul Americæ incola, certissime etiam
Africæ calidioris indigena, in Caffrorum terris quoque a Drege aliisque peregrinatoribus
reperita. Nec hoc unicum Floræ Africanæ cum Americana homogeneitatis exemplum,
nam plures species Americanæ generum *Symphonia*, *Cacoucia*, etc. etc., et ipsa *Cyrtopera*

* "Que a peregrinatoribus de *Cactis* in Arabia, Madagascaria etc. crescentibus legimus, fabulis adjuveranda sunt.
Cactea omnes in America nascuntur."—Endl. *Enchir.* p. 497.

† "America is the exclusive station of the Order [*Cactaceæ*], no species appearing to be native of any other part of
the world."—Lindl. *Veg. K.* p. 747.

longifolia Reichb. f. (*Orchidea*!) in eodem loco cum *Rhispalide Cassya* sociales a me repertæ fuerunt, et genera non pauca, typice Americana, speciebus sat affinis in Angola interiore aliisque Africæ tropicalis territoriis representata inveniuntur. Quod autem hoc respectu mihi multo majoris momenti, et omni phytogeographorum attentione dignum esse videtur, est quod major numerus illarum specierum, in Africa tropicali et America simul obvenientium, non in ora maritima continentem Americanam spectante, nec in regionis litoralis silvaticis, sed in regione interiore elevata, silvisque primitivis, longe ab ora maritima remotis occurrit. Ipsa *Brasenia peltata* Pursh, nunc etiam Floræ Africæ tropicalis vindicata, nullibi in tot et tantis regionis litoralis lacubus a me observata, sed solummodo in lacu "Ivantalla" Distr. Huilla, circiter 5000 ped. supra mare elevato et plus quam 120 millia geograph. ab oceani Atlantici litore distante reperta fuit.

Trib. GARDENIEÆ, Endl. G. Pl. 557.

MUSSENDA (Sect. *Belilla*), De C. Prod. iv. 370.

MUSSENDA SPLENDIDA, Welw. n. sp. (Tab. XIII.) Fruticosa, scandens, tota molliter pubescens vel villosa; foliis modice petiolatis, ovatis acuminatis, penninerviis; stipulis subfoliaceis, ovatis, bifidis, recurvis, intus glabris; cymis subbrevisiter pedunculatis, densifloris, trichotome ramosis, dense puniceo villosis; bracteis ad axillas patentibus subfoliaceis 3-5-fidis; floribus breviter pedicellatis; calycis tubo oblongo-cylindrico, lobis nunc omnibus aequalibus, nunc quatuor aequalibus lanceolatis, quinto maximo, late ovato molliter piloso puniceo; corollæ tubo calycis lobis 2-3-plo longiore, limbo horizontali leviter obtuse 5-loba, fauce hirsuta, extus patentim villosa; bacca ellipsoide-oblonga, villosa, calycis limbo coronata.

Habitat freq. in montosis dumetosis humidiusculis, inprimis juxta silvarum primævarum oras Districtum Golungo Alto et Pango Andongo, inter 2500 et 3500 ped. altit., a Januario usque ad Maium florens, Junio ad Augustum fructificans. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1116.

Caules e radice lignosa plerumque plures, 5-10 pedes longi, basi ascendentes, vetustiores obtuse angulati, glabrati et purpurascetes, juniores et rami vario modo curvi vel flexuosi, late scandentes, virides, teretiusculi, pilis mollibus rubescentibus patulis plus minus dense obsiti. *Folia* petiolata, membranacea, late ovata vel elliptico-ovata, 3-6 poll. longa, 1-3 poll. lata, basi nunc subcordata nunc rotundata, rarius breve attenuata, apice acuminata, margine integro ciliata, penninervia, in utraque pagina, sed subtus densius, pilis adpressis molliter pubescentia, supra late viridia, subtus multo pallidiora, ibique nervi et costis magis prominulis venulisque crebris purpurascens picta; petioli $\frac{1}{2}$ -2 pollices longi, iis foliorum superiorum sensim brevioribus, obiter canaliculati, patentim rubro-villosi; stipulæ e lata basi ovate, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ pollicem longæ, plus minus profunde bifidæ, rarius subintegre vel trifidæ, recurvo-patentes, pilis longiusculis rubris ciliatæ, intus glabræ et atropurpureæ, longius persistentes. *Inflorescentia* cymoso-paniculata, cymis densifloris, initio breviter, mox longius pedunculatis, trichotomo-ramosis, undique patentim puniceo-villosis; bractee quoad consistentiam subfoliaceam, colorem et longitudinem stipulis subsimiles, sed 3-5-fidæ, laciniis angustioribus acutioribusque, post anthesin deciduæ. *Flores* in cymas densas congesti, alii subsessiles, alii breviter pedicellati, steriles (masculi) cum fertilibus in eadem cyma obviis. *Calycis* puniceo-villosi tubus florum centralium, sæpius sterilius, breviter obovatoideus, limbi lobis omnibus inter se aequalibus; is florum exteriorum plerumque fertilius oblongo-cylindricus, limbi lobis nunc omnibus aequalibus, lanceolatis, erecto-patulis, nunc (plerumque unius floris in quaque cyma) quatuor aequalibus lanceolatis, quinto in folium maximum,

bracteiforme, petiolatum, late ovatum, nervis 5-7 percursum, molliter pilosum, intense puniceum, horizontaliter patens producto. *Corollæ* extus undique villo patente puniceo vestitæ tubus cylindricus, sursum modice ampliatus, calycis lobis duplo triplove longior, eo florum sterilium graciliore, limbi transversim vix $\frac{1}{2}$ -pollicaris lobis obtusissimis, brevissime apiculatis, intus subglabris, pallide aurantiacis, fauce pilis palceformibus rigidulis, dense congestis, erectiusculis, sulphureis obsita. *Antheræ* generis. *Ovarium* constanter biloculare; discus modice elevatus, glaber; stylus corollæ tubo æquilongus, pariter glaber, stigmate incrassato obiter bilobo vix exserto. *Bacca* elliptico-oblonga, $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{2}$ poll. longa, tenuiter coriacea, parum succosa, bilocularis, calycis limbo indurato superata, dense et patentim puniceo-villosa. *Semina* numerosissima, valde minuta, in pulpa viscida nidulantis, atra, lenticularia, testa subtiliter scrobiculata.

Observatio.—Species inter congeneres facile ornatissima, *Mussaenda erythrophylla* Schum. et Thon. (Beschreib. p. 136) affinis videtur, quæ tamen, secundum clar. auct. descriptionem a nostrate foliis subtus albo-tomentosis, stipulis angustis, calycis lobo phyllomorpho pariter tomentoso corollæque laciniis acutis recedit.

Ordo RUBIACEÆ.

Trib. CINCHONEÆ, Subtr. EUCINCHONEÆ.

CORYNANTHE, Welw. gen. nov.

Calycis tubus ovoideus vel subglobosus, limbi 5-fidi lobis lanceolatis, apice subulatis, erectis, persistentibus. *Corollæ* infundibuliformis tubus rectus, teres, sursum ampliatus; limbi explanati 5-lobi lobis late ovatis subacutis, dorso infra apicem appendice elongato-clavata, patula, corollæ fere longitudine, instructis. *Stamina* 5, corollæ fauci inserta, exserta, patentia. *Antheræ* sessiles, lineari-oblongæ, basi profunde bilobæ. *Ovarium* biloculare, ovula in loculis ∞ , ascendencia. *Stylus* filiformis, rectus, stigmate clavato. *Capsula* coriacea, lineari-oblonga, parum compressa, bisulca, calycis limbo indurato apiculata, bilocularis, loculicide bivalvis, polysperma. *Semina* compressa, ascendentim imbricata, nucleo minutissimo, ala lata membranacea, elongata, lineari-oblonga, basi attenuata profunde bifida cincto.

Arbor, excepto calyce hirtulo, glaberrima, in Angolæ interioribus editoribus inter 1200 et 2200 ped. elev. hinc inde silvas constituens, trunco stricto, coma ovato-pyramidata. *Folia* oblongo-lanceolata, nunc fere elliptica, modice coriacea, perennantia. *Stipule* solitariae, elongatæ, caducæ. *Flores* parvi, albi, in paniculam multifloram trichotome ramosam dispositi, ramis inferioribus verticillatis.

Observatio.—Genus "*Hymenodyction*" Wall. nostro hic proposito certe proximum, inflorescentia tamen racemosa bracteisque petiolatis suffulta a *Corynanthe* facili negotio discernitur. Genera "*Nauclæa* et *Uncaria*," etiam quodammodo affinia, floribus capitatis, supra receptaculum globosum aggregatis fructusque fabrica a nostro genere recedunt, quod insuper ab omnibus *Eucinchonearum* generibus hucusque descriptis "appendicibus elongato-clavatis, corollæ loborum dorso insidentibus" facile distinguitur.

Species unica :—

CORYNANTHE PANICULATA, Welw. n. sp. (Tab. XIV.)

Habitat in Angolæ interioris Districtibus elevatis, imprimis "Golungo Alto, Cazengo et Dembos," ubi in montium declivibus borealibus non raro silvas densissimas atque umbrosissimas, ab incolis Lusitanis nomine "Matas de Mangue" jure celebratas efformat. Floret a Januario usque ad Maium, et a Martio usque ad Julium fructificat. Arbor ipsa a Lusitanis et nunc etiam a Nigritis Angolensibus "Mangue

branco" vel "Mangue do Monte" et hinc inde etiam "Paco de Golungo Alto" vocatur. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 1508.

Arbor 25–40-pedalis, raro altior, corona ovato-pyramidata, dense frondosa, sempervirente, trunco recto, imo plerumque strictissimo, basi 2–5 ped. circumferentiae; cortex pro more arboris sat tenuis, parum rimosus, grisco-fuscus, in juventute arboris et in adultae ramis junioribus albidus, trunco tenaciter adhaerens, saporis amaricantis. *Rami* vagi vel superiores oppositi, erecto-patuli, crebre ramulosi, ramulis obtusangulis ad nodos compresso-dilatatis, novellis atropurpureis. *Folia* petiolo circiter semipollicari canalicellato suffulta, $\frac{1}{2}$ ad $1\frac{1}{2}$ pollicem in ramulis distantia, oblongo-vel ovato-lanceolata, obtuse acuminata, basi breviter in petiolum attenuata, margine integerrima, tenuiter coriacea, supra lucido-viridia, subtus pallidiora, pinnatinervia, nervo medio valido, lateralibus sursum arcuatis laminae marginem vix attingentibus, omnibus atropurpureis. *Stipulae* intrafoliaceae, solitariae, e lata basi ovato-lanceolatae, obtusiusculae, cito caducae. *Inflorescentia* terminalis. *Flores* paniculati; singuli nempe pedicellis brevissimis in cymulas sive umbellas spurias capituliformes 5–20-radiatas collecti, his demum in pedunculi communis (basi verticillatim, superne trichotome ramosi) ramulis gracilibus varie congestis, paniculam multifloram, densam, obtusiusculam efformantibus. *Calyx* ovoides vel fere globosus, sub lente undique hirtulus, e viridi albidus; limbi 5-fidi lobi erecti, rigidi, lanceolati, extus convexi, apice subulati, tubo ipso aequilongi, corollae tubum longe exsertum laxo ambientes, indurescendo persistentes. *Corolla* infundibuliformis (tenuiter carnosa, alba), tubo recto, cylindrico, apicem versus quidpiam dilatato, raro semilucea longiore; limbi 5-fidi laciniae late ovatae, concaviusculae, apice breviter acuto cucullatae, dorso infra apicem appendice claviformi, ipsa lacinia duplo longiore, patente, auctae, intus juxta lineam median pilis tenuissimis crispulis adpersae, in alabastro induplicato-valvatae, sub anthesi patentes. *Stamina, anthera* et *ovarium* descripta; stylus firmus, cylindricus, crassiusculus, totam tubi corollini cavitatem explens; stigma oblongo-clavatum, ex antherarum in alabastro pressione longitudinaliter plurisulcatum, exsertum. *Capsula* rigide coriacea, in maturitate fusco-purpurea, 3 lineas longa et linea vix latior, bisulcata, in pedicello lineam longo erecta, bilocularis, ab apice hiante loculicide bivalvis, valvis demum juxta sulcum bipartibilibus; loculi 12–16-spermi. *Semina* descripta.

Qualitates et Urus.—Lignum nitido-albidum, densissimum, durum et sat durabile, in construendis domiciliis nec non in utensiliis agrariorum fabrica tam inter colonos Lusitanos quam inter Nigritas multiplicis usus. Cortex arboris pulchrae *amaricans* et *subadstringens* est, et ob summam generis cum reliquis *Eucinchoneis* affinitatem, medicis in Angola artem suam nobilem exercentibus, inter *Cinchona succedanea tentanda* commendandus.

Ordo JASMINACEÆ.

Subordo OLEACEÆ.

SCHREBERA, Roxb.*

Genus "*Schrebera*" primum a Roxburghio ad arborem Indiae orientalis conditum, fere per semiseculum in plantarum enumerationibus aut specierum catalogis *monotypicum*, et quidem inter *Bignoniacearum* gregem militans, remansit, donec Endlicher (Gen. Pl. p. 714) illud inter *Bignoniaceas dubias* collocavit, qua forsitan ratione ductus, Lindley in Veg. Kingd. *Schreberam* Roxburghii penitus negligens, genus hoc ne nomine quidem

* *Schrebera* Roxburgh, Plant. Corom. ii. p. 1, tab. 101, nec al. auct. *Schrebera* Retz. est *Elaeodendron glaucum* Pers. *Schrebera* Thunb. Nov. Act. Upsal. postea ab ipso auctore in Dissert. Nov. Pl. Gen. et in ejus Flora Cap. tamquam *Hortogia capensis* descripta exstat. *Schrebera* Linn., secundum De C. Prodr. viii. p. 675, est *Cuscuta* species, in quadam *Myrica* crescens.

in *Bignoniacearum* enumeratione commemorat. Sed paullo post cl. Fenzl*, genera quædam *Bignoniacearum* dubia novo examini subiciens, Roxburghii genus *Jasmineis* subscribendum esse, præclare docuit, quam opinionem etiam Endlicher in Gen. Pl. Suppl. ii. p. 54, nec non cl. Alph. De C. Prodr. viii. p. 674, secuti sunt. Postea vero cl. Wight (Illustr. ii. p. 185) *Schreberam* iterum, et quidem tamquam Subordinem, *Bignoniaceis* adnumeravit, simulque aliquam generis cum *Acanthaceis* affinitatem suspectans. Durante hoc inter celeberrimos botanicos de generis loco in systemate certamine, altera species *Schreberæ* a cl. Schimper in Abyssiniæ montibus detecta fuit, quæ a cl. Hochstetter† ceu novum *Oleacearum* genus sub nomine "*Nathusia alata*" descripta et in herbariis Schimperianis distributa, etiam in Endlicherii Gen. Pl. Suppl. ii. p. 55, et in De C. Prodr. viii. p. 281 recensita invenitur, et quidem ab Endlicherio *Jasmineis*, a cl. Alph. De C. autem *Oleaceis* associata. Nuper demum hæc ipsa *Nathusia alata* Hochst. quoque in Africæ australis extratropicalis ditione Natalensi a cl. Gerrard aliusque peregrinatoribus variis in locis reperta, mox ab acutissimo Harveyo tamquam vera *Schreberæ* species recognita et ab ipso sub nomine *Schrebera Saundersiæ* descripta et depicta fuit‡. Eadem hæc species, etiam mihi in Angolæ et Benguellæ interioribus montosis sæpius obvia, latissime per Africam calidiorem distributa videtur, ast præter illam in Angolæ australiore duæ alteræ species ejusdem generis, ambæ foliis simplicibus integris (nec pinnatis) inter congeneres valde insignes, ceteroquin omnibus notis genericis *Schreberæ* sat congruè occurrunt, modo hic infra latius exponendæ.

Collocationem *Schreberæ* in systemate naturali quod attinet, genus hoc *Jasmineas* inter et *Oleaceas* fluctuat, vel potius ambos hos ordines arcte conjungit. Florum structura, imprimis limbi in 5-8 lobos divisio, staminum insertio, antherarum connectivum amplum, embryo demum exalbuminosus, peridermio spongioso-tumido exceptus, nec non cotyledones plano-convexæ et carnosæ *Jasminearum* characteri respondent, dum ovula pendula, capsulæ dehiscencia loculicida, semina alata et radícula supera, habitus deinde, saltem in duabus speciebus eximie *fraxineus*, evidentem cum *Oleaceis* affinitatem indigitant, sique genus, characteribus omnibus simul consideratis, amborum ordinum indicatorum limites obruit, eosque iterum, sensu Jussiei, in unum contrahendos esse suadet.

Additis duabus speciebus novis Angolensibus, jam 1858 in Apontam. pp. 549 et 579 a me commemoratis, genus *Schrebera* nunc quatuor species bene inter se distinctas amplectitur, quæ commodè sequente schemate disponuntur:—

SCHREBERA, Roxb.	A. Folia simplicia	1. Glaberrima, calycis subhemisphærici limbo truncato vel brevè denticulato, capsulæ verrucis orbicularibus scabra, = SCHREBERA GOLONGENSIS.
		2. Pubescens vel hirta, calycis campanulati limbo lobato-dentato, dentibus obtusis ciliatis, capsulâ levigata, = SCHREBERA TRICHOCLADA.
	B. Folia pinnata	3. Folia 1-3-juga, petiolo alato, foliolis sessilibus, = SCHREBERA ALATA (<i>Nathusia alata</i> Hochst.).
		4. Folia 2-4-juga, petiolo exalato, foliolis petiolulatis, = SCHREBERA SWIETENIOTIDES Roxb.

* Fenzl, Donkschr. Bot. Gesellschaft Regensb. iii. p. 246.

† Hochstetter (Chr. Fr.), Nova Genera Plantarum Africæ tum australis tum tropicæ borealis, p. 15; Schimper. Plant. exsiccant. Abyss. Sect. I. *Adoenses*, no. 245.

‡ Harvey (Dr. W. H.), Thesaurus Capensis, vol. ii. p. 40, tab. 163.

Schreberæ omnes hucusque cognitæ *arboreæ* sunt, etiamsi hinc inde, præcipue in silvis secundariis, post silvas primitivas igne destructas enascentibus, sub forma fruticosa occurrunt; omnium denique flores suavissime et fortiter fragrantés, inprimis nocturno tempore aroma amænissimum, illud *Caryophyllorum* æmulans, per lata spatia spargunt.

1. *SCHREBERA GOLUNGENSIS*, Welw. n. sp. (Tab. XV.) *Sch.* glaberrima, foliis simplicibus oblongis, nunc ovato-vel lanceolato-oblongis, abrupte acuminatis, basi obtusis vel breviter in petiolum angustatis, supra nitenti-viridibus, subtus subglauco-virescentibus; calycibus levigatis, subhemisphæricis, ore truncatis vel minute repando-denticulatis; stylo incluso; capsula obtusa, bisulea, verrucoso-sæabra.

Habitat in silvis primævis deusioribus Distr. Golungo Alto, præcipue in montibus schisto-miaceis de Serra de Alto Queta, ad 2500 ped. alt. Floret Decembr.-Jan., fructific. Maio-Jul. *Essic.* Welw. Iter Angol. n. 933.

Arbor 20-30-pedalis et altior; truncus rectus, basi 2-3 ped. circumferentiæ, cortice albidogriseo rimis minutis crebris aspero, coma elongato-ovoidea lucide denesque frondosa. *Rami* patentes, elongati, inferiores fere horizontales et tarde dejecti; ramuli oppositi, graciles, angulati, glabri, ad nodos dilatato-compressi, novelli et floriferi gracillimi, purpurascens et lenticellis albicantibus variegati, hisque asperuli. *Folia* opposita, petiolata, simplicia, penninervia, respectu circumscriptionis sat variantia, plerumque oblonga, non raro ovato-oblonga vel fere elliptica, nunc late lanceolata, ea ad basim ramulorum novellorum superioribus semper duplo triplove minora, omnia constanter glaberrima, supra intense viridia et valde nitentia, subtus pallide virescentia, halitu glaucescente suffusa, costa prominente late flava percursa, inter venas dense reticulato-venulosa; petioli 3-4 lin. longi, canaliculati, cum ramo articulati; foliorum majorum lamina 4-4½ poll. longa, 1½-1¾ poll. lata, basi sæpius obtusa vel breviter attenuata, margine integra, apice plus minus oblique et abruptum acuminata, substantia tenuiter coriacea vel chartaceo-rigida. *Inflorescentia* terminalis, omnino glabra, cymuloso-paniculata, panicula depauperata ramis di-, trichotomis pedicellisque basi articulata minute hibracteolatis, cymulis sæpius trifloris. *Flores* circiter pollicares, omnium specierum mihi cognitarum fragrantissimi; calyx obhemisphæricus, fere eupuliformis, circiter 1½ lin. longus et latus, ore inæqualiter repando 5-6- vel rarius 7-denticulatus, nunc omnino edentulus, truncatus, corollæ basin laxè excipiens; corolla carnosula, primum viridi-flavescens, mox tota cinamomeo-fusca, limbi plerumque 6-fidi lobis ad internam faciem papillis minutis fusco-rubris dense gregatis velutino-puberulis, æstivatione quineunciali-imbricatis sed vix contortis; tubus intus ad basin pilis raris adpersus, ceterum nudus. *Stamina* 2 paullo infra faucem inserta, inclusa; filamenta brevissima, compressa; antheræ lineari-oblongæ, medio dorso fixæ, biloculares, loculis connectivum crassum marginantibus, coque paulo brevioribus, longitudinaliter deliscentibus. *Ovarium* ovoideum, biloculare; ovula in quoque loculo 4; stylus filiformis, rectus, inclusus, apice sensim in stigma breviter bilobum incrassatus. *Capsula* lignosa, pyriformis, 1½ poll. longa, pollicem lata, basi teretiuscula calyce persistente arcte adpresso (vix uti in ceteris speciebus varie fissis) excepta, apice obiter convexo styli basi indurata apiculata, longitudinaliter obtuse bisulcata, fusco-badia, nudique verrucis orbicularibus magnitudine variis plus minus gregatis asperulis adpersa, bilocularis, ex apice loculicidæ bivalvis, valvis crassis navicularibus, medio septum fere sequilincam crassum gerentibus, intus infra verticem gibbis. *Semina* in quoque loculo 4, ex apice septi pendula, compressa, deorsum (i. e. in directione radiculae opposita) in alam scariosam oblique lato-lanceolatam obtusiusculam faciebz subtrinerem prolongata, una cum ala 1-1½ poll. longa, endopleura suberoso-spongiosa. *Albumen* nullum! *Embryo* rectus, 4-4½ lin. longus, 2 lin. latus; cotyledones elongato-ovatae, obtusæ, basi emarginatae, carnosulae, extus leviter convexæ, facie interna plana applicata (nequaquam plicata!); radícula supera, oblonga, tumidula, obtusissima, circiter ¾ lin. longa, ad hilum spectans.

Observatio.—Semina in loculis quidem constanter quatuor inveniuntur, sed sæpius solummodo eorum duo embryone evoluto sæcunda, reliqua duo vero plerumque in laminam subduram, oblongo-lanceolatam, intus suberoso-spongiosam et embryone omnino carentem, extus ad unam faciem acute carinatum, inter se concreta, vel saltem arcute conglutinata. Vid. tab. nostr. fig. 11.

2. *SCHREBERA TRICHOCLADA*, Welw. n. sp. *Sch.* ramulis novellis et florigeris petiolisque pubescentibus; foliis simplicibus, late ellipticis, elliptico-ovatis vel rarius obovatis, apice obtusiusculis vel breviter acutatis, basi abruptim attenuatis, supra glabris, subtus juxta costam venasque pubescentibus; calycibus campanulatis puberulis, sub pube sulcato-striatis, ore lobato-dentatis, dentibus conspicuis, inæqualibus, deltoideo-ovatis oblongisve, margine dense ciliatis; stylo plus minusve exserto; capsula elongato-pyramidaliformi, obtuse quadrangula, quadrisulca et levigata.

Habitat in silvaticis ruperibus Distr. Ambaca et Pungo Andongo, inter 3000 et 3500 ped. altit. Ab Octobr. usque ad Decembr. floret; fructiferam Junio 1857 legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 936 et 934.

Arbor circiter 15-pedalis, patentim ramosa, coma laxa, rarius frutex 6-8-pedalis, ramis virgato-elongatis, obscure angulatis, cortice cinerascens vel fere albidus; ramuli novelli et florigeri constanter plus minusve cano-pubescentes, etiam fructiferi pubem conservantes, vel patulo-villosi aut hirtuli. *Folia* circumscriptione non minus quam in specie antecedente variant, sed plerumque elliptica vel obovato-oblonga, membranacea, herbaceo-viridia absque nitore, subtus secus costam et venas prominentes pubescentes; petioli 4-7 lin. longi cum ramulis articulati, constanter, et quidem etiam in foliis adultis, ceteroquin excepta costa omnino glabris, pubescentes. *Panicule* depauperate 5-10-, rarissime 14-flore, in ramulis terminales; pedunculi, rami et pedicelli pubescentes, basi articulati, bibracteolati, bracteolis puberulis vel dense villosis-barbulatis. *Calyx* tubuloso-campanulatus, quam in *Schreb. Golumbensis* duplo major, fere 3 lin. longus, dense pubescens, sub pube obscure sulcato-striatus vel omnino deglabratus et tunc evidentius pluri-sulcatus, ore grosse dentato, dentibus nunc deltoideo-ovatis nunc lobuliformibus oblongis, juxta margines et præcipue apice semper ciliato-barbulatis. *Corolla* ejusdem magnitudinis et structuræ ac in specie antecedente, primum albida, limbi 5-7-fidi lobis pilis clavatis crispulis rosco-purpureis, circa faucem densioribus, demum una cum tota corolla cinnamomeis, obsoletis. *Antharum* loculi connectivo crasso subcompresso æquilongis. *Ovarium* conico-ovoideum; stylus modice exsertus. *Capsula* fere bipollicaris, hadio-flavicans, levigata (nec verrucoso-aspera), obtusissime quadrangula, inter angulos apicem versus magis salientes late sulcata, sulcis in vertice obtusis, obiter apiculato, cruciatim confluentibus. *Semina* quam in *Schreb. Golumbensis* quidpiam longiora, perfecte matura vero mihi non obvia. Cetera generis.

Observatio.—Species, priori omni respectu sat affinis, sed certe distincta, et ramulis petiolisque et nervo mediano subtus constanter pubescentibus, nec non calycis late dentatis capsulaque levis configuratione ab illa absque difficultate distinguenda, ceteroquin ut videtur latissime per Africam austro-tropicam distributa, a clar. Kirk etiam (secundum specimen in herb. Kewensi, Zambesi Exped. 1863 Morumballa) e ditioe Mossambicensi reportata.

3. *SCHREBERA ALATA*.

Nathusia alata, Hochst. Nov. Gen. Pl. Afr. p. 15, et in Schimper, Iter Abyss. Plant. Adoënses, no. 245; Endl. Gen. Pl. Suppl. ii. p. 55; DC. Prodr. viii. p. 281; A. Rich. Tent. Abyss. ii. p. 29; Welw. Apontam. p. 379.

Schrebera Saundersia, Harv. Thes. Cap. ii. p. 40, tab. 163.

Habitat arborea in silvis primitivis Distr. Pungo Andongo ad 3000 ped. circiter altit., nec non in silvis secundariis densioribus Distr. Huilla inter 4000 et 5000 ped. alt., hic sæpius tamquam frutex 8-pedalis. Decembr. c. fl., Maio c. fr. necdum maturo lecta. *Ernic.* Welw. Iter Angol. no. 938.

Distrib. geogr.—Abyssinia, Angola, Port Natal.

Observatio.—Specimina Angolensia cum Abyssinica a cl. Hochst. descriptis, et simul cum Icone Harveyana supra laudata optime conveniunt, calyces in stirpe Angolensi quidpiam puberulos (nec omnino glabros) si excipias. Ceterum nec mirandum, stirpem per Africam tropicam cis- et transæquatorialem divulgatam, et imo ditionem Natalensem invadentem maximopere variare. In silvis primævis convallibusque solo humoso donatis arborea crescit, 15–30-pedalis, habitu fere omnino *Fraxini*, in sylvaticis autem macrioribus solummodo frutex remanet, 5–8-pedalis, ramis elongatis tortuosis, hinc inde subscandentibus, et tunc *Jasmini* speciem non male fingens. Folia 3–5-vel, etsi rarius, 7-foliolata interdum in uno eodemque ramo obveniunt; petioli nunc latius nunc angustius alati; foliola magis minusve acuminata; calyces nunc ore truncati nunc evidenter dentati, stamina inclusa vel subexserta etc. non raro in speciminibus unius ejusdemque arboris invenienda; maxime autem species hæc respectu indumenti ramulorum, foliorum atque calycis florigeri variat, quæ organa nunc fere penitus glabra, nunc obiter puberula vel pubescentia, nunc undique sericeo-tomentella inveniuntur. Hanc ulteriorem formam, in editissimis petrosis Distr. Huilla mihi obviam, et aspectu sat singularem, hic proponere liceat tamquam

β. *tomentella*. Ramulis, foliis calycibusque dense sericeo-pubescentibus vel albo-tomentellis.

Habitat in Distr. Huilla montibus editis petrosis breve dumetosis inter 5000 et 5600 ped. alt. socialis cum *Protea*, *Xylopes*, *Dombeya* et *Tarchonanthes* speciebus, præcipue in summis jugis de "Morro de Lopollo." Martio 1860 c. flore et fruct. immat. lecta. *Ernic.* Welw. Iter Angol. no. 939.

Frutex 5-pedalis, arbusculiformis, coma densius ramosa, præter indumentum sericeum formæ typicæ omnino fidelis. Etiam hac in varietate, primum facile pro specie distincta habenda, ramuli fructiferi et folia adulta indumentum pro parte deiciunt, et calyces glabrescunt; fructus denique jam juveniles levigati sunt, quemadmodum in specie typica.

Ceteroquin folia pinnata hanc speciem strictim a duabus antecedentibus separant, petioli alati demum et foliola sessilia illam primo jam intuitu ab affini *Schrebera Societænoide* Roxb., totius generis prototypo, distinguunt.

Ordo APOCYNACEÆ.

Trib. ECHITEÆ, DC. Prodr. viii. p. 412.

PACHYPODIUM, Lindl.

Pachypodii genus, jam olim ab acutissimo R. Br. ob *Echitis* specierum Thunbergianarum ab Americanis notabilem discrepantiam, obiter indigitatum, demum a cl. Lindley in Bot. Reg. [1830] tab. 1321 institutum, nuper a cl. A. DC. (Prodr. viii. p. 423) locupletatum, ne dicam reformatum fuit, characteri nempe generico "*glandulas 5 hypogynas*" addente, in *Pachypodio* [*Echite* Thbg.] *succulento* ab eo observatas, quas cl. Lindley in generis sui definitione expressis verbis "*absentes sive nullas*" declarat*. Tres sunt species

* Glandulæ sive squamulæ quinquæ hypogynæ *Echitis succulente* Thunb. jam in iconæ hujus speciei, a cl. Jacquin in Fragm. Bot. tab. 117 exhibita, pro illo tempore perfectissima, sat clare depictæ inveniuntur.

generis hujusce, hoc modo ampliati, in Prodr. l. c. descriptæ, quibus quarta addenda venit, quæ a clar. Harvey in Thes. Fl. Cap. tab. 117 depicta et sub nomine "*Adenium Namaquanum*" descripta, omnibus characteribus ibi, etiamsi nimis fragmentarie, exhibitis, bene cum *Pachypodii* genere convenit, et ob antherarum structuram, glandularumque hypogynarum præsentiam certè a genere "*Adenium*" excludenda. Omnes hæc quatuor species, præter essentielles notas genericas, simul etiam indumento variarum partium plus minusve pubescente vel tomentoso, nec non corollæ lobis æquilateris et planiusculis inter se congruunt atque *Pachypodii* Sectionem primam *Eupachypodium* constituentes considerari possunt, dum quinta, hic infra a me proponenda, species nova, et quidem sat formosa, "glandulis in discum cupuliformem concretis, limbi corollæ lobis valde inæquilateris crispatisque, nec non stirpis totius glabritie" insignis, alterius ejusdem generis Sectionis typum offert, nomine "*Adeniopsis*" salutandæ. Erunt itaque *Pachypodii* Sectiones duæ sequente modo limitandæ:

- A. *Eupachypodium*: corollæ lobi planiusculi, æquilateri; glandulæ hypogynæ 5 (vel inconspiciæ?); stirpes indumento variarum partium pubescente vel tomentoso. Cotyledones (ex A. De C.) *radicula breviores*.
- B. *Adeniopsis*: corollæ lobi inæquilateri, hinc crispati; discus cupuliformis 5-crenatus; stirps glabriuscula. Cotyledones *radicula duplo longiores*!

PACHYPODIUM [ADENIOPSIS] LEALII, Welw. n. sp. (Tab. XVI.) *P.* trunco succulento, erecto, elongato-conico, crebre aculeato, apice 2-3-chotome ramoso, ramis glaberrimis; aculeis validis; pedunculis firmis, terminalibus, multifloris; calycis dentibus brevibus, triangulari-ovatis, acutis, glabris; corollæ amplæ glaberrimæ lobis late oblique ovatis, apicibus obtusiusculis retortis, latere altero plano continuo, altero convexiore undulato-crispato; disco annulari obtuse quinquelobo.

Habitat non infrequens in montosis petrosis aridis Distr. Bumbo (territorii Mossamedensis interioris) præcipue inter Quitibe et Bumbo, ad 1500 ped. altit. supra mare. Octobr. 1859 et iterum Junio 1860 c. fl. et fr. matur. legi. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1510.

Arbuseula cactiformis, 10-15-pedalis, succo aquoso-resinoso viscido scatens, tota aculeis rigidis geminatim proximatis, fere pollicem longis, rectis, patulis, satis pungentibus horrida, ast floribus admodum speciosis grateque fragrantibus et per totum fere annum obviis inter congeneres valde insignis. *Truncus* succulentus strictus, prope basim non raro 2-3 ped. circumferentia, epidermide levi, tenui, plumbeo-grisea, facile secedente et corticem herbaceo-viridem denudante vestitus, inferne simplicissimus, a medio apicem versus parce patentimque dichotome ramosus; rami juniores et ramuli floriferi, uti etiam aculei, lætissime sanguineo-purpurei et nitido-levigati. *Folia* sparsa, minima, vix lineam longa, rare et nonnisi ad ramulorum novellorum apices hinc inde obvia, oblongo-lanceolata, basi articulato-sessilia, membranacea, nervo crasso in acumen subulatum excurrente percursa, quasi aculeum bialatum fingentia, caducissima, juxta basim utrinque aculeis rectis, stipularum lateralium vices gerentibus(?), post folium delapsum persistentibus muvita. *Aculei* recti, in trunco et ramis ramulisque per paria sparsi, tuberculis oblongis verniceo-nitidulis insidentes, acutissime subulati, basi sub lente puberuli, majores sesquipollicem longi, juniores erecto-patuli, vetustiores late patentcs, in cujusque parvis axilla aut aculeo altero breviori aut gemmula e setis pluribus composita aucti, simulque inter eorum basim fossula circulari vel oblonga, folii delapsi cicatrice, instructi. *Inflorescentia* cymosa, in ramulis extimis terminalis, tota glaberrima; cymæ multiflore, inordinate compositæ, amplæ, bene evolutæ non raro 6-7 pollic. diametri, pedunculo communi crasso, recto, longitudine vario,

basi aculeolis gregatis circumcirca stipato, subsimplici vel parcius dichotome ramoso, herbaceo-viridi; pedicelli crassi, longitudine inter $\frac{1}{4}$ et 4 lin. in eadem cyma variantes, superne incrassati, basi bracteolis squamiformibus, deltoideis, plus minusve acutis, caducissimis, cicatricem transversam relinquentibus semiamplexi. *Calycis* brevis, intus eglandulosi lobi subaequales, deltoideo-ovati, breviter subulato-acuminati, rigiduli, erecti. *Corollæ* tubus purpurascens, $1\frac{1}{4}$ – $1\frac{3}{4}$ poll. longus, rectus, medio circa stamina ampliatus, faucem versus angustatus, intus infra stamina pilis adpersus, superne nudiusculus, fauce omnino nuda; limbi horizontaliter patentis $2\frac{1}{2}$ –3 poll. diametri transversam lobi $1\frac{1}{2}$ poll. longi, $\frac{3}{4}$ poll. lati, in aestivatione *sinistrorsum* contorti, externe rosei, interne splendido-albi, inaequilateri, latere in alabastro occultato convexiore denseque undulato-crispato. *Stamina* medio tubi inserta, inclusa; filamenta brevissima, basi interna pilosula; antheræ sagittatæ, sinu fixæ, $4\frac{1}{2}$ –5 lin. longæ, rigidae, in appendicem lanceolatam polline destitutam acuminatæ, circa stigma inclusum pyramidatim conniventes, late flavæ. *Discus* elevatus, urceolaris, ceraceo-carnosulus, obiter 5-lobus, lobis aequalibus obtusissimis. *Ovaria* duo, oblongo-ovoidæ, glabra, disco longiora; ovula ∞ ; stylus filiformis, stigmatæ oblongo-cylindraceo, vertice obtuso obscure bilobo, basi annulo prominente subcrenulato antheris adherente cincto. *Folliculi* juniores erecto-patuli, maturi angulo recto divergentes, 3–5 poll. longi, compresso-cylindracei, medio modice ventricosi, superficie glabri purpurascens, ventre deliscentes, intus nitidulo-albidi. *Semina* numerosa, pendula, obovoidæ, compressa, dense imbricata, ad umbilicum comosa, coma duplo triplove breviora; testa fusco-badia, membranacea, scabrula; albumen parvum; cotyledones late ovate vel suborbiculares, basi cordatæ, planiusculæ, leves, margine integerrimæ; radícula oblonga apice conoidea, cotyledonibus fere duplo brevior, ad hilum spectans.

Speciem hanc, inter congenere longe ornatissimam, dicatam velim viro clarissimo, Fernando da Costa Leal, in exercitu Lusitano legionis prefecto strenuo, Districtus Mosamedensis et inprimis Coloniae Huillensis defensori intrepido, nec non Mappæ geographiæ Angolæ nuper in lucem editæ pro magna parte auctori.

Observatio.—Genera "*Pachypodium* Lindl." et "*Adenium* R. & Sch.," etiamsi in DC. Prodr. loc. supra cit. sub diversis *Apocynacearum* tribubus militant, arcta affinitate junguntur, simulque omnium fere specierum habitu isomorpha, eademque vivendi ratione confirmata. Principalis tamen eorum differentia ex antherarum seminumque structura pendere videtur, dum reliquæ notæ genericæ, a diversis auctoribus indicatæ, in utroque genere sat variantes sive vacillantes sese denotant. In *Adeniis* stamina exserta vel saltem fauci approximata, antherarum apices longe appendiculati et plus minusve spiritaliter torti; semina demum subcylindrica vel cylindricio-subangulata et utraque extremitate comosa dicuntur et talia tam in icone *Adenii multiflori* Klotsch. [Peters, Reise, Bot. i. tab. 44] quoad antheras, quam in icone eximia sed necdum edita *Adenii speciosi* Fenzl, ab amicissimo auctore benevole mecum communicata, quoad antheras et seminum comas, depicta sunt. In *Pachypodio* stamina inclusa, antherarum apices sensim in acumen subcartilagineum, rigidulum, strictum angustati, semina dein compressa, obovata et solummodo ad umbilicum comosa. Discus denique in *Adeniis* veris brevissimus, annularis, continuus et ore nudo truncatus adesse dicitur, dum *Pachypodii* species vel glandulas 5 inter se separatas, vel in discum eupuliformem ore 5-lobatum coalitas offerunt. Squamulæ faucem corollæ coronantes in *Pachypodiis* vix obviæ, in nostrate hic descripto certe absentes, levioris momenti videntur, nam in *Adeniis* nunc manifeste obviæ [*Ad. multiflorum* Kl. l. c.] nunc omnino deficientes, v. g. in *Ad. specioso* Fenzl.

Hisce omnibus perpensis species amborum generum hucusque cognita forsân sequente

modo commode exponendæ, simulque ob antherarum et seminum structuram sedule observandam peregrinatoribus futuris commendandæ:—

ADENIUM, R. & Sch.

1. *A. obesum*, R. & Sch. [*Ad. Honghel*, Lindl.].
2. *A. Honghel*, Alph. DC. [nec Lindl.].
3. *A. multiflorum*, Klotsch.
4. *A. speciosum*, Fenzl.

PACHYPODIUM, Lindl.

1. *P. tuberosum*, Lindl.
2. *P. succulentum*, Alph. DC.
3. *P. bispinosum*, Alph. DC.
4. *P. Namaquanum*.

Adenium Namaquanum, Wyley in Harv. Thes. Cap. ii. tab. 117.

5. *P. Lealii*, Welw.

Speciebus utriusque generis in posterum exactius cognitis, et quoad antherarum seminumque structuram accuratius investigatis, ambo genera fortasse in unum conjungenda et tum *Pachypodium* atque *Adeniopsis* generi *Adenio* antiquiori ceu *Sectiones* subseribenda erunt, vix unquam vero, imo si reapse inter se diversa statuuntur, in diversas ordinis sui tribus divellenda.

Ordo GENTIANACEÆ.

Trib. I. GENTIANEÆ. Subtr. 2. CHLOREÆ, DC. Prodr. ix. p. 49.

FAROA, Welw. gen. nov.*

Calyx subcampanulatus, ad medium quadrifidus, lobis erectis, obtuse carinatis. *Corolla* subhypocraterimorpha, marcescens-persistens, tubo sensim ampliato infra faucem obiter constricto, limbi quadrifidi lobis patentibus; faux squamulis quatuor, staminibus oppositis, semilunaribus, margine tenuissime fimbriatis clausa. *Stamina* quatuor, ad sinus loborum inserta, longe exserta, filamentis suberectis filiformibus; antheræ breves, late oblongæ, basi cordatæ, dorso ad sium fixæ, demum incumbentes, immutata. *Ovarium* obovoideum, basi in stipitem brevem angustatum, carpellorum marginibus introflexis subbiloculari, ovulis juxta suturas biserialibus. *Stylus* rectus, elongatus, filiformis, stigmate parvulo simplici, tenuissime papilloso vel brevissime bilobo. *Capsula* parva, oblonga, perianthio marcescente inclusa, bivalvis, septicida, semibilocularis, placentis juxta valvularum margines insertis. *Semina* numerosa, subglobosa, testa undique foveolata.

Herba parva, annua, glabra, radice pluricipite; caulibus erectis simplicibus vel apices versus trichotome ramosis, tetragonis. *Flores* parvi, gracile pedicellati, in cymas densas corymbiformes foliis 2 vel pluribus involucriatis dispositi, violaceo-cerulei.

Genus ni fallor prope *Hippion* Spgl. [*Enicostema* Blum.] collocandum, cui ob flores

* Dicitur est clarissimo Doctori T. C. P. Lapa e Faro, Medico mossamedensi experientissimo, mearumque in Districtu Mossamedes institutarum peregrinationum fautori humanissimo.

in foliorum axillis pseudo-verticillatim gregatos, corollae faucem squamigeram, capsulae structuram et semina foveolata aliquantulum affine videtur. A *Sebaea* generibusque huic vicinis tum habitu peculiari quum corollae capsulaeque fabrica interna longius distat.

Species unica:

FAROA SALUTARIS, Welw. n. sp. (Tab. XVII.)

Habitat frequentissima in pascuis humidiusculis arenoso-argillaceis totius fere Distr. Huilla, inter 4000 et 5500 ped. altit., praecipue circa Mumpulla et Lopollo. Ab Octobree usque ad Ianuariam floret et fructificat. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1523.

Herba elegantula habitu *Globularium* vel, si mavis, *Lasionem* fingens, pascua editora et dumeta brevis herbida tempore vernali in *Iridearum*, *Commelynearum* et *Indigoferarum* consortio mira individuum copia exinie decoraus. *Radix* annua [vel plurcunis?]*, cylindracea, firmula, in speciminibus vetustioribus sat longa, perpendicularis, fibris lateralibus subsimplicibus elongatis stipata, ad collum incrassatum multiceps, foliorumque primordialis rosula, in planta florente non raro jam emarcida, coronata. *Caulis* ex eadem radice 3-5 usque 20, erecti, vel laterales basi ascendentes, 2-4 poll. alti, quadranguli, nunc simplices, nunc a medio bis terve trichotome ramosi, foliorum paribus 3-6, semipollicem ad pollicem usque inter se distantibus vestiti, e viridi purpurascens vel intensius purpurei, apice vel simul ad superiorum foliorum axillas capitulis florigeris ornati. *Folia* radicalia gregata, oblongo-lanceolata vel elongato-spathulata, triervia, 1½-3 poll. longa, 3-4 lin. lata, obtusiuscula, basi sensim attenuata, caulina angustiora, lineari-lanceolata vel linearia, lata basi semialexicauli inter se conata, apice subobtusula, ½-1 poll. longa, rarius linea latiora, nervis lateralibus evanescentibus subtriervia, patula, intense viridia, carnosula, summa florum capitula involuerantia. *Flores* modice pedicellati, constanter tetrameri, in foliorum axillis superioribus et summis cymoso-fasciculati, cymis multifloris, foliorum internodiis versus apices caulium ramorumque valde abbreviatis in corymbos deusissimos capituliformes congestis, capitulis 6-10 lin. diametri, nunc solitariis nunc (in speciminibus robustioribus) pluribus 2-4 in eodem caule superpositis. *Pedicelli* strictiusculi, fere setiformes, floribus (circiter duas lineas longis) paullo longiores, una cum calyce et corolla violaceo-caerulei vel roseo-violacei, rarius violaceo-albidi, exsiccatione mox pallide albescentes. *Calycis* tubus subquadrangulus; lobi ovati, inferne membranaceo-marginati, dorso obtuse carinati, apice carina excurrente obtuse apiculati, corollae tubo paullo breviores. *Corollae* tubus sub prima anthesi a basi faucem versus sensim sed parum ampliatus, ovario demum increcente, inter hoc et faucem squamigeram plus minusve constrictus; limbi patenti lobi ovati, concaviusculi, obtusi, rarius subacuti, tubum longitudine subaequantes. *Squamulae* faucis versus ejus centrum convergentes. *Filamenta* compresso-filiformia, violaceo-albida, una cum antheris intense purpureo-violaceis, exsiccatione albidis, longe persistentia. *Stylus* gracilis, stamina aequans vel iisdem paullo longior, stigmatibus exiguis nunc simplicibus, dense tenuiterque papilloso, nunc brevissime bilobo terminatus. Cetera generis.

Qualitates et Usus.—Inter plures *Gentianaceas* in Distr. Huilla a me observatas et ob principium amaricanti-tonicum, quo pollent, sub forma decocti caulium et radicis seu remedium roborans, digestionis post febres intermittentes perturbatae vigorem restaurans, adhibitas, hanc praesentem speciem aegro-

* Plurima loco citato a me collecta specimina habitu suo plantam quidem annuam indicant, aet simul alia robustiora adsunt, quorum radix circa collum valde incrassata et fere lignosa vitam pluriennem vel saltem biennem indigitat. Plures enim in eadem regione Huillensi plantarum tum *Monocotyletoncarum* quum *Dicotyledonearum* species observavi, quae habitu pusillo, gracili et radice tenuiter fibrillosa plantam annuam simulat, dum resapse perennantibus vel saltem per plures annos viventibus adnumeranda sunt. Sic ex. gr. variae species *Droserae*, in spongiosis editis Distr. Huilla frequenter obviae, omnino habitum plantarum annuarum fingunt, sed tamen gemmula, in radicis collo intra foliorum radicalium rosulam emarcidita abscondita et quolibet anno sequente in plantam novam evoluta, vitam perennem ducunt.

tantibus prae ceteris salutarem expertus sum, qua ratione ductus plantam nomine specifico "*salutaris*" designavi.

Observatio.—*Sebaea involucrata* Klotsch, in Peters, Reis. Mossamb. i. p. 271, quantum e descriptione l. c. data concludere licet, forsitan alteram *Furoe* speciem sistit, a nostra tamen foliis involuerantibus magnis cordato-lanceolatis scariosis et praecipue calycis laciniis obovato-spathulatis statim dignoscendam, cujus autem specimina nondum videre licuit.

BELMONTIA, E. M.

BELMONTIA GRACILIS, Welw. n. sp. *B.* caule erecto, 4-gono, filiformi, simplici vel parce ramoso; foliis anguste lineari-lanceolatis linearibusve, internodiis brevioribus, canaliculatis, basi semiaplexicaulibus; calycis profunde 5-partiti segmentis lato-lanceolatis, longe acuminatis, margine late membranaceis, dorso alato-carinatis; corollae tubo gracili, sursum ampliato, limbi 5-fidi lobis ovatis apiculatis patulis; antheris quam filamenta brevioribus, glandula elongato-claviformi superatis; stigmate oblongo-clavato, stylo recto vix breviori, apice subbilobo.

Habitat in pratis spongiosis Districtus Huilla, ad 5000 ped. altit. socialis cum variis *Utriculariis*, *Xyrideis* et *Eriocauloneis*, inprimis inter Lopollo et Monino, ubi mense Aprilis 1860 c. fl. et fr. legi. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1524.

Stirps annua, reliquis generis speciebus multo gracilior. *Radix* brevis, tenuiter fibrillosa. *Cauliculus* filiformis, 3–5 pollices altus, erectus, nunc simplicissimus uniflorus, nunc ramulo uno alterove laterali bi- vel triflorus, foliorum paribus 3 vel 4, pollicem vel sesquipollicem inter se distantibus vestitus. *Folia* ima superioribus duplo breviora et angustiora, illa in medio caulis sita 5–6 lin. longa, $\frac{1}{2}$ vel $\frac{3}{4}$ lin. lata, patula, herbaceo-viridia. *Flores* parvi, longe pedunculati, lutei, subnutantes; pedunculi nudi, in speciminibus unifloris 2–3 pollices longi, erecti, cauliculum terminantes, iis ramulorum lateralium vix pollicaribus et erecto-patulis. *Calycis* segmenta a basi ad medium usque late membranaceo-marginata, demum subulatiim acuminata, dorso carinato breviter alata, corollae tubo paullo breviora. *Corolla* omnino *Belmontiae cordatae* var. *micranthae*, quaecum etiam glandularum minutarum glomerulis inter calycem et corollam obviis convenit. *Antherae* in tubi parte superiore dilatata incluse, filamentis breviores, glandula gracili cylindrico-clavata, erecta, ceraceo-aurantiaca terminate. *Ovarium* oblongo-ovoidcum, bisulcatum, biloculare, placentis latiusculis septulo contiguis. *Stylus* rectus, firmulus; stigma pro more floris sat magnum, elongato-clavatum, apice nunc obiter bilobum nunc integrum, fere styli longitudine, stamina vix superans. *Capsula* ovoidca, corolla marcescente vestita, bivalvis, bilocularis, placentis demum liberis induratis. *Semina* numerosissima, placentis immersa, quadrangulo-prismatica, testa tenuissima dense papillosa.

EXOCHÆNIUM, Griseb.

1. **EXOCHÆNIUM PRIMULEFLORUM**, Welw. n. sp. *E.* annuum, pumilum, erectum; caule a basi trichotome ramoso, quadrangulo, ramis fastigiatis foliosis; foliis erectis lanceolatis vel lineari-lanceolatis linearibusve, acuminatis, trinerviis, basi semiaplexicaulibus; pedunculis axillaribus rectis inaequilongis, inferioribus elongatis, superioribus sensim brevioribus; calycis lobis anguste alato-carinatis, acuminatis, corollae tubo sursum ampliato brevioribus; corollae flavae lobis ovatis, basi angustatis, apice apiculatis; stylo filiformi, recto, glanduloso-puberulo, stigmate cylindrico-clavato, simplici vel subbilobo.

β. nanum. Cauliculis abbreviatis $\frac{1}{4}$ –1-pollicaribus, cæspitulosus vel fere nullis, pedunculis tunc c foliorum radicalium rosula emergentibus, floribus non raro totius cæspituli altitudine longioribus, limbi corollæ lobis rotundatis, mucronato-apiculatis.

Habitat in spongiosis editoribus Distr. Huilla, inter 5000 et 5500 ped. altit., socialis cum *Drosera*, *Xyrideis* et *Cyperaceis* pusillis, imprimis in alta planitie inter Lopollo et Humpata. Martio floret et fructif. Var. *β* in ejusdem Districtus declivibus uliginosis hyeme exsiccantibus juxta viam versus Gambos c. fl. Apr. 1860. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1513 et 1514.

Pulchra planta, e longinquo in pratis breve herbis vis quasi *Primule acaulis* corymbos aureos mentiens, hinc inde cæspites 25–30-flosos obferens. *Radix* c fibris tenuibus abbreviatis dense fasciculata. *Caulis* paullo supra basim in ramos plures 3-chotomos, fastigiatus, subpatulo-erectos divisus, non raro cæspites multifloros 3–6 poll. diametri, sed solummodo 2 ad 5 pollices altos exhibens. *Folia* radicalia caulinis breviora et obtusiora, cito marcescentia, caulina 1–1½ poll. longa, 1–2 lin. lata, in aliis speciminibus angustissima vix lineam mediam lata, sensim longe acuminata. *Pedunculi* axillares vel in ramorum ramulorumque dichotomiis solitarii, erecti, basi subalato-quadranguli, inferiores 1–2 pollices longi, superiores sensim breviores, supremi brevissimi, vix lineam longi. *Flores* sulphureo-flavi vel non raro splendide aurantiaci, erecti, incluso calyce ad $\frac{7}{8}$ poll. longi; limbi 9 lin. diametri, 5-fidi (rarissime 4-fidi), tubo sursum dilatato dimidio brevioris, lobis late ovatis, nunc brevis nunc longius apiculatis. *Stamina* in parte inferiore tubi inclusa; antherarum glandula apicalis cylindraceo-clavulata, fere loculis æquilonga, eæ ad basim antherarum sitæ minutæ, subglobosæ, loculis toties breviores. *Stylus* plerumque staminum longitudine, sed etiam iis brevior vel paullo longior, una cum stigmate clavulato-incrassato apice vix bilobo puberulus. *Capsula* ventricosus-ovoidea, corolla marcescente vestita, styli residuis apiculata, bivalvis, bilocularis; placenta centralis, spongioso-carnosula, quadripartibilis, demum libera. *Semina* placentæ immersa, minutissima, subquadrangulari-prismatica.

Observatio.—Characteribus genericis bene cum *Erochenio* convenit; ab *Erochenio grandi* Griseb. radice autonoma nec parasitica, caule a basi fastigiatum ramoso, floribus erectis nec horizontaliter nutantibus, alis calycis basim versus evanescentibus nec dilatatis, tubo corollæ calycem longius superante etc. nec non habitu discernitur.

2. *EXOCLENIUM DEBILE*, Welw. n. sp. *E. annuum* (?), nanum, flaccidulum, rhizomate subcarnoso, crassiusculo, albido, repente, fibrillis fragilibus stipato; cauliculis erectis, debilibus, quadrangulis, simplicibus vel parce tri-dichotome fastigiato-ramosis; foliis internodiis subbrevioribus, oblongo- vel ovato-lanceolatis plerumque acutis, summis hinc inde linearibus; pedunculis axillaribus vel terminalibus, brevibus, fructiferis subelongatis; corollæ albæ tubo calyce longiore, sursum ampliato, limbi laciniis tubo subtriplo brevioribus, obovato-oblongis, apice rotundato vix apiculatis; stigmate elongato-clavato, glanduloso-pubescente, quam stylus longiore, apice obtusiusculo bilobo.

Habitat sparsim in limosis humidis breve herbis Distr. Pungo Andongo, ad margines lacus magni dicti “Lagoa de Quibinda,” ad dextram fluminis Cuije. Cum fl. et fr. Martio 1857. *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1511.

Herbula perparva, forsitan parasitica, habitu *Sebææ pusille* (*Lagenias pus.* E. M.) non absimilis, 1–2 pollices alta. *Rhizoma* carnosulum, oblique descendens, fibrillis admodum fragilibus elongatis limum humidum perrepens, e collo caules paucos debiles vix bipollicares, simplices vel fastigiatum ramosos emittens. *Folia* in uno eodemque specimine varia, plerumque lanceolata et acuminata, rarius ovata et obtusiuscula, summa hinc inde anguste lanceolata vel linearia. *Cymule* fastigiatæ, paucifloræ, hic depauperatæ bi-unifloræ. *Flores* una cum calyce 6–7 lin. longi, erecti. *Calycis* albæ breves, ejusdem

segmenta basi late membranaceo-marginata, apice subulata et divergentia. *Corolla* alba, tenera, tubo calycem constanter superante, faucem versus modice ampliatus; limbi 5-fidi lobi campanulati patuli, tubo duplo subtriplo breviores, apice rotundato-obtus, absque ullo mucrone vel apiculo. *Stamina*, antherarum fabrica et stigma nec non capsula et semina fere omnino speciei antecedentis, a qua tamen præsens rhizomatis natura, corolla alba duplo minore, tubo corollino elongato et limbi lobis rotundato-obtusis inspiculatis siue difficultate distinguatur.

Observatio.—Quoad herbulae durationem incertus permaneo; habitus quidem et cauliculorum tenuitas plantam annuam indignant, ast rhizoma crassiusculum et subcarnosum forsitan stirpem biennem vel imo per plures annos durantem sustentat. Conf. Observ. ad calcem *Faroe salutaris* pag. 46.

3. EXOCHÆNIUM GRANDE, Griseb. DC. Prodr. ix. p. 55.

Habitat freq. in spongiosis pratice silvaticis uliginosis dense herbidis totius Distr. Huilla, ad 4500–5000 ped. alt., plerumque cum *Droseris*, *Strigis* et *Scleriis* etc. socialis, inter rhizomata aliarum plantarum, inprimis *Cyperacearum*, parasiticum. A Decembri usque ad Febr. flor. et fructif. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1516.

Observatio.—Stirps in DC. Prodr. l. c. a clar. Grisebach cum signo ? ceu annua enumerata certe annua est et quidem absque dubio parasitica, radice pro more parvula fibrillis carnosulis, albidis, subsimplicibus, tortuosis, rigidulis et fragillimis aliarum plantarum, inprimis *Cyperacearum* rhizomatibus adnascens. Flores plerumque horizontaliter nuntantes. Corollae limbus subbilabiatus. Staminum et styli longitudo reciproca maxime variat; in quibusdam floribus stylus antheris multo brevior et filamenta antheris longiora inveniuntur, in aliis stylus elongatus stamina longe superans simul cum filamentis abbreviatis, antheris subæquilongis, adest. Antherarum loculos in pluribus a me examinatis speciminibus inter se liberos nec pariete interno concretos, et quidem rimis lateraliter nec extrorsum dehiscences inveni. Stylum in plerisque floribus simplicem nec bicurvam vidi et stigma elongato-clavatum sive oblongo-spathulatum, compressiusculum, glanduloso-pubescent, stylo ipso duplo longius. Ex hic allatis controversiæ resolvuntur, quæ in plantæ descriptione apud auctores occurrunt, neque mirandum cur cl. E. Meyer (Commentar. p. 183) stylum antheris breviorē dicit, dum cl. Griseb. l. c. ipsum elongatum, corollæ tubum subexcedentem describit.

Ceterum genera *Lagenias*, *Belmontia* et *Erochænum* nimis affinia vixque notis validis inter se differe videntur, et, ni fallor, potius ceu totidem unius ejusdemque generis sectiones consideranda, a genere *Sebæa*, uti hodierno die constitutum, nonnisi staminibus inclusis et antherarum glanduliferarum fabrica tute distinguenda.

Ordo BIGNONIACEÆ.

Subordo SESAMEÆ, Endl. G. Pl. 709.

SESAMOTHAMNUS, Welw. gen. nov.

Calyx parvus, obliquus, 5-dentatus, persistens. *Corolla* hypocraterimorpha; tubus elongatus, ampliatus, curvus, basi in calcar elongatum horizontale productus; limbus planiusculus, inæqualiter subbilabiatus quinquefidus, lobis rotundatis, tribus quam ceteri majoribus; faux nuda. *Stamina* 4, subdidynama, VOL. XXVII.

infra faucem corollæ inserta, rudimento 5^{to} nullo; antheræ subsessiles, lineari-oblongæ, apiculatæ, basi cordatæ, loculis rimis lateralibus dehiscentibus. *Ovarium* cylindricum, oblique sessile, basi gibbosoincrassatum, quadriloculare; stylus elongatus filiformis, stigmatibus duobus obovato-ellipticis; ovula juxta loculorum angulum centralem plurima, uniseriata, horizontalia. *Capacula* ampla, lignosa, plano-compressa, obovato-oblonga, transversim septicide bivalvis, valvis planis, septis ab axi placentifera solutis incomplete quadrilocularis, loculis polyspermis. *Semina* in loculis numerosa, compressa, uniseriata, horizontalia, valvis parallela, transverse oblonga, late alata, nucleo obovoideo, alis membranaceis, planis. *Embryo* exalbuminosus, nucleo conformis. *Cotyledones* planæ, obovatæ, vertice cordato-emarginatæ, oleoso-carnosulæ; radícula recta, conica, acutiuscula, ad hilum spectans; plumula inconspicua.

Frutex Africæ trop. occidentalis, glabrescens, glaucescens, trunco brevi difformi, e basi tumida ramosissimus, ramis erectis, virgatis, spinosis. *Folia* decidua, parva, in axillis spinarum fasciculata, obovato-spathulata, petiolis basi articulatis. *Flores* in racemos breves axillares dispositi, magni, pedicellis brevibus crassis suffulti, ex albedo rosei.

Observatio.—Genus *Sesamo* proximum et affine, attamen corollæ tubo gracili elongato, basi longe calcarato, ovario basi gibboso, nec non caule lignoso, spinis firmis horrido ab omnibus *Sesameis* hucusque descriptis egregie distinctum, simulque Africæ calidæ *Nandendrea* admodum singularia, et usque huc jam ex *Apocynearum*, *Asclepiadearum*, *Gnetacearum*, *Ampelidearumque* familiis cognita, novo nunc socio e nobili *Bignoniacearum* ordine illustrans.

Species unica:

SESAMOTHAMNUS BENGUELLENSIS, Welw. (Tab. XVIII.)

Habitat sporadica in montosis rupestribus parce dumetosis Districtus Mossamedes (Subdistr. Bumbo) inter Cazimba et Quitibe ad 1000 ped. circiter altitud. supra mare. Octobr. 1859 c. floribus vix bene apertis, Junio 1860 cum fructu maturo legi. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1509.

Stirps secundum ætatem habitu admodum varians; juvenilis frutex gracilis, strictus, caule ad basim digiti crassitudine, 4-5-pedali, subsimplici vel parce ramoso, juxta totam longitudinem spinis alteris armato, apicem versus florifero, per majorem anni partem aphylo; progrediente ætate vero caulis, basi sensim circuitu incresecens, truncum efformat non raro 4-6 pedum circumferentiæ sed hamilem, modo supra basim in ramos breves, brachii crassitudine, erectos vel obliquos divisum, ex quibus demum ramuli crebres, erecti, virgati, hinc inde breve ramulosi, spinulis horridi, 4-6 pedes alti, ortum ducunt; truncus basalis ramique primordiales tunc spinis omnibus dejectis, cortice albidocinereo vel pallide fuscescente, transversim crebre et minute rugoloso sed parum aspero vestiuntur (vid. Tab. XVIII. fig. 1). *Spinæ* a basi lata, longe decurrente, anguste conicæ, ½-1 pollicem longæ, apice truncatæ (!), juniores erecto-patulæ, vetustiores horizontaliter patentes vel imo quidpiam declinatæ. *Folia* in spinarum axillis fasciculata, nonnisi post flores evoluta, integra, membranacea, rigidula, pro magnitudine stirpis parvula, majora vix pollicem longa, 4-6 lin. lata, glaucescentia, obovato-spathulata, penninerviæ, margine integerrima, in petiolum basi articulum sensim angustata, jam paullo ante fructus maturitatem decidua; petiolorum autem bases infimæ post folia delapsa persistentes, sensim in tubercula parva ovato-conica apice truncata incresecunt, demumque indurescunt et lanugine albidâ intertexta, acervulis capituliformes, axillis spinarum insidentes, efformant, in omnibus ramis ramulisque plantæ, excepto trunco basali, obvios; nec tamen omnia hæc in quolibet acervulo axillari modo hic indicato congesta tubercula (i. e. petiolorum bases transformatæ) semper eodem in statu permanent, sed eorum adultiora, circa acervulorum basim sita, progrediente ramuli ætate, sensim prolongantur et pariter in spinulas excresecunt, quarum non raro 2-4 in ipsis spinarum axillis, acer-

vulos istos quasi stipantes, inveniuntur*. *Flores* pulchri, carnosulo-rigiduli, infra ramulorum apices in racemos abbreviatis 3-7-flores, erecto-patulos, e spinarum axillis oriundos, collecti; pedunculus communis crassus, subsucculentus, cylindricus, e viridi violascens, basi cicatricibus foliorum delapsorum stipatus, hinc inde squamulis auctus, demum lignescens; pedicelli ejusdem fere ac pedunculus ipse, crassitudinis, 2-4 rarius 5 lin. longi, apice incrassati, medio opposite bibracteolati, bracteolis anguste ovatis sive lanceolatis, vix lineam longis, strictim erectis, in axilla sua gemmulam glandiformem foventibus, in fructu una cum gemmula abortiva persistentibus. *Calycis* laciniae ovato-deltoides, breviter acutae, 4 anteriores inter se subaequales, postica reliquis paullo brevior et angustior. *Corolla* subhypocraterimorpha, calyci oblique insidens, quasi equitans; tubo $2\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ pollices longo, medio 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. crasso, albedo-roseo, sursum arcuato, cylindrico, infra faucem dilatato, basi quidpiam ampliato et calcari elongato-conico, obtusiusculo, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longo, horizontaliter protenso, cavo munito; limbi planiusculi, fere 2 $\frac{1}{2}$ poll. diametr., ex albedo rosei, intus nivei nitiduli, lobi subbilabiatis dispositi, late ovato-suborbiculares, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ poll. lati, duo (labium superius fingentes) reliqua paullo angustiores brevioresque, omnes obiter vel vix concavi, margine integerrimi. *Stamina* 4, infra faucem corollae inserta, vix apicibus exserta, subdidynama; duo, labio inferiori respondentia, cetera paullo longiora eorumque filamenta brevissima, superiorum duorum antherae sessiles; filamentum tamen omnium quatuor longe in tubo, hic pilis minimis adperso, *adnato-decurrentibus*. *Antherae* turgidae, 3 lin. circiter longae, dorso ad emarginaturae sinum fixae, loculis appositis rima laterali dehiscentibus, connectivo ultra loculos in apiculum subuliformem producto. *Ovarium* subcompressio-cylindricum, gibbere basali calcar versus spectante, calycis fundo oblique insidens; discus vix ullus, saltem in alabastris a me examinatis inconspicuus. *Stylus* gracilis, longe exsertus; stigmatibus lobi hiantes. *Capsula* rigida, nitidulo-fusca, compressa, elongato-obovata vel obovato-oblonga, uno latere plerumque paullo ventricosa, apice obtusiusculo styli basi indurata apiculata, 3-3 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. lata, juxta facierum medium et margine circumeica obtuse sulcata, nervis elevatis venulas laterales dichotomas emittentibus longitudinaliter percursa, transversim septicide bivalvis, elasticè dehiscentis, ob septa, valvis parallela, nunc ab axi centrali placentifera soluta et apice abortiva, inferne imperfecte quadri- superne bilocularis. *Semina* una cum alis $\frac{1}{2}$, majora imo $\frac{1}{2}$ poll. diam. transversali, quoad directionem in loculis horizontalia, at quoad faciem nuclei et alae verticaliter, i. e. valvis septice parallelè seriata, dense imbricata; alae planae, tenuiter membranaceae, pallide fuscescentes sive badiae, pellucidae, rigidulae, levigatae, margine integerrimae; nucleus turgidulus, 3-3 $\frac{1}{2}$ lin. longus, brunneus. Cetera ex caractere generis.

SESAMUM (EUSESAMUM) ANGOLENSE, Welw. Apont. p. 588†. *S.* caule erecto, firmo, 3-5-pedali, glabriusculo, superne parce ramoso, foliis oblongo-lanceolatis vel oblongo-linearibus lingulatisve, breve petiolatis vel subsessilibus, inferioribus oppositis, superioribus et floralibus alternis, basi in petiolum angustatis, apice rotundato-obtusis vel emarginatis, margine repando undulatis, supra intense viridibus, glabriusculis, reticulato-rugulosis, subtus, nervis purpureis exceptis, albo-tomentosis; floribus brevissimo pedicellatis, speciosis, violaceo-purpureis, nutantibus, 2-2 $\frac{1}{2}$ -pollicaribus, fauce bilabiatis campanulata diametri ultrapollicaris; capsula lineari-oblonga, in

* Ex supra dictis colligere licet, spinas ipsas primordiales plantae nostrae nequaquam pro ramulis abortivis habendas, sed potius cum petiolorum transformationes considerandas eas; cui metamorphosi, uti observationes repetitae in loco natali institutae me edocuerunt, etiam spinæ (et rectæ et uncinatæ) variarum specierum scandentium ex generibus *Clerodendron*, *Combretum* etc. etc. originem suam debent.

† Limbi dispositio bilabiata minus in flore expanso sed evidentiùs in alabastris aestivatione observanda, ubi lobi tres majores interiores, infimo intimo, et duo minores æstivi inveniuntur, uti in *Labialis*.

‡ Nomen et habitus plantae atque locus natalis.

rostrum breve demum bifidum acuminata, undique pilis raris albis adpersa; seminibus planiusculis, rugulosis, sulco utrinque acute marginato cinctis.

Habitat in dumetosis silvaticis arenosis Distr. Pungo Andongo, juxta ripas rivorum Lutete et Luxillo, nec non prope Lombe, inter 3000 et 3500 ped. altit. Ab Octobr. ad Decembr. florentem et partim fructif. vidi. Loca humidiuscula amat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1645.

Caulis strictim erectus, penna olorina crassior, in solo pinguiore hinc inde usque 6-pedalis, obtuse quadrangulus, inter angulos sulcatus, junior pubescens, denum glabratus, plerumque obscure purpurascens, a basi foliosus, apicem versus in ramos paucos $\frac{1}{4}$ –1-pedales, erectos, oppositos vel saepius alternos divisus; internodia inferiora 2-pollicaria, superiora circiter pollicaria. *Folia* quoad indumentum sat constantin, subtus semper tomento laxiusculo albedo, demum exsiccatione griseo obducta, nervo mediano latiusculo venisque saturate purpureis obiter pubescentibus percursa, inferiora 4–3 poll. longa, $1\frac{1}{4}$ –1 poll. lata, superiora sensim minora, praecipue angustiora, floralia saepius $1\frac{1}{4}$ –1-pollicaria, lingulato-spathulata et apice obtuso vel emarginato mucronata. *Flores* inter congenere maximae, secundi, in racemos laxos elongatos, caulem et ramos terminantes, dispositi, magnitudine in eadem stirpe versus racemi apicem sensim decrecentes, majores $2\frac{1}{2}$ vel imo 3 pollices longi; bracteis inferioribus foliis caulibus homomorphis, iis florum superiorum fere linearibus et apice longius mucronato-recurvis; calyx brevis, persistens, laciniae ovato-acuminatis, piloso-pubescentibus, 3 lin. longis, inter se subaequalibus; corolla latissime violaceo-purpurea, tubo basi curvato, in alabastro densius, sub anthesi tenuiter pubescens, limbi bilabiati latissime hiantis lobis obtusis, ciliatis, intermedio labii inferioris magis producto. *Ovarium* dense piloso-hispidum. *Capsula* quoad magnitudinem, configurationem et rostri longitudinem iis *Senami indicis* satis similis, sed maturitate fere glabrata vel pilis albis distantibus obsita. *Semina* nigricantia, breviter obovata, 1 lin. longa, plano-compressa, utraque facie rugulosa, totoque ambitu sulco latiusculo pariter ruguloso et utrinque acute marginato notata.

Species florum amplitudine nec non foliis subtus albo-tomentosis ab omnibus hucusque descriptis sat distincta, simulque planta pulcherrima, *Digitalem* luxuriantem aemulans, cultura in hortis dignissima.

Observatio.—Species altera, ut videtur etiam indescripta, quam nomine *Senami calycini* in herb. Angol. designavi, huic supra descriptae proxima et habitu valde affinis, sed omni respectu duplo vel imo triplo minor, 2– $2\frac{1}{2}$ -pedalis, foliis angustioribus, apice subacutis vel acutatis, corollis roseis 10–15 lin. longis (nec 2–3-pollicaribus) etc. discrepans, praecipue autem foliis subtus non incano-tomentosis, sed glabriusculis, lepidoto-glauciscentibus et calycis laciniae lanceolato-linearibus, longe acuminatis, 4 lin. longis glandulisque petiolaribus evidenter stipitatis differt. Crescit haec species in arenosis parce et breve dumosis inter Praesidium Pungo-Andongo et Sansamanda, mense Januarii 1859 c. fl. et fr. lecta.

Exsic. Welw. Iter Angol. no. 1644.

Caulis fere teretes, atque etiam multifleri undique pilis albis adpersi. *Folia* quam in *Ses. Angolensi* duplo breviora et angustiora, floralia acuminata, omnia supra glabrescentia, intense viridia, subtus nervo mediano venisque atque venulis transverse anastomosantibus elevatim prominulis et intense purpureis percursa, ceteroquin lepidibus argenteis dense gregatis glaucescentia. *Lepides* haec iis quae in caulibus, foliis atque floribus variarum specierum *Pedilinearum* occurrunt, exacte similes itidemque, sed minus copiose muciparae. Conf. *Linariopsidem prostratam*, hic infra descriptam.

Subordo PEDALINEÆ.

PTERODISCUS AURANTIACUS, Welw. n. sp. *Pt.* subsucculentus, foliis oblongo-lanceolatis vel obovato-spathulatis, obtusis, margine repando-sinuatis dentatisve, in petiolum longiusculum, circiter pollicarem, basi utrinque glandula ampla auctum angustatis, supra glabriusculis, subtus lepidoto-glauciscentibus; corollis vix pollicem longis, aurantiacis, tubo cylindrico, limbi subbilabiatis patentis lobo infimo majore, omnibus intus pilis crispulis adspersis, extus, uti tubus, lepidotis; fructus compressæ tetragono-ovoidei alis semiorbiculatis, transverse plicato-radiatis, basi rotundata liberis, apice inter se confluentibus.

Habitat rarior in sabulosis maritimis Distr. Mossamedes, ad ripas fluminis Bero, ubi Julio 1859 c. fl. et fr. legi. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1658.

Herba radice crassa fusiformi perennans, tota carnosula. *Caulis* decumbens, sesquipedalis, inferne glaber, epidermide crassiuscula albida, facile secedente, obtectus, superne et ad ramos oppositos vel rarissime alternos dense sed minute albedo-lepidotus. *Folia* opposita, patula, fragilia, majora, petiolo 1-1½ poll. longo excepto, 2-2½ pollicaria, ½ vel 1 poll. lata, margine obiter repanda vel remote dentata aut inæqualiter crenulata, apicem caulis ramorumque versus sensim minora; glandulæ* ad petiolorum basim pro more magnæ, depresso-globosæ, atropurpureæ, e nucleo compatiore et excipulo crenato arcte adpresso, sive squamulis in excipulum connatis consistentes. *Pedicelli* circiter 3 lin. longi, densissime lepidoti. *Flores* una cum calyce profunde 5-partito 10-14 lin. longi, rigiduli, intense aurantiaci, extus undique lepidibus minutis argenteis (his quæ ad folia et ramos uovellos occurrunt, similibus sed rarioribus) obsiti; tubus circiter ½-pollicaris, faucem versus parum amplius, mox in limbum subbilabiatis ½-lobum, patentem aliens, lobis rotundatis 3-4 lin. longis, intus crispulopilosis, tribus (labium inferius fingentibus) paullo longioribus, eorumque medio lateralibus ampliore. *Filamenta* basi compresso-dilatata; antheræ circumscriptione late cordiformes, connectivo apiculate, loculis subreniformibus, connectivo infra apiculum insertis, inferne liberis, rimula dorsali apertis. *Stigma* bilobum, lobis ovatis (nec subulatis!), superiore erecto, parce vel vix stigmatoso, inferiore reflexo et ad totam superficiem internam dense stigmatoso. *Fructus*, qui obiter aspectus *Combretacearum* quarundam fructus alatos valde simulat, in pedicello parum accreto nutans, siccus, lignosus durus, badio-fuscus, compressæ ovoideus, obscure quadrangulus, late quadrialatus, faciebus elevatim laxè reticulatis, alis scariosis, semiorbicularibus vel reniformibus, 5 lin. latis, basi protracta liberis, apice cruciatim connatis. Cetera generis.

Species a *Pterodisco specioso* Hook. et *Pt. Gayi* Deene.† (unicis hucusque descriptis) foliis longe petiolatis et floribus aurantiacis, quam in *Pt. specioso* triplo minoribus, vix pollicaribus facili negotio distinguenda, in territorio Mossamedensi admodum rara, sed probabiliter in terris ad austrum confinibus frequentius invenienda.

LINARIOPSIS, Welw. gen. nov.

Calyx quinquepartitus, lacinia superiore reliquis inter se æqualibus brevior et angustior. *Corolla* tubulosa, tubo vix vel parum incurvo, intus ad staminum insertionem annulo piloso vestito, sensim in faucem subcampanulatam ampliata, limbi bilabiatis quinquelobi lobis rotundatis, infimo protracto.

* Glandulæ, lente fortiori scrutatæ, e nucleo dense carnosæ, vertice non raro areola notatæ, ambitu squamulis pluribus brevibus, obtusis, inter se connatis vel arcte adpressis involveratæ, constant, et absque fore dubio flores abortivos indignant.

† Decaisne, Revue du groupe des Pédalines, Ann. Sc. Nat. 3^{me} Série, Botanique, t. iii. p. 321.

Stamina quatuor, didynama, fertilia; rudimentum quinti vix ullum; antheræ oblongæ, basi cordatæ, dorso supra sinum fixæ, introorse, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarium* conico-ovoideum, in disco parum concavo sessile; stylus filiformis, stigmate parvo bifido, lobis angustis subcutatis. *Fructus* calyce persistente parum aucto, laxè patulo stipatus, nucamentaceus, siccus, indehiscens vel tardè apicè hians, oblongus vel subobovoideus, quadricostatus, inter costas seriatis tuberculosus, apicè obtuso breviter alato-rostratus, absque omni spina, *unilocularis, dispermus*. *Semina erecta*, obovata, compressiuscula, a medio ad basim truncatam usque alato-marginata, testa membranacea, laxiuscula, *levigata*, endopleura tenui; embryo semini conformis; cotyledones planoconvexæ, obovatæ, apicè emarginatæ, carnosæ.

Herba montium Benguellæ interioris juga altiora incolens, mucilagine copiosa scatens, radice crassa perennans, caulibus prostratis, a basi ramosis, villosè-pubescentibus; foliis oppositis brevè petiolatis, ovatis, subtus glaucè-pruinosis et dense lepidotis; floribus axillaribus solitariis, brevè pedicellatis, pedicellis *bibracteolatis* glanduliferis; calyce laxo, pilosulo; corolla violacea intus purpureo-striata, extus pubescente; fructu parvulo, erecto, tuberculis longitudinaliter seriatis depressis obseito, ceteroquin omnino inermi.

Genus *Pedatio* quidpiam affine, sed fructu uniloculari et seminibus erectis ab ipso et simul ab omnibus *Pedalinearum* generibus hucusque descriptis satis distinctum.

Species unica:

LINARIOPSIS PROSTRATA, Welw. n. sp.

Habitat in collinis arenoso-humosis, brevè herbidis, juxta rivos Distr. Huilla, præsertim inter Mumpulla et Humpata, ad 4000-5000 ped. altit. Octobr. 1859 cum fl. et fr. legi. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1659.

Herba socialis, habitu quibusdam *Linariæ* speciebus e sectione *Elatinoides* non absimilis, undique plus minusve pubescens vel villosa, ast nequaquam succulenta. *Radix* fere digitum crassa, cylindracea vel fusiformis, fibroso-carnosa, pluriceps. *Caulis* prostratus, circiter semipedales, teretiusculi vel obscure quadranguli ramique oppositis elongatis parce ramellosis dense pubescenti-canescentibus vel breviter patentim pilosi, apicè adscendentes, undique distiche foliosi, internodiis 3-5 lin. inter se distantibus. *Folia* omnia opposita, penninervia, majora 5-7 lin. longa, 3-4 lin. lata, inferiora brevè petiolata, ovata, basi rotundata, apicè obtusiuscula, margine ciliato repanda vel remote dentata; superiora subsessilia, angustiora magisque approximata; omnia supra pallide viridia, pilis raris, lepidibus intermixtis aspersa, tactu asperula, subtus lepidibus densissime gregatis argenteis* glaucè-pruinosa sive albicantia, plus minusve, præcipue juxta nervos venasque pubescentia. *Flores* semipollicares, foliis floralibus, caulinis homomorphis, vix vel parum longiores; pedicelli circiter lineam longi, in fructu incrassati, infra medium bibracteolati, bracteolis minimis, subfiliformibus, in axilla glandulam brevè stipitatam gerentibus. *Calycis* profunde 5-partiti lacinia: lineari-lanceolatæ, obtusiusculæ, 1½ lin. longæ, pilosulæ, ciliatæ, subpatulæ, in fructu demum paullo auctæ cumque laxè involucentes. *Corolla* vix semipollicaris, in alabastro dense cano-pubescenti, demum puberula et lepidibus raris adspersa, sordide violacea, intus, excepto annulo piloso staminum basim ambiente, glabra, purpurascens, striis longitudinalibus intensius purpureis et circa faucis os punctis atropurpureis picta. *Filamenta* basi dilatata, purpureo-punctata; antherarum loculi glanduloso-punctati, basi liberi. *Discus* ovarii basim cingens concaviusculus, luteus, margine tumidulo, in fructu persistens. *Stylus* staminibus longior, incurvus, inclusus, deciduus; stigma pro more parvulum, lobis brevibus angustis. *Nux*

* *Lepides* hæc, lente fortiore examinatæ, frustula sistent obtusæ quadrangula, e 4 vasiculis argenteo micantibus, depresso hemisphericis, inter se connatis, composita. *Lepidos* in quibusdam *Sesami* speciebus (v. g. in *Ses. calycino* supra commemorato) observata, exacte ejusdem ac in *Pedaliniæ* structuræ sunt, ast mucilagine minus epissæ factæ.

2½–3 lin. longa, 1½ lin. diametri transversalis, oblongo-subcylindrica vel obovoidea, glabriuscula, dura et tenax, costulis quatuor cruciatim oppositis hinc inde interruptis percursa, inter costulas tuberculis depressis, magnitudine et circumferentia inaequalibus, plerumque longitudinaliter seriatis obsita, apice obtuso costulis duabus oppositis magis prominulis et confluentibus breviter alato-rostrata, carpellorum marginibus introflexis, solummodo basi prominentibus, unilocularis. *Semina* duo, e fundo locali erecta, 1½ vel vix 2 lin. longa, vertice rotundato-obtusa, basi latiuscule truncata, ibidemque ala brevi, sursum versus evanescente, marginata. *Testa* badia, omnino levigata, embryonem laxè vestiens. *Radícula* cotyledonibus multo brevior, crassiuscula, obtuse conica. Cetera generis.

Qualitates et Usus.—Herba omnibus in partibus mucilagine limpidissima simulque insipida dives, et (etiam per annos jam exsiccata et conservata) aquae frigidae vel tepidae immersa, hanc mucilaginosam reddit limpidamque conservat, qua ratione herbae hujusce infusum, aut simplex aut succo *Citri* mixtum vel *Saccharo* dulcificatum, in *Tussi*, *Gonorrhoea*, *Dysenteria* etc. potum admodum salubrem, nunc lenientem vel emollientem, nunc refrigerantem aegrotantibus praebeat, saepius decocto *Maisae* vel *Althaeae* et similibus preferendum.

Ordo LABIATÆ.

Trib. OCIMEÆ, Subtr. PLECTRANTHEÆ.

ALVESIA, Welw. gen. nov.

Calyx per anthesin brevissimus, subcupularis, bilabiatus, labiis rotundatis, inferiore latiore emarginato; tubus post anthesin valde auctus, membranaceus, ovoides, inflatus, ore clauso. *Corolla* tubo brevi cylindrico, incluso, abrupte in faucem oblique subcampanulatam, aeneo verticali compressiusculam ampliata; limbi bilabiati labio superiore trilobo, lobo superiore reflexo, lateralibus brevissimis, latioribus, rotundato-obtusissimis, antrorsum spectantibus vel breviter reflexis, labio inferiore recto, concavo, obtuso, integerrimo. *Stamina* 4, exserta, declinata, filamentis apice adscendentibus; antherae biloculares, loculis divaricatis. *Ovarium* gynophoro subbrevis cylindrico impositum, quadrilobum; stylus filiformis, declinatus, stigmate minuto bidentato. *Nucula* perfectæ subsolitariæ, lato-obovoideæ, granulatæ, basi calycis vesiculoso-ampliati absconditæ.

Suffrutex 3–5-pedalis, *Rosmarini* facie, pubescenti-tomentosus, caule ramisque obtuse 4-gonis, sulcatis, ramulis strictis foliosis. *Folia* parva, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, supra glabriuscula, subtus tomentosa, penninervia. *Verticillastri* in racemos densos ramosos dispositi, laxè tomentosi, pedicellis brevibus. *Flores* rosei. *Calyces* fructiferi in pedicellis apice deflexis penduli.

Genus ob corollæ labii superioris configurationem et calycem fructiferum admodum ampliatus, vesiculososo-inflatus, inter *Plectrantheas* valde distinctum, dicatum velim clarissimo Bento Antonio Alves, viro humanissimo, inter horticultores Lusitanos eminenti, etiam Floræ Lusitanæ studioso, mihiq̃ue olim in variis per agrum Olissiponensem peregrinationibus botanicis amenissimo socio, amico constanti et fidelissimo.

Species unica:

ALVESIA ROSMARINIFOLIA, Welw. n. sp. (Tab. XIX.)

Habitat in collinis dumetosis silvisque parum densis arenoso-humosis Distr. Huilla, inter 4000 et 5000 ped. altit., prope Mumpulla et Lopollo, fere semper in *Protearum*, *Daphnoidearum* atque *Theiorum* consorcio. Febr.–Apr. florentem, Junio adhuc parce fructificantem legi. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1636.

Suffrutex pulcher, hinc inde, solo et expositione faventibus, frutescens, caule eodem per plures annos

virente et florente. *Caules* plerumque plures ex eadem radice, basi lignosi, erecti, 3-4-, rarius 5-pedales, obtusanguli, obscure rubentes, pube brevi densa tomentelli, jam a basi ramulis creberrimis abbreviatis, dense foliosis, strictiusculis, sterilibus obsiti, superne parcius ramosi; rami oppositi elongati, æque ac caules inferne ramulis brevibus foliosis abortientibus onusti et apice florigeri. *Folia* opposita, pro magnitudine stirpis parvula, majora 1-1½ poll. longa, 2-3 lin. lata, lauceolata vel oblongo-lanceolata, rarius line inde fere liucaria, breviter acuta, margine reflexo integerrima, supra late viridia nitidula, subtus caescenti-tomentosa, penninervia, nervo medio et secundariis angulo acutissimo ab ipso egredicutibus subparallelis, supra impressis, subtus prominulis. *Verticillastri* sæpius 6-flori, bracteis ovatis, obtusiusculis, quam pedicelli subbrevioribus, deciduis stipati, in racemos densos, ovato-pyramidatos, demum elongato-cylindricos, plerumque ramosos dispositi. *Inflorescentia* partes omnes plus minusve dense tomentosæ et rubore amænissime roseo suffusæ. *Pedicelli* florigeri 2-3 lin. longi, fructiferi parum longiores, apice deflexi. *Calyx* sub anthesi 2 vel vix 3 lin. longus, externe dense tomentosus, interne nudus, labiis margine densissime ciliato-fimbriatis. *Corolla* 9-11 lin. longa, extus, tubo incluso excepto, laxè tomentosa vel lanuginosa, intus nuda. *Filamenta* juxta basim adnatam tenuiter pilosa, ceterum, uti antheræ, ovarium et stylus totus, glabra. *Calycis* fructiferi tubus admodum ampliatus, vesiculosus-inflatus, 1½ pollicem longus vel paullo longior, diametro pollicari, elliptico-ovoides, deglabratus vel tenuiter puberulus, e viridi purpurascens venulisque obscurioribus laxè reticulatis percursus, labiis parum vel vix auctis sed nunc arcte clausis obtuse apiculatus. *Nucleus* perfectæ, reliquarum abortu solitariae, rarissime duæ, late obovate vel omnino globosæ, undique glandulis minutis punctiformibus, parum prominentibus obsitæ, in gynophoro parum vel vix aucto, fudo calycis insidente, sessiles. Cetera generis.

Qualitates.—Stirps quidem fere inodora, sed ob frondem gracilem discolorum florumque racemos amplios colore late roseo superbientes *Adonistia*, imprimis Europæ australioris, ubi probabiliter sub divo prosperabit, magnopere commendanda.

Trib. STACHYDEÆ, Subtr. BALLOTEÆ.

ACHYROSPERMUM ÆTHIOPICUM, Welw. n. sp. *A.* caule herbaceo, erecto, elato, 4-6-pedali, obtuse tetragono, pubescente, parce ramoso; foliis petiolatis, late ovatis vel ovato-ellipticis, basi cuneata et apice longe acuminato integris, margine grosse dentato-serratis, utrinque glabriusculis vel præcipue juxta nervos venulasque hirtulo-pubescentibus; verticillastriis sub 6-floris, in spicam densam subtetragono-cylindricam, 2-4 pollices longam approximatis; bracteis late ovatis, abrupte acuminatis, ciliatis, calyce subbrevioribus; calycis tubulosi pubescentis fauce intus puberula, dentibus 2 inferioribus reliquis paullo brevioribus; corollæ albæ, excepto limbo extus pubescente glaberrimæ, labio superiore emarginato-subbilobo, inferioris lobo medio lateralibus duplo latiore, rotundato-obtusos, concavo; styli breviter bilobi lobis æqualibus acutiusculis; nucularum paleis anguste spatulatis, apice obtuso ciliato-barbulatis.

Habitat in silvaticis umbrosis humidis Distr. Pungu Andongo ad 3200 ped. circiter altit., præ ceteris circa cataractas loco dicto Calundo, ubi Maio 1857 c. fl. et fructu necdum bene maturo legi. *Ersic.* Welw. Iter Angol. no. 1633.

Herba procera, *Stachydis* speciem luxuriantem simulans, plerumque 4-5-pedalis, hine inde imo 7-pedalis. *Caulis* rectus, basi penna olorina crassior, obtuse 4-gonus, puberulus, superne teretiusculus ramisque abbreviatis densius pubescens vel pilis patentibus hirtus. *Internodia* inferiora 4-5 pollices inter se distantia, superiora sensim breviora. *Folia* membranacea, petiolis debilibus patula, majora una cum petiolo 1-1½-pollicari ad 9 pollices longa, 3½ poll. lata, basi cuneata sensim in petiolum angustata

ibidemque integra, margine dentibus deltoideis acutatis sursum spectantibus serrata, apice longe acuminata, acumine ipso edentulo, in utraque facie, exceptis nervis venisque puberulis, glabriuacula vel, inprimis superiora et summa ad petiolum nervosque et venas pilis rigidulis crebrioribus, nunc adpressis nunc patulis, adpersa. *Verticillastri* circiter 6-flori, dense spicati; spicæ in caulibus ramulorumque apice terminales, solitariae, juveniles obtuse 4-goni, florigeræ cylindraceæ, bene evolutæ ad 3-4 pollices longæ, apicem versus quidpiam attenuatæ, obtusiusculæ. *Folia* floralia bractæformia, subscarioso-membranacea, sessilia, late vel hinc inde fere orbiculato-ovata, apice abrupte acuminata vel cuspidata, extus puberula, margine ciliata, versus apicem spicæ angustiora et sensim acuminata, quam calyces paullo breviora, vel ipsos æquantes. *Flores* cujusvis verticillastri plerique sessiles, vel eorum unus aut duo brevissime pedicellati; pedicelli inæquiloni, basi bracteolis ovatis vel lanceolatis longe ciliatis stipati. *Calyx* membranaceus (albidus!) tubulosus pubescens, intus pube rara adpersus, limbum versus modice ampliatus, subbilabiatus 3-dentatus, dentibus ovatis, acutis, ciliatis, patulis, inferioribus duobus quam superiores paullo brevioribus. *Corollæ* albæ tubus vix incurvus, inclusus, glaber; limbi extus pubescentis labium superius obcordato-emarginatum vel obiter bilobum, inferius 3-lobum, lobis lateralibus brevibus rotundatis, intermedio iis duplo majore, rotundato-obtusum et concavo. *Stamina* ascendentia, exserta; filamenta medio tubi inserta sed ad faucem usque adnata, nuda, ima basi in appendiculis membranaceis, tenuissime barbيلات, squamulas mentientes producta; antheræ loculis confluentibus uniloculares. *Stylus* staminibus fere æquilongus, apice paullo dilatato breviter bilobus, lobis æqualibus, patulis, acutiusculis. *Gynophorum* subquadridentatum. *Nucula* (solum immaturæ visæ) dorso et vertice paleis membranaceis crebris, imbricatis congestis, spatulatis, apice rotundato ciliato-barbatis, ipsis nuculis sesqui- vel duplo longioribus, comosæ. *Aroma* plantæ vix ullum.

Observatio.—Generis ob nuculas paleis sat conspicuis coronatas in ordine valde singularis, tres species hucusque descriptas invenio, silvas humidæ insularum Java, Luzon et Madagascariæ incolentes; nostra hæc, silvarum primævarum Africæ æquinoctialis civis, ab *Achyrospermo densifloro* Bl., cui ex descriptione cl. auctoris (Bijdrag. 840) affinis videtur, caule elato 3-6-pedali (nec 6-8-pollicari), spicis cylindraceis 2-4-pollicaribus (nec ovatis sesquipollicaribus), calycis fauce intus pubente (nec nuda) aliisque notis distinguitur; ab *Ach. phlomoide*, Bl. cui *spica laxa* et *bractææ unifloræ* adscribuntur, nec non ab *Ach. fruticoso* Benth., *foliis obtusis crenatis* et *spica laxa* insigni, longius distat.

Trib. SCUTELLARINEÆ.

TINNEA, Kotschy et Peyr. in Kotschy, Plant. Tin. p. 25*.

Generis distinctissimus character, a clar. auctoribus l. c. egregie quidem sed secundum unicam speciem iis cognitam expositus, nunc, speciebus pluribus ex itinere Angolensi reportatis et cum typica comparatis, commode notis sequentibus ampliandus vel modificandus erit:

Calyx tubuloso-campanulatus vel globosus, bilabiatus, labiis integris, fractifer inflato-amplius, ventricosus-ovoides, labiis ad basin usque fissis bivalvis, valvis singulis scaphiformibus. *Corollæ* bilabiatae transversim modice compressæ labium superius inferiore duplo brevius, subintegrum vel sinu acuto bilobum, lobis obtusis, rectiusculis vel parum recurvis. *Ovariana* subsessile vel breviter stipitatum, plus minusve profunde quadrilobum. *Stylus* inter ovarii lobos centralis, stamina subæquans, apice subbilobus, lobo superiore brevissimo sterili vel obsoleto, inferiore majore acutiusculo dense stigma-

* Kotschy (Dr. Theod.), Plantæ Tinneane, Vindob. 1865, apud Gerold, fl. gr. Fol. pp. 54 cum tabb. xxv.

tosio. *Nucule* clavato-obovoidae, stipitatae, basi intus arcuola oblonga concaviuscula notatae, facie interna levigata gibbæ, dorso ala lata, elliptica vel orbiculari, e spiniulis aridis radiantibus, pilorum arachnoideorum ope inter se dense contextis fornata, seutellatae. Cetera omnia conformia.

Herbæ elatae vel suffrutices, adfem aquinoctialem eis et trans æquatorem incolentes, caulibus erectis, parce vel densius ramosis, pubescentibus vel incauis; foliis breve petiolatis, oppositis vel ternis, vel non raro alternis in eadem stirpe simul obviis, ovalibus, integerrimis, membranaceis, glanduloso-punctatis; bracteis latiusculis, herbaceis vel coloratis; floribus axillaribus solitariis, in pedunculis hibracteolatis subsecundis, juxta caulis ramorumque extremitates nunc laxiuscule dispositis vel dense approximatis, fusco- vel violaceo-purpureis, grate fragrantibus.

Genus ab auctoribus in opere citato *Verbenaceis* adscriptum, sed ob calycem fructiferum (in una specie imo jam sub anthesi) ad basim partitum, omnino bivalvem, ovarium evidenter et, saltem in speciebus Angolensibus, sat profunde quadrilobum, nec non propter nuculas sat longe stipitatas dorsoque alato-scutellatas, inter calycem inflatum perfecte liberas et iis generis *Peritomia* H. B. K. omnimode analogas, ne dicam similes, potius inter *Labiatas* collocandum, quibus etiam a cl. Dr^e Thomson* et nuper a cl. Dr^e Hooker† associatum fuit. Unam insuper specierum Angolensium jam anno 1862 loco infra citato inter *Labiatas Scutellarineas* enumeravi, simulque herbæ floriferæ et fructiferæ manipulum in Expositione internationali Londinensi una cum aliis plantis medicinalibus Angolæ exhibui. Tribui *Scutellarinearum* genus hoc subscribendum esse mihi videtur, quoniam calyx bilabiatus labiis integris demum ad basim fissis, simul cum nuculis dorso alatis nonnisi hac in *Labiatarum* tribu occurrat.

Species tres: una (*Tinnea aethiopica* Kotschy et Peyr. l. c.) Africam cisæquatorem incolens; et duæ novæ Angolenses, nunc exponendæ.

1. *TINNEA ANTISCORBUTICA*, Welw. n. sp. *T.* caulibus herbaceis 3-5-pedalibus, strictim erectis, obtuse tetragonis, inter angulos sulcatis, dense pubescentibus, apicem versus ramosis, a basi foliosis; foliis oppositis aut ternatis vel rarius alternis; bracteis dense imbricatis, late ovatis, apiculatis, roseo-purpureis, calyces florigeros tubuloso-campanulatos sericeo-puberulos excedentibus; calycis fructiferi glabriusculi vel sparse pubescentis valvis antice alato-marginatis.

Catele bulla [nomen vernaculum Nigrit.]. "Planta herbacea vivax da familia das *Labiadas*, do grupo das *Scutellarineas* etc.," Welw. Synopse explicat. 1862, p. 28.

Habitat non infrequens in silvarum primævarum subumbrosis editoribus Districtuum Golungo Alto et Pango Andongo, inter 2000 et 3000 ped. altitud., imprimis copiose in declivibus de Serra de Alto Queta prope Sange, ubi ab autochthonibus, qui foliorum pulverem vel infusum tamquam remedium antiscorbuticum adhibent, "*Catele bulla*" nuncupatur. A Novemb. ad Maium flor., Febr. ad Jun. fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1632.

Herba perennis, radice lignescente multipite. *Caules* gregarii, 5-15 ex eadem radice, stricti, plerumque 4-5-pedales, evidenter quadranguli et inter angulos obtusos late sulcati, basi simplices, apice in ramos subbreves erecto-patulos floriferos divisi, plus minusve cano-pubescentes, per totam longitudi-

* "*Labiatarum novum genus*; the four seeds are protected by an enveloping calyx, and feathered white in a beautiful manner; on the grassy banks of Madi, 3° 15' N. Frequent in forests, No. 705." (Dr. Thomson in Appendix G to Speke's 'Journal of the Discovery of the Source of the Nile,' London, 1863, p. 645.)

† Botanical Magazine, tab. 5637.

nem foliis, superioribus sensim minoribus, vestiti. *Internodia* inferiora circiter bi-, superiora 1-pollicaria, ea axis florigeri valde contracta. *Folia* opposita vel ternata, vel rarius et inprimis in superiore caulis parte alterna, petiolo brevi vix $2\frac{1}{2}$ lin. longo suffulta, majora, demto petiolo, 2- $2\frac{1}{2}$ poll. longa, 1- $1\frac{1}{2}$ poll. lata, penninervia, latiuscule ovata, basi rotundato-obtusata, vel breviter in petiolum caudiculatum angustata, apice obtusiusculo abruptum in apiculam acutata, margine integro ciliolata, superne obscure viridia, glabriuscula vel rugulis minutis asperula, subtus paulo pallidiora, secus nervos venasque pubescentia, inter venas dense glanduloso-punctata, versus apicem caulis sensim minora, brevissime petiolata, obtusiora longiusque apiculata. *Bractee* membranaceae, roseo-purpureae, foliis multo tenuiores, sub anthesi dense imbricatae, subsessiles, late ovatae vel suborbiculares, 6-8 lin. longae, 4-7 lin. latae, basi subtruncato-rotundatae, apice obtuso apiculatae, utrinque mollissime pubescentes, margine dense ciliatae, calyces ipsis breviores occultantes. *Pedunculi* patentes, vix lineam longi, pubescentes, bracteolis duabus oppositis filiformibus pilosulis stipati. *Calyx* sub anthesi tubuloso-campanulatus, transversim compressus, 4-5 lin. longus, extus dense pubescens, intus tenuiter puberulus, utrinque roseo-purpurascens. *Corolla* 10-12 lin. longa, obscure purpurea, in alabastro pilis albidis adpersa, demum glabrata, resinoso-punctata, fauce et limbo transversim subcompressa, labio superiore obtuse bilobo quam inferius trilobum duplo brevior. *Stamina* labio superiore parum longiora, antheris solis exsertis; filamenta compressa, basi et ad latus internum albedo-pilosa, sursum versus sensim dilatata, apice carnosio-inerassato obtuso recurva, latissime flava; antherae biloculares, loculis ovoideo-globosis subdisjunctis, polline albidio turgidis, longitudinaliter apertis. *Ovarium* in gynophoro turgido obscure crenato substipitatum, fere ad medium usque quadrilobum, lobis clavatis, erectis, levibus. *Stylus* staminibus paulo brevior, medio quidpiam dilatatus, apice brevissime bilobus, lobo uno minuto porbrevis, altero erassiore, longiore, intus stigmatosus. *Calyx* fructifer valde auctus, scariosus, ventricosus-inflatus, ovoideo-oblongus, nutans vel pendulus, 8 lin. circiter longus, 5 lin. latus, extus pube tenui hinc evanescente vestitus, intus glabriusculus, et longitudinaliter nervis pluribus crebre venulosus et prominulis percursus, valvis singulis antice in marginem semilunarem, lineam latum, planiusculum, mox leviter revolutum extensis. *Nucula* (*Schizocarpia* Kotschy, l. c.) abortu saepius tres, scutellis dorsalibus oblongo-suborbicularibus, albidis, quoad structuram supra descriptis, 3-4 lin. longis, juxta margines laxè inter se coherentibus absconditae, quoad fabricam internam iis speciei sequentis omnino similes, et descriptioni atque iconi speciei typicae conformes.

2. *TINNEA ERIOCALYX*, Welw. n. sp. *T.* caulibus suffruticosis, 1-2-pedalibus, erectiusculis, *teretibus*, inferne cano-puberulis, superne albedo-tomentellis, simplicibus vel parce ramosis, a basi foliosis; foliis oppositis vel alternis, rarius subverticillatim ternis; bracteis laxè imbricatis vel remotiusculis, cordato-ovatis vel saepius cordato-suborbicularibus, apiculatis, suberassis, rigidis, herbaceo-viridibus, calyces florigeros globosos, densissime lanuginosos vel albo-tomentosos aequantibus; calyces fructiferi ovoideo-globosi et dense lanuginosi valvis antice retusis, brevissime vel vix alato-marginatis.

Habitat in collinis brevè dumosis, siccioribus et petrosis, juxta silvarum margines Distr. Huilla, frequens circa Lopollo ad 5000 ped. altit. Jan. 1860 c. flore, Martio c. fr. lecta. *Erric.* Welw. Iter Angol. no. 1635.

Suffrutex, basi ad altitudinem 3-4 poll. lignescens. *Caulis* ex eadem radice plures, saepius sesquipedales, erecti vel basi ascendentes, teretes vel rarius obscure angulati, absque omni sulco, molliter cano-pubescentes, apicem versus nunc albo-tomentosi nunc lanugine nivea obtecti, simplices vel parcius ramosi, ramis suboppositis vel saepius alternis erecto-patulis. *Folia* internodiis 4-14-pollicariis disseta, alterna semper magis approximata, petiolo 1-2-lineari suffulta, majora $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6-11

lin. lata, ovata, basi rotundata vel breviter cuneata in petiolum angustata, margine integra, apice obtusiusculo vel obtuso apiculata, vel rarius sensim in apiculam brevem acutata, utrinque glanduloso-punctata, supra late viridia levigata vel minutissime rugulosa aut pube rara adspersa, subtus flavo-virentia, puberula, vel densius pubescentia, nunc, imprimis locis siccioribus, cano-tomentosa, nervo costisque supra parum, subtus evidentius prominulis, superiora brevius petiolata et obtusiora, sensim in bracteas abeuntia. *Bractee* brevissime petiolatae, basi plus minusve emarginatae vel cordatae, apice rotundato apiculatae, herbaceo-virides, utrinque laxae vel densius tomentosae, circiter 6 lin. longae, 5-6 lin. latae, quam folia quidpiam crassiores et rigidiores, in fructu persistentes. *Flores* subsecundi. *Pedicelli* circiter lineam longi, villosi, infra medium bracteolis 2 oppositis, ipsis duplo longioribus, lineari-lanceolatis, laxe villosis stipati, in fructu vix acereti. *Calyces*, in alabastro perfecte globosi, dense floccoso-tomentosi, sub anthesi ad 5 lin. longi, labiis truncatis transversim hiantes, jam hac periodo ad basin usque bipartibiles. *Corolla* violaceo-purpurea, ejusdem ac in specie antecedente magnitudinis, limbi labio superiore aequae ac in illa, obtuse bilobae. *Ovarium* fere ad medium usque quadrilobum, glabrum; styli lobulus superior hac in specie non raro obsoletus. *Calyx* fructifer duplo subtriplove auctus, inflatus, clausus, nutans vel pendulus, ovoides- vel ellipsoideo-globosus, extus dense lanuginoso-tomentosus, ad basin usque bivalvis; valvae subcoriaceo-rigidae, subaequales, intus glaberrimae, nervis pluribus prominentibus percursae, inter nervos elevatim venulosae, superior primum decidua. *Nuculae* abortu non raro tres, elongato-clavatae, 3-4 lin. longae, interna facie gibbae et levigatae, nonnisi stipitum basi excavata inter se laxe cohaerentes, dorso ala arachnoidea, albicante, elliptica, 4-5 lin. longa, 3-4 lin. lata scutellata, bilocellata, locello altero minore vacuo. *Semen* obovatum, compressum, locelli angulo paullo infra apicem appensum; testa membranacea, badio-flavescens, laxa, infra radiculam in filum tenue, spiraliter tortum, stipitem penetrans, prolongata. *Embryo* rectus, semine dimidio brevior sed parum angustior; cotyledones obovatae, carnosulae, leviter convexae, applicatae; radícula infra, brevis, obtuse conica.

Ordo POLYGONACEÆ.

Subordo I. POLYGONEÆ.

Trib. PTERYGOCARPEÆ, Meisn., DC. Prodr. xiv. p. 3.

OXYGONUM ACETOSELLA, Welw. n. sp. *O.* annuum, glabrum, glaucissimum, carnosulum; caule a basi ramoso, ramis decumbenti-ascendentibus, inferne parce ramulosis, semicylindricis vel subcompressis angulatis; foliis lanceolatis vel lanceolato-oblongis, abrupte acuminatis, basi in petiolum longiusculum alatum sensim angustatis, margine repando- vel sinuato-dentatis; ochreis tenuiter membranaceis, truncatis, ore integerrimis vel minute remoteque denticulatis; racemis terminalibus, virgato-elongatis, gracilibus, interruptis; pedicellis fasciculatis glabriusculis, fructiferis bracteam superantibus; achenis oblongis, trigonis, juxta angulos subacutos membranaceo-alatis, alis margine obiter repando-denticulatis vel subintegris.

Habitat frequens in collinis arenosis maritimis ex Mossamedes versus Cabo negro, imprimis loco dicto "Praia da Amelia." Junio 1859 cum flore, insequente Julio c. fructu legi. *Essic.* Welw. Iter Angol. no. 1757.

Herba prostrata, caule abbreviato, jam a basi in ramos plures 2-5 poll. longos, hinc inde ramulosos, denum oblique ascendentes diviso. *Folia* majora ad sesquipollicem longa, medio semipollicem lata, margine nunc simpliciter repanda, nunc repando-dentata vel rarius obiter sinuata aut inciso-dentata, exsiccatione utraque facie minutim verruculosa. *Ochreae* in vivo pallidissime virentes, in sicco albidæ, horizontaliter truncatae, ore integerrimæ vel rarius denticulis tenuibus remotis obsitæ, nunquam

setoso-ciliatæ. *Racemi* terminales, vel tardius ob rami prolongationem axillares, rectiusculi, semipedales usque pedales, rarius paullo longiores, rachi triquetra. *Bractee* 3-5-floræ (floribus pluribus inaequalibus, paucis vel unico hermaphroditis) in racemis novellis continuæ, imbricatæ, demum ad $\frac{1}{2}$ vel $\frac{3}{4}$ pollicis inter se distantes, ore nudæ vel sparsim et minute denticulatæ. *Calyx* limbus tenuiter membranaceus, lacteus, profunde 5-fidus, segmentis patulis obovatis, rotundato-obtusis, concaviusculis, marcescenti-longe persistentibus. *Stamina* 8; filamenta subulata; antheræ didymæ pallide cyanæ. *Stylus* profunde trifidus; stigmata capitellata. *Achenium* (solummodo submatutum a me visum) vix 4 lin. longum, anguste ovoideum, triquetrum, angulorum alis inter se æqualibus, in vivo ex albido virentibus, margine subintegris vel tenuiter remote crenulatis sive repando-denticulatis, faciebus inter angulos longitudinaliter triuivis.

Qualitates et Usus.—Stirpis omnes partes, sed præcipue folia tenuiter succulenta, sapore grate acidulo præditæ sunt, et a colonis Mossamedensibus hinc inde foliis *Rumicis acetosæ* substituantur, quapropter planta ipsa ab illis "*Azedas brava*" i. e. "*Rumex acetosa sylvestris*" nuncupatur.

Species *Oxygoni Dregei* Meisn., DC. Prodr. xiv. p. 38, affinis videtur, quæ tamen a nostrate imprimis foliis *integerrimis* et ochreis ore setoso-ciliatis distinguenda.

Subordo II. BRUNNICHIEÆ, DC. Prodr. l. c. p. 183.

BRUNNICHIA AFRICANA, Welw. n. sp. *Br.* caule frutescente, late scandente, patentim ramoso, ramis elongatis angulatis, inter angulos plurisulcatis, ramulisque horizontalibus virgatis glanduloso-pubescentibus, remote foliatis; foliis membranaceis, breve petiolatis, oblongo-ovatis vel ovato-ellipticis, basi cuneatim attenuatis rariusve subrotundatis, apice oblique acuminatis vel cuspidatis, margine integerrimis, utrinque glabris; ochreis manifestis, brevibus, truncatis, ore scarioso-membranaceis, tenuiter crispatis, demum laxiusculis; cirrhis apice bifidis, cruribus uncinatis vel demum spiraliter intortis; racemis ad ramulos laterales et apicales terminalibus, aphyllis, interruptis, bracteis 2-5-floris; pedicellis plano-compressis, fructiferis accretis, subsecundis, nutantibus, calyce nunc semipollicari 5-7tuplo longioribus, secundum totam articuli superioris longitudinem utrinque ala membranacea, sesquilineam lata, ex apice tubi calyceini decurrente, sanguineo-purpurea, in articulo inferiore sensim angustata marginatis.

Habitat in Distr. Goluugo Alto editioribus (2000-2400 ped. alt.) ad oras silvarum primitivarum, præcipue juxta cataractam "de Capoja" prope "Sange," ubi stirpem, in statu fructifero ob fructos pendulos late sanguineos sat ornatum, una cum *Leea sambucina*, *Bombace Buonopozensi* et specie indescrita generis tropico-americanæ "*Trymatococcus*" sociatam Septembri 1835 c. fl. et fr. legi. *Ezrie*. Welw. Iter Angol. no. 1734.

Frutex gracilis, caule 10-15 pedes longo, remote ramoso, ramulis patentissimis, debilibus, cirrhorum ope sæpe firmantibus, late, sed vix alte scandens. *Petioles* 3-6 lin. longi, canaliculati, basi plerumque decurvi, eadem ac caulis et rami pubescentia, et papulis cylindraceis, brevibus, patulis, rubentibus, subviscosis, dense gregatis constante, obdueti. *Foliorum* adultorum lamina 1½-2 poll. lata, 2½-3½ poll. longa, supra late viridis et lucidula, subtus pallide virescens, exsiccatione nitenti-rufescens et, excepto nervo mediano subtus modice prominente puberulo, utrinque glabra. *Cirrhi* graciles, supraaxillares [pedunculi abortientes?], foliis duplo triplove longiores, cruribus arcuato-divaricatis, excepta basi puberula levigati. *Racemi* floriferi 3-6 poll. longi, fructiferi pedales et longiores, rectiusculi vel ascendentes, rachi compressa, minutim glanduloso-pubescente. *Florum* fasciculi circiter semipollicem inter se distantes, bracteis ovato-acuminatis, carnosulis, membranaceo-marginatis, plerumque 3-floris.

Calyx sub anthesi obfusiformis, herbaceo-viridis, lobis crassiusculis, rigidulis, interna facie amœne rosceis, tribus externis quam duo interiores latioribus, omnibus æquilongis et acute acuminatis, erecto-patulis. *Calyx* fructifer trigono-ovoideus, inter angulos longitudinaliter pluricostulatus, fusco-purpureus, inclusis lobis nunc induratis et erectis semipollicem longus, coriaceus, *achenium* maturum arcte includens, demum una cum pedicelli articulo superiore tunc fere 3 pollices longo et modo supra indicato ala splendide sanguinea alato deciduus. *Stamina*, *ovarium* etc. generis.

Observatio.—Unica *Brunnichia* species hucusque descripta, et proinde generis typus, est *Brunnichia cirrhosa* Banks (DC. Prodr. l. c. p. 185), Americam borealem incolens, a qua stirps præsens Africana pubescentia glandulosa, in ramis, petiolis et racemorum rachi manifesta et constante, foliis demum basi cuneatis vel rotundatis (*nunquam cordatis*) et non minus pedicellis fructiferis calyce 5-7tuplo (nec duplo) longioribus aliisque notis distinguenda.

Ordo PROTEACEÆ.

Trib. PROTÉEÆ.

FAUREA, Harvey.

Generi "*Faurea*" a beato Harvey jam 1847 in memoriam G. Faure, botanophili Capensis instituto, nuper a clar. Meisner in DC. Prodr. xxiv. p. 344 quidpiam locupletato, sed ad unicam tunc solum cognitam speciem circumscripto, nunc, specie altera vel duabus aucto, notulæ sequentes commode addendæ erunt:

Antheræ nunc sessiles, nunc, imo in ipsa specie typica, filamentis brevissimis, compressis, latiusculis, apice plus minus manifeste biariculatis insertæ, glandula parvula obtuse conica *apiculatæ*, vix unquam omnino muticæ. *Squamulæ hypogynæ* non semper acutæ, sed non raro rotundato-obtusæ, vel truncatæ aut emarginatæ vel demum apice breviter bilobæ. *Ovulum* prope loculi medium suturæ affixum.

Locum *Fauræ* systematicum inter *Proteacearum* tribus quod attinet, genus hoc contra cl. Endlicheri et Meisneri opinionem, qui illud *Persoonicarum* tribui subscribunt, potius *Proteis* associandum et quidem pone *Protea* ipsam collocandum esse videtur. A *Persooniis* calyce *labiatim* fissso nec 4-sepalo, antheris calycis *laciniis concavis* nec *sepalorum medio* vel *basi* insertis, stigmatibus *verticali* demum et ovario constanter *uniloculari* discrepat, dum omnibus hisce notis optime cum *Proteis* concordat et ipso generi *Protea* adeo affine invenitur, ut ab eo, si inflorescentiam spicatam excipias, non nisi calyce *unilabiato* reflexo nec *bilabiato* fissso discerni queat.

Habitu suo *Fauræ* quadam *Heliciæ* species in Asia tropica occurrentes, etsi ob florum structuram et fructum follicularem ad tribum longe diversam spectantes, non male fingunt.

Ceteroquin *Faurea* inter *Proteaceas* Africanas facile genus unicum *reapse tropicum* habendum; nam genera *Protea* et *Leucospermum*, quæ itidem singulis speciebus laudati continentis circulos tropicos, et quidem ad Abyssiniam usque invadunt, in ditone Capensi magno specierum numero prædominant, dum *Faurea*, in Africa austro-tropica tam occidentali quam orientali pluribus speciebus earumque formis sive varietatibus numerosis representata, in territorio Capensi, *proprie sic dicendo*, deest; nam Flora terræ Natalensis, ubi species *Fauræ* typica (*F. saligna*) primum detecta fuit, pro magna parte characterè omnino tropico eminet, et ipsa hæc *Faurea saligna* intra circulos tropicos ab Angola ad Zambesiam usque late diffusa reperitur.

Inter generis quoad foliorum figuram et inprimis eorum indumentum sat polymorphi formas varias, quæ Angolæ australis atque Benguellæ interioris montosa, ultra 4000 ped. elevata inter 13° et 16° lat. austr. inhabitant, præcipue sequentes duæ notis constantioribus distingui possunt, hinc infra, etiamsi non sine aliqua hesitatione, ceu species novæ

propositae, quibus dein *Faurea saligna* Harv., in eodem territorio cum antecedentibus non infrequenter obvia, caractere specifico quidpiam ampliatio vel modificatio, comparationis gratia addere liceat.

1. *FAUREA SPECIOSA*, Welw. n. sp. (Tab. XX.) *F.* ramulis floriferis villosa-tomentosis; foliis molliter coriaceis breve petiolatis, oblongis vel ovato-oblongis, basi breviter attenuatis, apice obtusis rariusve acutiusculis, margine integerrimo planis, utrinque, nec non rhachi et bracteis plus minusve dense villosa- vel lanuginosa-tomentosis vel supra demum subglabris; spicis robustis, foliis longioribus vel saltem æquilongis; calycis 9-12 lin. longi dense tomentosi lobis dorso vix sulcatis; squamulis hypogynis late abbreviato-ovalibus, apice rotundato-obtusis truncatisve vel subdenticulatis; ovario undique pilis elongatis, sericeis, penicillatim dispositis, dense barbato.

Habitat in Districtus Huilla silvestribus petrosis vel arenosis editioribus, inter 4000 et 5000 ped. alt., imprimis circa Lopollo et Humpata. Ab Aprili usque Junium florens, Maio ad Julium fructificat. Species uti videtur per Africam austro-tropicam late diffusa, etiam a el. Kirk et Meller in Distr. Mossambicensis interioribus, inter 2000 et 3000 ped. elevatis, reperta ibidemque (secundum specimina in herb. Kewensi) non minus quam in territorio Huillensi quoad foliorum indumentum varians, propter eorum circumscriptiorem vero nec non ob spicas robustas florumque magnitudinem etc. absque dubio præsentis speciei subscribenda. *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 1622 et 1622b.

Frutex firmus, 6-8-pedalis, nunc arbor parva 10-15-pedalis; truncus ad basin $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ped. diametro, cortice profunde rimuloso, aspero, et fusco cinerascens tecto, laxo ramoso, ramis vagis, erecto-patulis, arcuatis, ramulis curvatis vel varie tortis, rigidis, pro more robustis, foliorum delapsorum cicatricibus latis, protuberantibus exasperatis, primum tomento laxo, villis longioribus patulis intermixto obtectis, demum villosis delabentibus, plus minusve pubescentibus. *Folia* bene evoluta una cum petiolo 2-3 lin. longo 4-6 poll. longa, 2-3 poll. lata, plerumque ad utramque faciem tomento plus minusve denso, et villis longiusculis ruditer contexto, in facie superiore demum rarescente, sed saltem juxta nervos remanente obtecta, utrinque pallide viridia, pinnatim nervosa, nervo mediano subtus valde prominente, lateralibus crebris, obliquis, tenuibus, mox paulo supra ortum bifurcatione repetita in venulas anastomosantes sed marginem laminae nunquam attingentes divisas. *Spicæ* florigeræ ad ramulorum apices in axillis foliorum summorum singulæ, vel internodiis ultimis valde abbreviatis binæ, rarius plures, simplices, strictiusculæ, 5-9 pollices longæ, cylindricæ, sub plena anthesi transversim sesquipollicem crassæ, obtusiusculæ. *Rhachis* sulcata, firma, circiter $1\frac{1}{2}$ lin. crassa, villosa-tomentosa, infra flores ad altitudinem semipollicis usque squamis scariosis ovato-lanceolatis, acuminatis, sursum versus sensim remotioribus et angustioribus vestita. *Flores* e flavo aurantiaci, dense congesti, sub anthesi horizontaliter patentes, singuli bracteis squamiformi ex ovato acuminata, concava, subpatula, extus dense villosa, apice pilorum fasciculo superata, tarde decidua suffulti. *Calyx* fere pollicem longus, rectiusculus vel modice sursum arcuatus, dense cano-tomentosus, tubo cylindraceo medio versus parum angustato, intus nudo, lætius aurantiaco et ob filamenta adnatim decurrentia pluristriato, lobis cochleariformibus 2-2½ lin. longis in alabastrum clavatum coherentibus, crassiusculis, rigidis, demum una cum tubo, styli erumpentis ope longitudinaliter fissis atque reflexis, deciduis. *Antheræ* oblongæ, sessiles vel subsessiles, calycis lobis paulo breviores isque impressæ, basi obiter bilobæ, apice manifeste apiculatæ. *Squamulæ hypogynæ* e lata basi abbreviatim ovales, vel imo semiorbiculares, apice obtuso nunc integre, nunc subtruncatæ aut emarginatæ vel uno alterove denticulo munitæ et non raro in eodem flore inter se heteromorphæ, in vivo flavæ, carnosulæ, exsiccantes subinduratæ et longius persistentes. *Ovarium* ovoidæum, sessile, undique pilis elongatis, rigidulis, albidis, sericeo-nitentibus, primum in comam rectiusculam collectis, mox penicillatim dispositis dense obsi-

tum. *Stylus* filiformis, calyce vix brevior, in alabastro juxta medium curvatus, post anthesim leviter sursum arcuatus, rigidus; stigma subcylindrico-prismaticum, obsolete 4-sulcatum, ad 2 lin. longum, stylo paulo crassior, a medio apicem versus modice clavulato-incrassatum, basi obiter strumulosum, apice obtusiusculum. *Nux* subglobosa, omnino sessilis, pisi minoris magnitudine, undique pilis sericeis ipsa multo longioribus, et inter pilos tomento brevi fulvo obtecta, ad plenam fere maturitatem stylo, tunc delabente, caudata, pericarpio crassiusculo tenuiter suberoso intus levigato. *Semen* subglobosum, seminum *Cannabis sativæ* circiter magnitudine, plane maturum tamen non mihi obviavit.

Observatio.—Species hic proposita ad numerosam speciminum seriem in diversis locis lectorum examinata, quoad spicarum magnitudinem et formam, nec non respectu floris partium inter se proportionem sat constans videtur, quoad foliorum indumentum vero admodum ludit, ita ut varietates, notis constantioribus satis distinctæ, vix et ne vix quidem statui possint. Ast ipsum hoc foliorum indumentum magis quantitate quam qualitate variat, nam semper e villis longiusculis crispatis, plus minusve rigidulis, nunc laxius nunc densius intertextis constat, et in ipsis foliis, quæ primo aspectu penitus glabra vel imo in facie superiore nitidula apparent, accuratiori examine saltem juxta nervum medianum vel ad costarum axillas invenitur. Colorem foliorum fere constanter pallide viridem vidi, nisi in stirpibus in locis valde umbrosis obviis, quorum folia, uti hoc in pari casu generatim occurrit, virore magis saturato tinguntur, simulque magis glabrescunt, circumscriptione vero etiam hac in varietate semper ad formam ovalem tendunt.

2. *FAUREA DISCOLOR*, Welw. n. sp. *F.* ramulis floriferis cano-pubescentibus; foliis tenuiter coriaceis, breve petiolatis, lanceolatis vel lanceolato-oblongis, basi sensim attenuatis, apice acuminatis vel rarius obtusiusculis, margine recurvis, supra primum pruinoso-canescens, mox deglabratis, lucenti-viridibus, subtus per omnem ætatem dense cano-tomentellis; spicis folia superantibus; rhachi bracteisque et calyce 5-7 lin. longo sericeo-canescens, hujusce lobis dorso obiter sulcatis; squamulis hypogynis deltoideis vel semiorbicularibus; ovario undique et dense pilis sericeis ipso triplo longioribus barbato.

Habitat in Distr. Huilla silvis claris mixtis ad 4500-5000 ped. altit. una cum *Acaciis*, *Proteis*, *Parinariis* variisque *Combretaceis* socialis sed parcius obvia. Aprili et Maio florentem vidi. *Ezic.* Welw. *Iter* Angol. no. 1594 et 1595.

Frutex plerumque humane altitudinis, rarius arbuscula 8-pedalis, laxè comosa. *Ramuli* juniores et florigeri dense cano-pubescentes, adultiore glabri, longitudinaliter rugulosi. *Folia* adulta discoloria, supra nempe, pubescentia juvenili nunc deglabrata lucidulo-viridia, subtus autem ob tomentum breve sed densum, subvolutum vel persistens incana, 2½-3½ poll. longæ, ¾-1 poll. latæ, margine integra et obiter recurva, breviter callosa-apiculata. *Spicæ* in ramulis extremis terminales, circiter 4-4½ poll. longæ, iis speciei antecedentis graciliores et angustiores. *Rhachis* (pedunculus) infra flores squamis paucis distantibus vel sæpe nullis obsita. *Bractee* abbreviatæ, a basi dilatata breviter acuminatæ, patulæ. *Calycis* 4-5 lin. longi modice arcuati plus minusve canescens lobis 1½ lin. longi, dorsi sulcis pubescentia nunc copiosiore nunc sparsiore obtectis, ast saltem in calyce decorato semper observandis. *Anthera* apiculatæ. *Squamule hypogynæ* in individuis neutifoliis deltoideæ apice indivise, in specimenibus foliis obtusiusculis donatis autem breviores, subsemiorbiculares. *Ovarii* barba ipso triplo vel rarius quadruplo longior, sericeo-splendens, strictiuscula. *Stylus* pro more generis calycis longitudine, barbam longe superans, juxta medium arcuatus, tarde deciduus, stigmatibus tenuiter clavulato, obscure prismatico, obtusiusculo, basi nunc parum nunc evidentius strumulato. *Fructus* non visus.

Species, vel saltem varietas insignis, quoad spicarum formam et partium floris inter se proportiones antecedenti, quoad foliorum figuram autem sequenti magis affinis, ab utraque tamen foliis ad faciem inferiorem constanter pube brevi, densa, ex albo-cinerascente cano-tomentellis* distinguenda, nihilominus posteriori peregrinatorum observationi denuo commendanda.

3. FAUREA SALIGNA, Harvey, in Hook. Lond. Journ. 1847, p. 373, tab. xv. *F.* ramulis floriferis glabriusculis; foliis lanceolatis, longe acuminatis, in petiolum alatum sensim attenuatis, utraque facie glabris, supra nitidulis; rhachi, bracteis et calyce 4-5 lin. longo sericeo-pubescentibus vel rarius deglabratis; lobis calycinis profunde bisulcatis; squamulis hypogynis lanceolatis, acuminatis vel apice obiter bilobis; ovario pilis sericeis longiusculis, in fructu rarescentibus barbato.

Habitat in Distr. Huilla silvaticis ad 5000 ped. alt., inprimis inter Lopollo et Menino juxta rivorum ripas, vel hinc inde in ipsis torrentium alveis una cum *Salicibus* socialis. Novembri usque ad Januarium et iterum Aprili florentem vidi, Maio c. fr. legi. Primum a cl. Sanderson et Burke in territorii Natalensis interioribus lecta, demum ex iisdem terris a cl. Zeyher et Drege in eorum herbariis divulgata, nuper etiam a cl. D^r Kirk e territorio Mossambicensi (fid. herb. Kew.) reportata. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1592 et 1593.

Frutex elongato-ramosus 5-8-pedalis, hinc inde arbor gracilis 12-20-pedalis, trunco vix unquam diametro 4 poll. excedente, inferne tum longe ramis nudato, his atque ramulis erecto-patulis, plus minusve intense purpurascens. *Folia* 3-5, rarius 6 vel 7 pollices longa, plerumque 6-9 lin. lata, vix unquam sequipollice latiora, recta vel obiter falcata, callo parvulo vel fere lineam longo, atrobubente apiculata, margine integro plana vel obsolete repanda, laxave undulata, jam prima aetate, excluso petiolo hinc inde sparsim puberulo, ad utramque faciem omnino glabra, levigata, late viridia et utrinque vel saltem supra lucidula. *Inflorescentia* omnis quoad pubescentiam densitatem valde varians, sed non nisi rarius penitus deglabrata. *Spicae* graciles, 3-4½ poll. longae, rectiusculae, foliis summis fere semper paulo breviores, ad ramulorum apices singulae vel internodiis contractis in eodem ramulo 2 pluresve gregatae. *Rhachis* infra flores squamis panicis, remotiusculis, acuminatis, erecto-patulis, non raro jam sub anthesi deciduis munita. *Bractea* rigidulae, patulae, concavae, eae florum inferiorum late ovatae, abrupte acuminatae, superiorum abbreviatae, apice obtuso cuspidatae vel fere truncatae. *Calyx* (saltem in speciminibus Angolensibus) circiter 4 lineas longus, vix unquam lineis 5 longior, lobis lineam longis, dorso longitudinaliter sulcis duobus latiusculis, pro more profundis sed obtusis percursis. *Squamulae hypogynae* quam in speciebus antecedentibus angustiores magisque acutatae, longiores quam latae, quondam in uno eodemque flore heteromorphiae, una vel duabus apice acuto integris, reliquis tenuiter bilobis. *Anthera* rarius omnino sessilis sed plerumque filamentis brevissimis sed distinctis inserta et manifeste apiculata. *Nux* ovoidae, 2 lin. longa, 1½ lin. prope medium lata, obtusa, barbæ pilis nunc sparsioribus et plerumque rufescentibus hirta, stylo indurato-rigescente prope medium arcuato, ad plenam fere fructus maturationem persistente caudata, vel demum ejusdem basi remanente apiculata, epicarpio crassiusculo suberoso. *Semen* ad cavitatis latus prope medium fixum, obovoideum, testa membranacea subcariosa brunnea, laxissima vel pro parte omnino soluta.

Ceterum etiam hæc species, quemadmodum duæ præcedentes, nunc foliis longius

* "The existence or absence of pubescence in the adult leaves cannot always be depended upon in distinguishing species; but the short tomentum, especially of their under surface, is of greater consequence than the spreading hairs."—R. Br., "On *Proteaceae*" etc. in *Transact. of the Linn. Soc.* vol. x. p. 25.

(4-7 lin.) petiolatis simulque angustioribus [qualis forma typica], nunc breviter vel brevissime petiolatis (petiolis vix 1-1½ lin. longis) et tum latoribus variat, quæ ulterior forma præsertim in individuis arborescentibus solo sicciore enatis observatur.

Ordo RAFFLESIACEÆ.

Subordo I. HYDNORÆ.

HYDNORA AFRICANA, var. *longicollis*, Welw. (Tab. XXI.) II. perigonii tubo ultra ovarium longe producto, limbi tri-rarius quadrifidi laciniis tubo brevioribus, ramentis heteromorphis, extimis densa serie approximatis, elongatis, liberis, compresso-planis, apice longe acuminatis bi-trilobisve, reliquis absque ordine sparsis, discum versus sensim brevioribus, semiadnatis, apice libero subulatis vel omnino papillæformibus; disci pulvinulis ovato-oblongis, obtusiusculis, basi dilatata subemarginatis, pulvere griseo farinaceo, mox in mucum deliquescente, obductis; annuli staminigeri medio tubi adnati lobis ovoidis erectis, ad utramque faciem antheris elongatis, varic curvatis, inæquilongis, arete adnatis dense obtectis.

Habitat in District. Mossamedes sabulosis maritimis, ex Giraul usque ad Cabo Negro, ad radices *Euphorbiarum* frutescentium nec non *Zygophylli orbiculati* (supra descripti) parasitica. Per totum fere annum, inprimis autem mensibus Martii ad Julium usque floret et fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. n. 530.

Caulis succulentus, perennis vel saltem per plures annos durans, plerumque omnino aut pro majore parte in arena volatili, basin trunci matricis ambiente, sepultus, vetustior circiter pedalis, inferne ad ½ poll. crassus, decumbens vel ascendens, sparse remoteque ramosus, extus obscure fusco-rubens, intus carne densa pallide latericia farctus, 5-7-angulatus, secundum omnes angulos tuberculis uniseriatis, plus minusve approximatis, subglobosis, apice obtuso minus magisve evidentem concentricè rimulosos obiectus, quorum nonnulla scusim intumescencia simulque elongata formam obconicam induunt et demum in perigonia scæ evolvunt, dum reliqua per totam caulis durationem fere immutata permanent, vel parum elongata in ramenta subcompressa, rigida, obtusiuscula collabuntur. *Perigonium* carnosum, rigidum, non raro ad limbum usque in arena absconditum, longitudine varium, 3-7-, imo 8-pollicare, basi rotundato-angustata vel paulo constricta, sessile vel brevissime pedunculatum, extus undique leproso-asperulum, cinnamomeo-brunneum, rugis transversalibus, ad tubi partem cum ovario connatam crassioribus, dense approximatis, notatum. *Tubus* circiter ½ poll. diametro, infra annuli staminigeri insertionem modice attenuatus, intus levigatus vel obiter striis longitudinalibus parallelis percursus et plus minusve late rubescens. *Limbi* laciniæ (plerumque tres, sed hinc inde quatuor, vid. tab. fig. 3) tubo semper et plerumque multo breviores, erasso-triquetræ, arcuatæ, apicibus brevissime et obtuse acuminatis convergenti-patulae, intus ex aurantiaco rubræ, et juxta marginis late induplicati faciem totam ramentis supra descriptis, omnibus introrsum directis, echinulata, eorum discus glaber, sed pro majore parte pulvinulo jam supra notato obtectus, cujus superficies initio albedo-pulverulenta mox post anthesim in mucum viscidulum, odore vehementer stercorario ingratum, strato mucoso *Phallorum* sporidia involventi adeo similem, deliquescit. *Annulus* staminiger tubo ad semipollicis vel imo pollicis distantiam supra stigma insertus. *Antheræ* lætissime flavæ et admodum turgide, spurie biloculares. *Stigma* in vivo sordide albidum, in flore 3-fido tri-, in 4-fido quadrilobum, lobis abbreviatis, horizontalibus, creniformibus, rotundato-obtusis, tenuissime denesque striolatis, striis nunc obliquis, nunc, uti in stigmatate quadrilobo observavi, loborum peripheriæ subparallelis, concentricè curvatis. *Pericarpium* globosum, diametro circiter bipollicari, dure corticatum, extus undique areolis irregulariter pentagonis, parum distantibus, exasperatum, interna facie levigatum, et sulcis te-

nubibus verticalibus, æqualiter distantibus, plus minus manifestis [placentarum in prima juventute forsani parietalium, uti vidisse contendit cl. Eudlicher*, vestigiis?], notatum. *Semina* numerosissima, ad placentas deliquescentes densissime gregata, globosa sive obovoides, seminum *Papaveris somniferi* magnitudine vel recentiora ipsis majora, epidermide crassiuscula, carnosio-pulposa, minutim scrobiculata, demum collabente involuta, testa brunnea tenuiter membranacea, albumini duro arcte adherente, primum in pulpa viscidula semitransparente, pericarpium cavitatem omnino replente, nidulantia, post pulpæ exsiccationem quoad volumen diminuta, in globum subcompactum, cavitatem paullo minorem, undique liberum inter se conglutinata.

Observatio.—Formam hic descriptam primum ab *Hydnora capensi* Thunb. specificè diversam credidi, maxime quoniam apud varios auctores plantæ Capensis tubus limbo multo brevior et parum supra ovarium protractus simulque annulus staminiger stigmati valde approximatus dicuntur vel sic picti exhibentur; postea tamen, speciminibus pluribus in diversis locis lectis inter se comparatis, proportionibus allatas plus minusve variabiles et probabiliter ex majore vel minore soli, in quo plantæ crescunt, profunditate ac densitate derivandas agnovi et plantam Angolensem *Hydnoræ capensi* qua varietatem subungere malui.

Qualitates et Usus.—Omnes plantæ partes, sed imprimis caules [ab aliis "rhizomata" dicti] succo rubente, admodum adstringente scatent, qua ratione a Nigritis et colonis Mossamedensibus ad retia piscatoria variasque telas tingendas adhibentur. Ceterum *Hydnoræ* qualitates eminenter stypticæ, in sanandis ulceribus nec non in corrigendis membranæ mucosæ affectionibus morbosis probabiliter satis proficientes, medicorum Angolensium futuræ experientiæ atque observationi admodum commendandæ.

Subordo II. AFODANTHÆ.

PILOSTYLES ÆTHIOPICA, Welw. n. sp. (Tab. XXII.) *P. floribus* in involucri erumpentis primum globosi demum irregulariter rupti fundo sessilibus, singulis vel binis, basi decussatim paucibracteatis; sepalis petalisque 5-6-meris, obovato-oblongis vel suborbicularibus, margine eroso-denticulatis; petalis sub disco crasso 5-6-angulato insertis, basi tuberculato-callosis, puberulis; stylo late conico, basi disco cincto, stigmatibus hemisphærico, minutim ruguloso-striolato, integro vel brevissime 2-3-lobo.

Habitat parasitica ad ramulos *Berliniæ paniculata* Benth.†, arboris e *Cesalpinicarum* tribu, in Districtus Huilla montosis editis de Morro de Monino, intra 5000 et 5500 ped. altit., Aprili-Maio florens. Flores masculi frequentius quam feminei occurrunt, sed nunquam in eadem arbore simul cum femineis a me visi. *Ervic.* Welw. Iter Angol. no. 529 (masc.) et 529b (fem.).

Arboris ramuli bi- vel triennes, quibus planta nostra innascitur, primum paullo intumescunt simulque circumcirca rimulis longitudinalibus, sæpius interruptis, in fundo materia latericia, tenuissime granulosa repletis, exasperantur. Ex his rimulis paullo post tubercula plus minusve gregata vel plerumque seriata, initio hemisphærica, mox globosa, 2-2½ lin. diametri, dure corticata, undique sulcis minutis concentricis vel squamulis tenerrimis pallide latericiis asperula, intus cava et levigata prorumpunt, quæ demum, jove pluvio stimulata, e vertice dimidiatim vel irregulariter dehiscentia, florem unum [vel rarius duos] in eorum cujusque fundo sessilem et quidem jamjam omnino evolutum denudant‡.

* Conf. Eadl. Gen. Plant. p. 75, Observ.

† Transact. Linn. Soc. vol. xxv. p. 311.

‡ Tubercula hæc, quæ florum canabula sive involucra sistunt, et utero *Angiosterum*, simulque *spathæ Balanophoræ* analogæ videntur, post eorum dehiscientiam nunc bilabiatis hiantia, nunc, parietis lateribus dejectis, sub forma patellæ, in centro suo florem vel fructum gerentis, persistunt, et ramulo matricali imo post florem vel fructum

Flores dioici, roseo-sanguinei, carnosuli, excepta nimia exiguitate, *Rafflerias* habitu omnino æmulantes, primum globosi 1½–2 lin. diametro, sub plena anthesi parum latiores et vertice depressi, ope calli brevissimi carnosus intus albidus centro fundi involucri rupto affixi, e perigonii verticillis duobus biseriatis arcte imbricatis columnam stamineam vel pistillum ambientibus et basi bracteis paucis amplexis constantes. *Bractea* 3–5, orbiculatae vel late obovatae, basi quidpiam incrassata, sessiles, decussatim imbricatae, concavae, margine toto crosso-denticulatae, perigonii verticillo inferiore arcte adpressae eoque breviores et eodem ac flos ipse colore sanguineo ornatae, in fructu persistentes.

Masc. *Sepala* [vel si mavis bractea superiores, reapse juxta spiram ascendentem insertae, sed ob hujus axim adeo abbreviatum in verticillum, calycem simulantem, approximatae] petalis semper isomera, plerumque 6, sed non raro, et quidem in floribus eundem rannum obsidentibus, 5, rarissime 4, e lata basi obovato-oblonga vel suborbicularia, margine pariter ac bractea tenuiter denticulata, petalis aequilonga vel iis paullo breviora, bractea superantia. *Petala* sub disco crassiusculo angulato inserta, sepalis alterna, hisque quoad circumscriptionem et marginis denticulos similia, sed basin versus magis angustata et intus paullo supra basin callo tuberculiformi subspongioso, tenuissime puberulo [pulvulus in disco laciniarum *Hydnora* obvis analogo?] obsita, ceterum ut flos omnis glaberrima, sub anthesi erecto-patula, pressione quidem facile secedentia, sed plerumque non nisi cum flore toto decidua. *Discus*, coronam faucis æmulans, carnosus, latiusculus, viscosus, angulis obtuse triquetris, promiuenti-subascendentibus, petalis isomeris et cum iis alternis, sinibus petala recipientibus rotundato-obtusis. *Columna* staminea inclusa, cylindracea, ima basi disco cineta, sub apice quidpiam dilatata, composita est e stylo centrali [abortivo] firmo, carnosio-farcto, centro pervio, apice, stigmatis loco, pileo fungiformi, depressae hemisphaerico, margine fimbriato, et e tubo staminifero, stylo totum, excluso pileo, arcte vaginante sed ab eo libero, juxta faucem truncatum pileo proximam antheras ferente, infra antheras ad discum usque longitudinaliter et minute costulato-sulcato. *Antherae* numerosae, circa tubi oram simplici serie adnatae, contiguae, uniloculares, poro apicali mox extrorsum versus dilatato dehiscences, effusae demum et collapsae tubi oram sub forma membranae annularis breviter reflexae cingunt. *Pollen* globosum, glabrum, albidum, levissimum et admodum viscosum, imo post antheras effusas harum plagis externis et adhuc majore copia fimbriis pilei, tubum antheriferum supercimentis, adherens atque hocce modo obiter aspicienti alterum, i. e. secundum antherarum verticillum sive aunum fugiens. *Ovarii* vestigium vix ullum, styli axis vero non raro perforatus.

Fem. *Calyx* et *corolla* maris, flos totus tamen sub anthesi quidpiam magis elongatus. *Ovarium* inferum, uniloculare, placentis parietalibus quatuor, multiovulatis, nonnunquam fere omnino inter se confluentibus; ovula oblongo-ovoida, funiculo brevi, latiusculo, laterali, placentis affixo. *Stylus* amplus, brevis, late conicus, basi disco obtusangulo cinetus (intus tenuissime lamellosus?); stigma hemisphaericum, lata basi styli truncati apice insidens, ab ipso etiam colore obscuriore distinctum, undique rugulis striisve minutis notatum, plerumque simplex, rarius bi- vel trilobulatum, lobulis tum cretis mamilliformibus. *Fructus* baccatus, globosus, perigonii phyllis nunc subscariosis artiusque imbricatis omnino obiectus. *Pericarpium* carnosum, crassiusculum, uniloculare, indehiscens. *Semina* plurima, minima, sphaeroida vel subovoida, in pulpa mucosa viscida transparente laxè nidulantis; testa tenuiter crustacea, reticulata, pallide rubra; nucleo cellulis minimis subglobosis (homogeneis) latus rubentibus dense repleto. *Flores* et *fructus* recentes sub pressione fortiori succum roseo-sanguineum, chartam eodem colore sat persistente tingentem exsudant.

Observatio.—Uti ex supra expositis patet, character genericus *Pilostylis* in posterum

delapsam artissime adherent, ast nequaquam ab ipsis matricis cortice, sed pro majore parte, nisi omnino, e membrana colorata, matricis ramulum sub epidermide, mycelii *fungorum cladophytorum* ad instar, obducente demumque obdurante formata inveniuntur.

valde modificandus et ampliandus erit, quod autem non nisi specierum omnium a variis auctoribus hucusque propositarum reiterato examine fieri potest. Omnes species cognitæ, (forsitan solummodo paucarum vel imo unius ejusdemque speciei varietates?) in *Leguminosarum* ramulis parasitantur, omnesque crescendi modo, habitu, florum magnitudine et colore plus minusve rubescente aliisque notis satis inter se congruunt, dum characteres specifici, ab auctoribus indicati, et inprimis a stigmatis figura desumpti, parum constantes videntur. Discus (sive corona faucis) in utroque sexu speciei nostræ pari modo manifestus, sed in reliquarum specierum descriptione non indicatus, neque in generis characterē commemoratus, forsitan in omnibus speciebus accuratius examinatis inveniendus. Genus "*Sarna*" Karst. (Linnæa, xxviii. 725. 1) absque dubio *Apodantheis* nec *Balanophoreis* adsociandum, et ab ipsa *Pilostyle* nullo characterē differre videtur. Generis "*Apodanthes*" Poit. dignitas et a *Pilostyle* differentia fere solum ex pericarpium cavitate tetragona, characterē forsitan non satis constante, pendent, et insuper ob flores masculos necdum cognitos dubiosæ remanent.

Ordo MOREÆ.

MORUS EXCELSA, Welw. n. sp. (Tab. XXIII.) *M.* dioica, trunco robusto elato, ramis patentibus, ramulis petiolis nervisque foliorum subtus glabris puberulisve; foliis sublonge petiolatis, oblongis vel ovato-ellipticis, acuminatis apiculatisve, basi rotundatis, margine subundulatis integerrimis vel obiter repandis et apicem versus obscure dentatis, glabris, subtus pallidioribus, subtilissime pubentibus glabratissive (his arboris juvenilis basi subcordatis, margine toto serrato-dentatis, supra setuloso-asperis, subtus laxè velutino-tomentosis) nervis utrinque costæ ad 15; stipulis lanceolatis subulato-acuminatis puberulis; amentis pedunculatis cylindricis, masculis 5-8 poll. longis, femineis 1-2-pollicaribus; perianthio masculino turbinato-campanulato, sericeo, quadridentato vel quadrilobo; perigonii feminei foliolis linearibus oblongis pubescentibus, apice rotundato cucullato-inflexo barbulatis; stylo excentrico, filiformi, simplici, undique supra medium stigmatoso.

Habitat frequens in silvis primævis elatioribus minus densis Distr. Golungo Alto, Dembos, Cazengo etc. ad 1300-2800 ped. altit., præsertim in declivibus humidioribus de Serra de Alto Queta circa Sauge. Octobr.-Nov. floret, Dec.-Februar. fruct. maturat. A Nigritis dicitur "*Mucamba-camba*." *Exsic.* Welw. It. Angol. no. 1559.

Mucamba-camba, *especie de Morus*, Welw. Synopsis, p. 8.

Arbor speciosa, excelsa, copiose lactescens, inter silvarum primævarum Angolæ gigantes laudanda, bene adulta 100-120-, imo hinc inde 130-pedalis et altior. *Truncus* rectus, cylindricus, circumferentiam 20-30-pedalem attingens, cortice pro amplitudine arboris haud profunde rimoso, griseo, in individuis vetustioribus ad 40-60 ped. ejus altitudinis ramis denudatus, apice coma late extensa, depresso-hemispherica coronatus. *Rami* vagi, horizontaliter expansi, aliquanto tortuosi, griseo-fuscescentes; ramuli varie curvi, glabrati, stipularum cicatricibus semicircularibus exasperati, novelli purpurascetes, lenticellis elongatis albidis obsiti et plus minusve puberuli vel hinc densius pubescentes. *Folia* annua, sæd tarde decidua, penninervia, quoad circumscriptionem semper integra (f. e. nunquam lobata), respectu indumenti vero secundum arboris ætatem maxime varia; ea stirpis juvenilis quam in adulta multo majora quidem, et inprimis longiora sed brevius petiolata, petiolis circiter semipollicaribus, villosopubescentibus, lamina 6-7 poll. longa, 3-5 poll. lata, basi obiter vel profundius cordata, margine

circumcirca dense serrato-dentata, apice abrupte in acumen fere semipollicare terminata, supra setulis sparsis aspera, subtus plus minusve dense velutino-tomentosa: in arbore adulta florifera foliorum petioli 1-1½ poll. longi, glabriusculi; lamina 4-5 poll. longa, 2-3 poll. lata, basi rotundata, apice brevius acuminata vel cuspidata, margine obiter repando solum a medio apicem versus breve denticulata, supra intense viridis et glaberrima, subtus pallide virens, omnino glabra vel, inprimis juxta nervos, tenuiter puberula, rarius pube densiore, non nisi sub lente fortiori conspicua, subvelutina; costa sive nervus medius supra vix, subtus valide et obtuse prominens; nervi laterales utrinque 13 usque 17, sæpiissime 15, alterni, sub angulo acuto divergentes, recti, inter se strictim paralleli, quam costa multo tenuiores, simplices, paulo ante marginem in venulas soluti, una cum costa nunc flavicantes, nunc e flavo purpurascetes. *Stipulae* circiter 8-10 lin. longæ, caducissime. *Flores*, a me quidem semper dioici observati, non nisi in arboribus vetustioribus (saltem 15-20 annorum) obvii, ad ramulorum novellorum basin prorumpentes. *Amenta* mascula et feminea cylindrica atque pendula; *mascula* graciliora, elongata, non raro ad 7 vel 8 pollices longa, densiflora, 3-4 lin. diametro, pedunculo 3-5 lin. longo, cylindrico et pubescente; perigonium flaccide membranaceum, albidum, campanulatum patulum, nunc 4-dentatum dentibus deltoideo-ovatis, nunc profundius 4-lobum, lobis ovatis obtusiusculis; filamenta longe exserta, una cum antheris alba; rudimentum ovarii constanter obvium, squamuliforme, oblongum, compressum, e centro floris erectum. *Amenta feminea*, non nisi in statu maturescente (syncarpia) observata, masculinis 3-4-plo breviora, sed iis crassiora, 7-8 lin. diametro, densa, carnosio-turgida sed parum succosa, e viridi flavicantia, stylis longius exsertis nunc jam exsiccatis rigidulis undique horridula; perigonii, basi pilorum circulo stipati, foliola carnosio-tumida, vix inter se coherentia, apice obtuso, incrassato pilisque brevibus barbato, cucullatim inflexa; achenium breve stipitatum, compresso-obovoideum; stylus lateralis, achenio saltem 3-plo longior, filiformis, subflexuosus, a medio ad apicem breviter acutatum stigmatosus. *Semen* obovato-oblongum, linea 1 parum longius, lenticulari-compressum, umbilico prope verticem laterali, testa badia, crustacea, fragili; embryo generi conformis; albumen respectu embryonis voluminis parum.

Qualitates et Usus.—Lignum recens albidum vel ex albidio leviter flavescens, demum badio-fuscescens, venis latiusculis varie curvatis et undulatis obscurioribus variegatum, ob tenacitatem longamque durationem inter Angolæ autochthones et colonos Lusitanos multiplici usus. Syncarpia numerosos passerum greges lauto pabulo sustentant; amenta mascula exsicando chartam colore lacte sulphureo tingunt.

DORSTENIA (KOSARIA) VIVIPARA, Welw. n. sp. *D.* radice globoso-tuberosa, carnosio-farcta; caule simplici, spithameo, gracili, erectiusculo vel ascendente, cylindrico, obiter pubescente, ad nodos inferiores viviparo; foliis longiuscule petiolatis, ovatis, margine ciliolatis, basi breviter angustata integris, a medio ad apicem obtusiusculum usque obtuse dentatis, glabriusculis vel sæpius, inprimis subtus juxta nervos, puberulis; receptaculis in foliorum superiorum axillis solitariis, longe et gracillime pedunculatis, 6-9-radiatis, radiis patulis, rectis, lanceolatis, margine ciliatis.

Habitat gregaria sed paucis locis in umbris humosis juxta rivulorum ripas Distr. Pungo Andongo, frequens juxta rivum Candange-camatuta, ad 3200-3500 ped. alt. supra mare. A Decembr. usque ad Febr. floret et fructificat. *Essic.* Welw. It. Angol. no. 1565.

Herba tenera, debilis, flaccidula, pallide virens. *Tuber* globosum, pisi majoris vel nucis avellanæ minoris mole, dense farctum et, uti omnis planta, copiose lactescens, quolibet anno perit, stirps autem ope tuberculorum in axillis foliorum infimorum sese evolvendum demumque radicans perennat. *Caulis* carnosulus, fragilis, subflexuosus, primum erectiusculus, mox decumbens vel ascendens, ad nodos inferiores tuberculiferos radicans. *Folia* penninervia, tenuiter membranacea, ovato-acuminata, basi breviter angustata, dempto petiolo gracili subpollicari 1½-2 poll. longa, ¾-1 poll. lata; dentes ad

utrumque laminae latus pauci, distantes et obtusi, sed constanter obvi. *Stipulae* obsoletae. *Pedunculi* patentes, gracillimi, leviter pubescentes, florigeri petiolis breviores, fructiferi iis semper longiores. *Receptacula* parva, parum succulenta, dorsum convexa, fere campaniformia, in juventute pubescentia, fructifera glabrata, herbaceo-viridia, demptis radiis 3 vel vix 4 lin. diametro, radiis singulis ad 2 vel 3 lin. longis, puberulis vel glabris, margine semper breviter ciliatis, a lata basi sensim acuminatis, sinibus obtusis et integris separatis. *Semina* globoso-triquetra (vix ac ne vix quidem uncinata), testa tenuiter crustacea albidia, papillis minimis undique exasperata.

Species, ut videtur, distinctissima, nulli cognitarum arctius affinis, inter Africanas etiam caule viviparo et totius plantae teneritate insignis.

DORSTENIA (KOSARIA) BENGUELLENSIS, Welw. n. sp. *D.* radices tubere depresso globoso vel placentiformi; caule centrali, firmulo, erecto, simplici, spithameo sive pedali, cylindrico, succulento, dense pubescente, inferne aphylo; foliis a medio caulis apicem versus sparsis, sensim majoribus magisque approximatis, subsessilibus vel brevissime petiolatis, penninerviis, lanceolatis, oblongo-lanceolatis ellipticisve, basi parum angustatis, margine toto dentatis, apice obtusiusculis, utriusque pubescenti-hirtulis scabruisive; stipulis lineari-lanceolatis, brevibus, fugacibus; receptaculis in foliorum superiorum axillis solitariis, breve pedunculatis, erectis, concaviusculis, dorsum convexis, sordide flavicantibus, subglabris, ore orbiculato truncato 7-11-radiatis, radiis patentibus, lineari-spathulatis, apice puberulo obtusis.

Habitat rarior et sporadica in pascuis parce dumetosis, arenoso-humosis, breve herbis Distr. Huilla circa Lopollo, inter 4500 et 5200 ped. altit. Legi Decbr. 1859 c. fl. et fr. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1566.

Tuber plerumque placentiforme, 1-1½ poll. diametri, carnosio-farctum, copiose lactescens, basi circumcirca fibris elongatis, tenuibus, breve fibrillosis stipatum. *Caulis* (plerumque unicus, raro duo) et tuberis centro erectus, ½-1-pedalis, pennae anserinae circ. crassitudine, succulentus (exsiccatione valde contractus), cylindraceus, et viridi purpurascens vel omnino purpureus, undique dense pubescens, ad ½ ejus altitudinem aphyllus vel squamulis paucis distantibus obsitus. *Folia* medii caulis ½-1-pollicem inter se distantia, summa latiora et fere fasciculatim approximata, subcarnosa et rigidula, erecto-patula; petioli ½-1 lin. longi compressi; lamina foliorum majorum 10-14 lin. longa, 3-5 lin. lata. *Receptacula* pauca (1-4 in quoque caule), pedunculis 2-3 lineas longis, crassiusculis, firmis suffulta, ore, demptis radiis 3-4 lin. diametro; radii singuli 3 lin. longi, medio vix semilineam lati, denticulo uno alterove interjecto separati, fere ligulaeformes, apicem versus modice dilatati, rotundato-obtusis et puberulis, stellatis expansi, ceterum, uti receptaculum, sordide flavicantes et carnosuli. *Pericarpia* apice breviter bivalvia, post seminis ejaculationem valvas arcu claudunt, parietum succulentorum incremento adhuc per aliquot tempus continuante crassiora fiunt et elongantur demumque flosculorum masculorum planum perforant et longe super illud, stylis suis adhuc apiculata, eminent. *Semina* iis speciei antecedentis omni sub respectu valde similia.

Observatio.—Caulis in omnibus speciminibus loco citato a me lectis simplex est, sed in eorum paucis folia medii caulis foliorum parvulorum fasciculum in axillis gerunt, qui forsitan tardius in ramulum evoluturus.

DORSTENIA (SYCHINIUM) PSILURUS, Welw. n. sp. *D.* rhizomate cylindraceo, repente, nodoso, carnosio-farcto, ad nodos fibris longis gracilibus et hinc inde tuberculis clavatis stipato; caule erecto, simplici, 1-2½-pedali, teretiusculo, subsucculento, inferne glabriusculo et laxius, apicem versus densius foliato et pubescente; foliis longiuscule petio-

latis, membranaceis, penninerviis, glabriusculis vel præcipue subtus juxta nervos hirtulis, in petiolum attenuatis, sæpius in eodem specimine polymorphis, basi semper cuneatis, integris, nunc ovato-ellipticis, acuminatis, margine dentatis, nunc obovatis vel obcuneatis, apicem versus plus minus profunde inciso-dentatis vel 3- plurilobatis, lobis inæqualibus, erectis vel patulis, elongato-triangularibus, acuminatis; petiolis angustis, inferioribus elongatis stipulisque parvis lineari-lanceolatis pubescentibus; receptaculis axillaribus, subsolitariis, longe graciliterque pedunculatis, verticalibus, lineari-lanceolatis, hirturibus, crure uno brevior deflexo, abrupte appendiculato, altero erecto longiore, apice simplici vel rarius bifurco, sensim in appendicem ipso crure duplo triplove longiorem, subulatum, rectam prolongato.

Habitat in convallibus umbrosis ad rupium latera Distr. Pungo Andongo ad 3200 ped. circiter altitudinis, præcipue in silva primaeva dicta "Mata de Pungo" prope vicum Pungo Andongo. Floret Nov.-Jan., Decbr. ad Mart. fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1564.

Rhizoma horizontaliter reptans vel oblique descendens, circiter pennæ auserine crassitudine, quidpiam flexuosum et hinc inde nodoso-tumidum, ad nodos præter fibras longas tenues uuum vel plura tubercula elongato-claviformia, duriuscula sed succulenta, 1-2-pollices longa, dorsum emittens. *Caules* e rhizomatis collo, plerumque solitarii, rarius 2-3, erecti, teretes, parum succulenti, basi glabriusculi, a medio apicem versus sensim densius pubescentes, pube pilis brevibus patulis hyalinis intermixta, subviscida. *Folia* inferiora 2-3 pollices a se invicem distantia, petiolis bipollicaribus, canaliculatis, pubescentibus, versus caulis apicem sensim brevioribus, summis vix lineam longis, patulis suffulta, tenuiter membranacea, demum petiolo 4-6 pollices longa, 2-3 poll. lata, supra late viridia, glabriuscula vel pilis brevibus raris adspersa, subtus juxta nervos hirtula multoque pallidiora, quoad figuram in eodem specimine maxime variantia, plerumque obovato-acuminata vel obcuneata, basin versus in petiolum attenuata ibidemque integra, a medio laminae versus apicem dentata, incisa vel lobata, dentibus lobisve terminalibus tum erectis, quam laterales divergentes longioribus, omnibus plus minusve acuminatis vel acutatis sæpiusque apiculo parvo obtuso terminatis; non raro simul cum hisce formis in eodem caule etiam folia elliptico-lanceolata vel ovato-elliptica, margine remote grosse dentata, apice in acumen longiusculum elongato-triangulari producta inveniuntur. *Stipulae* anguste lanceolatae vel lineares, longe acuminatae, petiolis multoties breviores, dense pubescentes, hinc margine ciliatæ. *Pedunculi* erecti, graciles, eorum longiores bipollicares; receptacula herbaceo-viridia, parum carnosa, in pedunculo verticalia, una cum appendice terminali 3-5 poll. longa, subsemicylindrica, sub prima anthesi latere quidpiam compressa, formam lanceolato-linearem fingentia, fructifera demum [ob ovaria turgida] longitudinaliter torulosa. *Flores masculi* semper monandri a me visi; perigonii tenuissimi limbus breve et irregulariter 3-4-dentatus vel fere obsolete; filamentum e fundo tubi erectum, liberum, latiusculum, subcompressum; anthera exserta, didyma, rubro-purpurea. *Ovaria* quam flores masculi multo pauciora, ad utrumque latus costæ receptaculi stipiti brevi seriatim inserta, stylis solis supra florum masculorum planum breviter porrectis; stylus plerumque bicurvus, cruribus tum luteis stigmatosis, rarius indivisus et apice subdilato fimbriato-papillosus. *Pericarpia* globosa, in receptaculi contextu arachnoideo-celluloso nidulantia, etiam maturitate vix supra planum antheriferum eminentia. *Embryonia* uncinati radícula abbreviato-conica, quam cotyledones obovatae, plicato-venosae, inæquales, in stipitem angustatae, multoties brevior.

Qualitates.—Rhizoma omne et præcipue tubercula oleo æthereo suavissime aromatico pollent et etiam excisecata aroma per plures annos fere immutatum conservant. Stirps proinde verisimiliter eadem ac plures *Dorstenie* Brasilienses virtute diaphoretica et roborante, vel forsan adhuc efficacior gaudet, sique medicis Angolensibus, in dysenteria morbisque affinis sanandis, ceu remedium indigenum magnopere commendanda.

Ordo GNETACEÆ.

GNETUM AFRICANUM, Welw. n. sp. *G. fruticosum*, dioicum; caule cylindraceo, gracili, volubili, alte lateque scandente, remote ramoso, ramis ramulisque patentissimis vel retroflexis pendulisve, herbaceo-viridibus, levigatis, valde tenacibus, ad nodos parum incrassatis; foliis breve petiolatis, chartaceo-rigidulis, penninerviis, ovali-vel elliptico-oblongis, rarius lanceolatis, basi sensim vel abruptius attenuatis, nunc subrotundatis, apice abruptim sensimve in acumen 3-5 lin. longum, lanceolatum vel lineare, plerumque obtusum, hinc inde acutiusculum protractis, margine integris vel remote subcrenatis, utrinque levigatis, sub lente fortiore dense pellucido-punctatis, supra late viridibus nitidulis, subtus pallide virentibus; amentis masculis ad ramulos abbreviatis laterales et apicales terminalibus, solitariis, longius pedunculatis, simplicibus, rhachide compressiuscula, apice conico-subulata, verticillis remotis, globoso-capitatis, involucris cupuliformibus ore truncato subnudis; amentis femineis drupisque non visis.

Gnetum, spec. Welw., Apontam. (1858), p. 545, cum observ.

Habitat in Districtus "Gologno Alto" editoribus (2200-2400 ped.) umbrosis silvarum primitivarum de Serra do Alto Queta, ubi Januar. et Martio florentem vidi, sed stirpem femineam observare non licuit. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1224 & 1225.

Trunculus in speciminibus a me observatis circiter digitum crassus, cylindraceus, subflexuosus, inferne cortice tenui cinerascente hinc inde rimulis angustissimis distantibus notato, tectus, mox ad duos vel tres pedes supra basim trichotome divisus, ramis lateralibus oppositis et intermedio caulem prolongante iterum repetito-trichotomis. *Internodia* inferiora vix bipollicaria, demum sursum versus sensim longiora, in canlia parte superiore ad 6-8 pollices longa, ad nodos modice tumida. *Rami* inferiores circiter pennæ corvine crassitudine, superiores et ramuli vix fili emporitice crassitudine, omnes angulo recto patentes vel retrofracti, hinc inde volubiles, extimi flagelliformes, sicut *stirpem* inter arborum vicinarum frondes late scandentem suspendentes vel ex altiorum arborum coronis longe penduli, pallide herbaceo-virides, rigiduli et tenacissimi, ad imam basim non raro corniculis duobus oppositis, brevibus, rigidis, patentibus, stipulas aculeiformes fingentibus sed reapse ex petiolorum basi remanente et indurata foliorum delapsorum oriundis, muniti. *Folia* perennia, sicut eorum vetustiora non raro ad faciem superiorem variorum Lichenum epiphyllorum orbiculis varie coloratis ornata, etiamsi vix coriacea; petioli 3-4, rarius 5 lin. longi, canaliculati, plus minusve acute carinati, basi vaginante carnosulo-tumidi, hinc exsiccatione plerumque transversim rugulosi, post laminæ lapsum in cornicula supra notata indurati, longe persistentes, et una cum eorum vagina caulis ramorumque nodos stipantes; lamina foliorum plene evolutorum 4-5 poll. longa, 2 poll. lata, nervis supra vix, sed mediano subtus ad laminæ medium usque manifeste prominente, costis utrinque 5 vel 6, arcuato-patentibus, sursum et marginem versus sensim evanidis, in vivo e viridi flavescētibus. *Amenta* mascula terminalia, solitaria, gracilia, rectiuscula vel obiter arcuata, pedunculo subcompresso circiter semipollicem longo, ima basi pilorum rufescentium circulo, supra medium bracteis 2 oppositis, ovalibus, acutis, erectis, basi vaginantibus munito, suffulta, excluso pedunculo 2-2½ pollices longa, verticillis 8-10, rarissime pluribus, singulis inter se 1½ lin. distantibus, densifloris onusta; involucra breviter cyathiformia, ore truncato plerumque omnino nuda vel hinc inde tenuiter crispula, staminibus pro more sat longe exsertis coronata. *Filamenta* simplicia, involucella longe superantia, antheris biporosis flavicantibus terminata. *Rhachis* amenti ultra verticillum summum in acumen elongato-conicum, plus minusve acute subulatum, 1½-2 lin. longum strictumque protracta. Cetera generis.

Observatio.—Stirps ab autochthonibus passim “N-Coco” nuncupatur et rami eorum longitudinem et tenacitatem chordarum ad instar utuntur; folia recentiora autem cocta atque oleo palmarum condita spicidum ipsis cibum offerunt, etiam mihi in istis solitudinibus non raro graviter esurienti nequaquam ingratum. Fructus maturi, qui ex Nigritarum descriptione oblongo-ovoidci et læte rubentes, nucleum pro more sat amplum includunt, ob avium simiarumque voracitatem non nisi rarius inveniendi.

Ordo CYPERACEÆ.

Trib. HYPOLYTREÆ, Nees, Endl. Gen. Pl. 216*.

ASCOLEPIS, Nees.

Genus reformatum et ampliatur :

Spicula numerosissimæ in capitula densa hemisphærica vel subglobosa, longe bracteato-involucrata, dispositæ, receptaculo depresso globoso vel hemisphærico, distincte alveolato, insertæ, bisquamosæ. *Squama* exterior plana, angusta, acuminata, vacua, floriferam stipam eaque brevior; squama interior spongioso-turgida, basi interna in rimula hiantæ florifera, hermaphrodita, sursum in appendicem subulatham vel compressæ subprismaticam, longitudine variam angustata. *Stamina* 3 vel 2, rarius 1; filamentis filiformibus, antheris linearibus obtusis. *Setæ hypogyne* nullæ; discus nullus vel rudimentarius. *Ovarium* anguste ovoidcum, obtuse vel acutius trigonum; stylus brevis, basi æqualis, stigmatibus 3, rarius 2, filiformibus, obtusiusculis. *Caryopsis* libera, anguste latiusve obovoidca, plus minus evidenter trigona vel tricostrata, glabra†, vertice nuda vel brevissime apiculata aut truncata, lateribus subtilissime impresso-punctulata, quam squama fructifera multoties brevior.

Herbæ elegantulæ, perennes, erectæ, in Africa tropica cis- et transæquatoriali observatæ, cæspitosæ, glabræ, basi foliosæ. *Folia* filiformia vel anguste linearia. *Culmi* stricti, graciles, obscure angulati, rarius firmiores et sulculati, basi succulento-tumescens, foliis laxè vaginantibus vestiti, superne longe nudi, moucephali, infra capitula modice incrassati. *Capitula* globosa, discoidea vel pseudo-radiata, involucri polyphylo, e foliolis inæquilongis basi dilatata membranaceo-marginatis composito, suffulta, nunc *Kyllingiarum* vel *Eriocaulonearum*, nunc quarundam *Compositarum* capitula radiata mire æmulantia. *Spicula* basi arcte imbricatæ, apice libere, erectæ vel patentæ, coloratæ, nivæ, lactesce, flavæ vel auræ, nunquam omnino viridescens, collapsæ demum varic costulatæ vel angulatæ ac plus minus rigidescens.

Ascolepis, Nees in Plant. Schimp. Abyss. sect. iii. no. 1064.

Kyllingia spec., Steud. in Flora [B. Z.], 1842, p. 597.

Isoplepis spec., A. Rich. Tent. Flor. Abyss. ii. p. 501.

Antrolepis, Welw. Apout. p. 578.

Antrolepis, Thomson in Speke's 'Journ. of the Disc. of the Source of the Nile,' p. 654.

Genus *Platylopidi* Kunth affine et proximum, sed, ni fallor, bene distinctum, hucusque monotypicum, ab acutissimo Neesio ad specimina a cl. Schimper in Abyssinia lecta recognitum, ne dicam divinatum, sed vix ullibi verbis definitum. Differt autem *Asco-*

* Tribus *Hypolytrearum* a C. Neesio olim introducta, nec tamen bene limitata, postea ab Endlicherio l. c. quidpiam reformatam, nunc generis præsentis speciebus pluribus quodammodo illustrata, in posterum, characteribus *Ascolepidi* additis, accuratius circumscribenda.

† *Caryopsis* plene matura sæpius membranula tenuissima, hyalina, arcte adglutinata, sub tritu frustulatim succedente, sed in ovario sub anthesi vix perceptibili obducta invenitur, sicque, obiter aspecta, grisea et omnino levigata, vix punctulata, apparet.

lepis a *Platylepide* receptaculo hemisphaerico (nec elongato-conico), squamis floriferis subcylindraceo-turgidis (nec plano-compressis), genitalibus in eorum rima basali sitis et liberis (nec intra squamæ utriculum inclusis), stylo typice trifido (nec constanter bifido), caryopsi demum trigona libera (nec biconvexa et in ipso squamæ fructiferæ utriculo inclusa.

A *Kyllingia*, quaecum species typica [i. e. *Ascolepis eriocauleoides* Nees] a cl. Steudel in plantis Schimperianis Abyss. Sect. II. no. 1195 et postea in Flora (Bot. Zeit.) loco supra citato conjungitur, nec non ab *Isolepide*, cui eadem species ab A. Rich. in Flor. Abyss. subscripta fuit, *Ascolepis* non solummodo genere, sed imo, uti ex supra allatis patet, tribu differt; non enim *Scirpeis* neque *Cypercis*, sed tribui *Hypolytrearum* prope *Platylepide* adjungenda.

Vegetationis modum quod attinet, species omnes densius laxiusve cæspitosæ crescunt, earumque individua, eximio socialia, capitulis innumeris hinc vere et æstate prætā paludosa, illinc autumnali tempore pascua montana humidiora denso agmine decorant, hocque modo, dum vix non semper cum *Xyrideis*, *Eriocauleis*, *Commelynaceis* atque *Irideis* pumilis, colore et elegantia æque insignibus sociatæ, pascuis illis characterem peculiarem admodum variegatum imprimunt. Species singulæ autem vix unquam in eodem loco promiscue inter se crescentes observantur, et simul etiam rhizomatis indole atque perennandi modo inter se diversæ, unde commode in duas sectiones divelluntur. Species nempe tenuiores rhizoma offerunt e culmorum basi carnosio-incrassata et bulbulis gemmaeformibus, intra bulbi matricialis vaginas exteriores nascentibus fibrisque crebris gracilibus stipitatis laxè conflatum, dum contra species robustiores rhizomate gaudent lignescente, horizontali vel oblique descendente, ex quo culmi floriferi, basi itidem carnosio-tumidi, seriatim vel fasciculatim gregati assurgunt. Species rhizomate bulbulifero donatæ plerumque præcocius sunt, sed individuorum vegetatio, etiamsi jam incunte vere incipiens, ob bulbulorum in culmos florentes evolutionem successivam, pluviarum copia vel paritate moderatam, in variis locis non raro ad æstatis finem usque extenditur, siquæ crebris temperaturæ et humiditatis vicissitudinibus exposita, unde, saltem pro parte, facies polymorpha capitulorum speciei maxime vulgaris, in diversis soli elevationibus æque frequenter occurrentis (*Ascolep. proteæ* nostræ) explicatur; species robustiores autem, rhizomate repente vel nodoso simulque profundius penetrante perennantes, tardius sese evolvunt, non nisi versus æstatis finem vel incunte autumno florescere solent, siquæ imbribus copiosioribus et longius persistentibus irrigatæ, nec non temperaturæ vicissitudini minus subiectæ, etiam quoad capitulorum magnitudinem spicularumque formam et colorem magis constantes inveniuntur.

§ 1. *Rhizoma tenuiter fibrosum, bulbuliferum; caryopsis* $\frac{1}{2}$ lin. longa, vertice dilatato rotundato-obtusâ*.

1. *ASCOLEPIS PROTEA*, Welw. Culmis (floriferis) 3–10 poll. altis; foliis basilaribus [i. e. e bulbulis non nisi sequente anno culmiferis enatis] fasciculatis, angustissime linea-

* Huic sectioni etiam species typica, nempe *Ascolepis eriocauleoides* Nees, l. c. (*Isolepis Ascolepis* A. Rich. l. c.), in Abyssiniæ montosis primum a cl. Schimper, demum a C. Martin Dillon lecta, inserenda. Specimina sicca hujus speciei Schimperiana, quæ in Herb. Kew. et in Museo Brit. præstant, sat bene cum descriptione Richardii conveniunt, excepta spicularum squama dorsali vacua, a Richardio prætermissa, sed certe obvia. Quoad habitum et capitulorum molem hæc species formis microcephalis *Ascolepidis proteæ* β *bellidifloræ* nostræ satis similis, sed floribus

ribus vel fere capillaribus, erectis, culmo duplo triplove brevioribus, caulinis duobus vel sæpius solitario, culmi basim laxè atque vaginante, quam basilaria duplo latiore et plerumque arcuatim patulo; capitulis nunc globosis $2\frac{1}{2}$ –4 lin. crassis, nunc plus minusve hemisphæricis, transversim 3–8 lin. latis; spiculis albis vel flavis; squamis floriferis ovalibus, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, a medio apicem versus subulatis vel compresso-cylindricis, obtusis vel acutiusculis, singulis e capituli centro peripheriam versus sensim longioribus; staminibus 3 vel rarius 2, stylo tri-vel bifido; caryopsi minima, $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$ lin. longa, obovoidea vel pyriformi, obscure trigona, vertice rotundato-obtuso vix apiculata, ad basim conico-attenuatam oblique truncata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo et Huilla montosis brevè herbidis subpongiosis a 3200 ad 5000 ped. altit., in demissioribus locis a Novembri ad Martii initium, in editioribus a Januario usque ad Maium florens. Etiam in Africa centrali observata.

Stirps quoad capitulorum figuram et magnitudinem squamarumque florigerarum configurationem et colorem maxime polymorpha, formis numerosis, primo aspectu inter se, uti dicere solent, toto cælo diversis ludens, quæ tamen accuratius examinatæ et comparatæ sensim atque sensim inter se conflunt, ita ut imò varietates, characteribus aliquomodo constantioribus circumscriptæ, non nisi difficiliter et vix bene limitatæ statui queant. Sunt tamen formæ distinctiores sequentes:

- a. *kyllingioides*: capitula virescenti-albida vel sordide lactea, spherica vel depresso globosa, 2–3 $\frac{1}{2}$ lin. crassa; squamæ floriferæ abbreviatæ, ovals vel lato-lanceolatæ, compressiusculæ (in sicco subplanæ), apice obtusæ vel parum acutæ; stamina et stigmata 3; caryopsis vix unquam $\frac{1}{4}$ lin. longior, angulo uno alterove magis prominente.

Habitat in declivis brevissime herbis sed humidiusculis inter rupes editiores [3400 ped.] ipsius Præsidi Pungo Andongo loco dicto Tunda Quilombo, nec alibi in omni Angola a me observata. Floret Nov. Decbr. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1667.

Forma omnium præcocior, capitulis plus minusve globosis, compactis, sordide albenibus, *Kyllingias microcephalus* æmulans. Squamæ floriferæ quidem, uti in omnibus sequentibus, turgide, sed latiores et breviores simulque quidpiam compressæ, in sicco demum fere planæ apparent et extus 1–3-nerves.

Huc forsitan: *Isolepis Kyllingioides* Rich. Tent. Abyss. ii. 502 trahenda?, sed auctor caryopsim apice acutam dicit, qualem in nulla *Ascolepidis proteæ* varietate observavi.

- β. *bellidiflora*: capitula splendide nivea vel lactea, depresso hemisphærica, transversim 5–8, rarius 3–4 lin. lata, centro plerumque excavata, *Bellidem perennem flore pleno* mire fingentia. Squamæ floriferæ graciles, elongatulæ, lanceolatæ vel lineari-lanceolatæ, apicem versus subulatæ vel compresso-cylindricæ, in sicco demum angulatæ, plerumque laxius quam in α et γ imbricatæ. Caryopsis in speciminibus robustioribus $\frac{1}{4}$ lin. longa, omnino sessilis.

Habitat in Distr. Pungo Andongo ad 3000 ped. alt., Januario et Febr. florens, nec non in Distr. Huilla pascuis editis ad 5000 ped. alt., ibidemque a Febr. usque ad Maium floret. In Africa centrali durante

constanter monandris et squamis floriferis a basi latiore apicem versus longissime acuminato-subulatis differt. Specimina tamen solummodo pauca, et quidem non nisi e culmis singulis a cæspite solutis constantia, necdum fructifera, examinare licuit.

expeditione Spekeana (fid. Herb. Kew.) a cl. Capt. T. A. Grant in 5° 26' lat. austr. ad 3900 ped. altit. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1668 & 1672 (formae platycephalæ), dein 1671 & 1667 b (formae microcephalæ).

Antrolepis leucantha, Welw. Apont. p. 578 (nomen cum observ.).

Antrolepis, sp. n., Thomson, l. c. p. 654*.

Capitulorum magnitudo hujus varietatis admodum variat, sed eorum figura (etiam in formis microcephalis, locis macrioribus enatis, et iis varietatis a vix majoribus) semper plus minusve depresso hemispherica, disco ad centrum subexcavato. *Squamæ* floriferæ in formis microcephalis acutius subulatæ, rectiusculæ, in platycephalis obtusiores et frequenter sursum arcuatæ. *Stamina* in hac varietate non raro 2; stylus nunc elongatulus 3. vel 2-fidus, nunc brevissimus vel fere nullus; i. e. stigmata 3 vel 2, ovarii apici insidentia, elongata.

γ. *santolinoides*: capitula sulphurea aut lutea vel intense aurea, ea *Santolarum* vel *Anacycli aurei* quodammodo simulantia, plerumque quam in varietate præcedente robustiora et magnitudine minus variantia. *Squamæ* floriferæ paullo turgidiores et obtusiores, excepta forma maxime serotina (exsic. no. 1673) in qua sensim longe acuminatæ occurrunt. *Caryopsis* circiter $\frac{1}{2}$ lin. longa.

Habitat in Distr. Pungo Andongo socialis cum var. β, paullo serius florens, et in Distr. Huilla spongiosis de Morro de Lopollo, ad 5200 ped. una cum *Drosera*, *Utricularia*, et *Disa* speciebus. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1664, 1666, et 1673.

Antrolepis sulphurea et *A. Santolina*, Welw. Apont. l. c. (nomina c. notula).

Observ.—Cespites omnium varietatum laxiusculi. *Culmi* in α et β tenuiores et breviores, sed in omnibus varietatibus quoad longitudinem valde variantes, vix unquam tamen quam 10 vel 12 poll. longiores, basi constanter bulboso-tumidi, disco parvulo, carnoso, fibrilifero suffulti, vaginis emarcidis, basi bulbolum 1 vel plures foveitibus, vestiti; bulbuli minuti, *Cannabis* seminibus vix majores, durante anthesi culmi matricialis folium unum vel plura fasciculata emittunt, quæ cespitis folia basilaria sistunt, caulinis et involucralibus semper angustiora, sed longiora. *Involucrum* capituli basin arcte amplectens, 7–10-phyllum; foliola a basi latissima, extus profunde plurisulcata, sensim vel abruptius in laminam lineari-lanceolatam acuminata, exteriora 2–4 reflexa, infimo longiore 1–2-pollicari; interiora sensim breviora, squamæformia, spiculis adpressa, iisque æquilonga vel paullo breviora. *Spicularum* longitudinem secundum capitulorum diametrum varians, in formis microcephalis lineam vel æquilineam, in platycephalis, inprimis exteriores, ad 2½–3 lineas longæ; squamæ vacuæ tenues, lineari-lanceolatæ, planæ, basi hyalino-membranacæ, floriferis breviores et multo angustiores, earumque dorso arcte adpresse vel fere adglutinatæ, sique, præcipue in exsiccatis, facile prætervisæ. *Caryopsis* cinereo-fuscescens vel nigricans, angulis, inprimis vertice et prope basin, non raro obscuris vel omnino evanidis.

2. *ASCOLEPIS ANTHEMIFLORA*, Welw. n. sp. (Tab. XXIV. fig. 9–13.) *A.* culmis 1–1½-pedalibus, gracillimis; foliis basilaribus anguste linearibus, culmo multo brevioribus, abrupte acutatis, caulinis paucis parum latioribus, erectiusculis; capitulis depresso hemisphaericis, radiatis, transversim (inclusis radiis) $\frac{3}{4}$ –1½ poll. latis; spiculis aureo-flavis; squamis floriferis centralibus (discum formantibus) abbreviatis, densissime congestis, erectiusculis, cylindraceis; periphericis elongatis, ligulæformibus, stellatis

* "Four to nine inches high; growing like *white daisies*, in rather moist places. Alt. 3900 ft., 5° 26' S. Uncommon." (Capt. Grant, apud Spoke, l. c.) Eodem modo et ego formam hanc elegantissimam jam 1858 in Apont. l. c. cum *Belldie perensis* comparavi.

patentibus, compressis, subtus obtuse carinatis, supra secundum medium elevatum costatis, illas disci duplo triplove excedentibus, omnibus nitidulis apiceque obtusiusculis vel abrupte subulatis; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi $\frac{1}{2}$ lin. longa, elongato-obovoidea vel claviformi, obtuse trigona, minutim apiculata, basi, angulis evanidis, in stipitem brevissimum cylindricum attenuata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo interioribus pratis palustribus juxta ripas fluminis Cuije, inter Quibinda et Quitage, una cum *Striga*, *Scleria*, atque *Commelynearum* speciebus socialis; ad fin. Martii c. fl. et fr. lecta. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1669.

Antralepis anthemiflora, Welw. l. c.

Cespites angusti, laxo coherentes. Culmi pro ipsorum longitudine admodum graciles, obsolete angulati, tenuissime striati, infra capitulum parum vel vix incrassati, sat debiles sed constanter erecti. *Folia* basilaria fere capillaria, 4-7 poll. longa, sed in planta florente non raro jam emarcida; caulina paullo supra basim culmi 2-3, inferiora breviovaginata, superius culmum ad 2-2 $\frac{1}{2}$ poll. altitudinem laxiuscule vaginatus, vagina striato-sulcata, sensim in laminam linearem angustata. *Involueri* foliola circiter 10; exteriora basi dilatata, margine lato-membranaceo undulata, lacinis inferiorum 2 vel 3 sub plena anthesi reflexis, anguste lineari-lanceolatis, apice obtusiusculis; infimo 2-3 poll. longo. *Capitula* constanter aureo-flava, disco valde depresso, circumcirca longe denseque radiata, *Anthemidium* quarundam calathia eximie simulantia. *Squamae* floriferae centrales 1-2 lin. longae, densissime in discum leviter convexum vel subtruncatum congestae; periphericae, i. e. capituli discum circumcurrentes, 4-6 lin. longae, horizontaliter expansae, rigidulae, turgidulae sed compressae, semilineam latae, mox post anthesin (ob carinam et costam nunc magis prominentes) tetragono-prismaticae, fructiferae fuscescentes; squamae vacuae lineari-lanceolatae vel lineares, sensim longe acuminatae, floriferis tamen semper breviores. *Caryopsis* quam in *Ascol. protea* parum crassior sed longior, angulis apicem et basim versus evanidis vel obscuris, ima basi cylindricae-attenuata transverse truncata, quasi substipitata.

Species, primo aspectu, capitulorum figura admodum singularis nec non caryopsis configuratione ab *Ascolepide protea* discrepans, ceteris autem characteribus hujusce varietati γ satis affinis et forsitan non nisi ejusdem forma serotina, in solo ditiori et humidiori exorta. Anne *Ascolepidi proteae* qua varietas δ . *anthemiflora* subscribenda?

\S 2. *Rhizoma repens, indurescens*; caryopsis $\frac{1}{2}$ -1 lineam longa, vertice angustato truncata.

3. *ASCOLEPIS SPECIOSA*, Welw. n. sp. (Tab. XXIV. fig. 1-8.) *A.* culmis subpedalibus, firmis, lineam crassis, basi elongato-conicis, vaginis foliorum emortuorum dense vestitis; foliis ad basim culmi pluribus, erecto-vel arcuato-patulis, linearibus, culmo vix angustioribus, apice planis, obtusiusculis, minutim denticulatis, rigidulis; capitulis depresso globosis, densissimis, transversim $\frac{3}{4}$ -1 poll. latis; spiculis intense sulphureis, verniceo-nitentibus; squamis floriferis lanceolatis, a medio apicem versus cylindraccis vel subulato-attenuatis, obtusis rariusve acutiusculis, singulis a capituli peripheria centrum versus sensim brevioribus; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi lineam longa, elongato-obovoidea, manifeste trigona, vertice angustato transversim truncata.

Habitat in Distr. Huilla pascuis breve herbis humidiusculis prope Loopollo ad 5000 ped. altit., in *Lythraecarum*, *Daphnoidicarum* humilium et *Cyperis* plurium specierum fidei societate. A fine Januarii usque ad Martium florens mox demum fructificat. *Exsic.* Welw. Iter Angol. no. 1674.

Cespites lati, densissimi. *Culmi* sub plena anthesi plerumque pedales vel paullo altiores, basi succulenta conico-tumida vaginis foliorum tam vigentium quam emaridorum et externe insuper squamis elongatis, profunde plurisulcatis, fusco-purpurascens vestiti, arete inter se coherentes, fibris tenacibus stipati, rhizomati oblique descendenti demum indurescenti fasciculatim insidentes, quam in ceteris speciebus multo crassiores et rigidiores, evidenter plurisulcati, infra capitula parum vel vix inerassati. *Folia* culmorum sterilium fertiliumque plura, 3-7, gregata, inaequilonga, e viridi glaucescentia, fere carnosula, juniora erecta, adultiora modice arcuato-patula; vaginæ parum supra terram exsertæ, ad oram membranaceam plus minusve undulata, longitudinaliter sulcata, sensim in laminam linearem culmo vix angustiorē sed plicatam, obtuse carinatam, obiter striatam, superne explanatam, marginæ et (in primis prope apicem obtusiusculum vel abrupte acutatum) anguste hyalinam et remote spinuloso-denticulatam abientes. *Involucri* foliola 12-15, foliis vix latiora sed acutiora, longitudine inter se admodum varia, exteriora 4-7 reflexa, infimum ad 2-3 poll. longum; interiora sensim breviora et basi angustiora vel omnino ad vaginam reducta, squamiformia. *Capitula* pro more generis sat ampla, bene evoluta pollice paullo latiora et fere semipollicem alta, primum omnino læte sulphurea, demum oh spicula exteriores præcocius fructificantes tumque fulvescentes bicoloria, centro nempe nunc dilutius flava, marginæ lato aureo-fulvo cineta, pro stirpe *Cyperacea* ræpse speciosa. *Squamæ* vacuæ lineares vel lineari-lanceolatae, nervo crassiusculo, dorso obiter prominente, percursæ, inferne hyalino-membranaceæ, apicem versus longe acuminatæ vel subulate, ibidemque coloratæ, fertilibus fere dimidio breviores; squamæ floriferæ verniceo-nitidulæ, circumscriptione lanceolatae, exteriores 4-4½ lin. longæ, fere usque ad medium rimula hiantæ apertæ, dorso, in primis prope basin, versus pluribus tenuibus percursæ, supra rimulam in appendicem cylindraceam obtusam vel acutius subulatam protractæ. *Orarii* quam squama florifera multo brevioris anguli superne acutiores; stylus basi aequalis, longitudine varius; stigmata obtusa. *Caryopsis* fusco-atra, circiter 1 lin. longa, angulis omnibus a basi ad apicem usque manifestis, subcostatis, vertice horizontaliter, basi attenuata oblique truncata, lateribus densissime seriatim foveolata.

Species omnium cognitarum robustissima, in *Cyperacearum* cohorte facile elegantissima, habitu quasi *Armeriam* capitulis sulphureis ornatam representans, sicque una cum præcedente futura Adonistarum attentione non omnino indigna, a reliquis speciebus præter notas allatas simul majore rigiditate partium omnium discrepans, territorio Huillensi peculiaris videtur, nec ibidem infra 6000 ped. altit. a me visa.

4. *ASCOLEPIS ELATA*, Welw. n. sp. *A.* culmis subbipedalibus, vix $\frac{3}{4}$ lin. crassis, basi parum tumida vaginis crebris foliorum emaridorum laxè vestitis; foliis propriis et iis turionum fasciculatis, circa caulium basin congestis, erectis, 6-9 poll. longis, subfiliformibus, culmo duplo triplove angustioribus, apice planiusculo subacutis tenuiterque denticulatis, supremo patulo ceteris latiore; capitulis hemisphaericis, subdensis, transversim 8-10 lin. latis; spiculis sordide albidis, vix nitidulis; squamis floriferis lanceolatis, a medio apicem versus longe sensimque attenuatis, compressæ tetragonis, longitudine, centralibus exceptis, inter se subæqualibus, acutiusculis; staminibus 3; stylo trifido; caryopsi $\frac{3}{4}$ lin. longa, elongato-obovoidea, manifeste trigona, vertice parum angustato truncata.

Habitat in Distr. Pungo Andongo pratis paludosis juxta dextram ripam fluminis Cuanza, inter Condo et Quisondo ad 3600 ped. æreum altit., in *Xyridearum*, *Droseræ indicæ* et *Eriopermi* specierum consortio. Ad finem Martii c. fl. et fr. lecta, sed rarius obvia.

Antrolepis elata, Welw. l. c.

Rhizoma omnino antecessit speciei; *culmi* autem fere duplo altiores, nec non angustiores, obtusauguli,

tenuiter sulcati, basi vix succulenti, sed vaginis emarcidis numerosis, profunde sulcatis, exterioribus in fibras setiformes solutis, vestiti. *Folia* pallide viridia, culmo multo tenuiora, angustissime linearia, concava vel plicata, dorso sulculata sed vix carinata, apicem versus plana, hyalino-marginata et denticulata. *Involueri* foliola foliis saltem duplo latiora, reflexorum infimum ad 3 poll. longum. *Capitula* quam in ceteris speciebus evidenter laxiora; spiculæ quoad longitudinem inter se parum variantes, 3-4 lin. longæ, maxime centrales tamen semper breviores. *Squamæ* fertiles ad rimulæ florigeræ altitudinem usque biconvexæ, supra rimulam plus minusve evidenter tetragone, angulis lateralibus acutioribus, omnibus in squama fructifera vel collapsa magis prominentibus; squamæ vacuæ uniuersæ, nervo excurrente acute subulatæ. *Caryopsis* griseo-fuscescens, lateribus sub lente forti densissime foveolata.

Species foliis filiformibus capitulorumque figura et colore ad *Ascolepidem proteam* *β. bellidifloram* accedens, rhizomatibus indole autem nec non caryopsis configuratione *Asc. speciosa* magis affinis sed a me non nisi in paucis speciminibus iisque jam fere desolatis observata et proinde in posterum secundum specimina numerosiora in diversis habitationibus et evolutionis periodis lecta accuratius definienda.

Species inquirendæ vel recognoscendæ.

1. KYLLINGIA MICROCEPHALA, Steud. in Plant. Schimp. Exsicc. Abyss. ii. no. 650 (nec Liebm.), sive *Isolepis Kyllingioides*, A. Rich. Tent. Abyss. i. pag. 502. Secundum cl. Rich. l. c. *Ascolepidi eriocauloidi* affinis, ast cel. auctor squamas floriferas planas, stamina tria, caryopsis apice acutam et folia culmum æquantia vel superantia describit. Anne *Ascolepidis* species distincta vel forsitan *Ascolepidis proteæ* supra descriptæ varietas?
 2. ISOLEPIS POLYPHYLLA, A. Rich. l. c. p. 503. Species una cum priore in Abyssinia provincia Chiré lecta, a cl. auctore non nisi in statu fructifero visa et breviter descripta et quidem *Ascolepidi eriocauloidi* proxima habita, sed ex diagnosi nimis brevi vix rite eruenda. Etiam hujus speciei squamam fertilem planam et caryopsis obovatam, non angulatam sed acuminatam dicit cl. auctor.
- Ambarum stirpium specimina sicca videre nondum licuit.

Ordo GRAMINEÆ.

Trib. IV. STIPACEÆ, Kunth, Gram. 57.

1. ARISTIDA PRODIGIOSA, Welw. n. sp. (Tab. XXV.) Cæspitosa, plurennis, gracilis; culmo glabro 1-3-pedali, nodis coloratis imberbibus; foliis radicalibus angustissimis, sub-4-pollinaribus, glaucis, sub lente scabrido-puberulis, ligulis brevissimis ciliatis; panicula lineari-oblonga, multiflora, $\frac{1}{2}$ -1-pedali, ramis 2-5 fasciculatis fere a basi floriferis, spiculis plures, sub 3, lineares, pedicellatas gerentibus; glumæ subæquales acutæ, hirsutæ vel glabratae, basi violaceo-coloratae, ad infimum basim trinerves; flosculus, decepta arista, glumarum dimidium vix æquans, glaber; arista circumscisse decidua, stipite $1\frac{1}{2}$ lin. longo, vix torto, glabro, conico, intus cavo, setis lateralibus nudis, intermedia basi nuda, a medio ad apicem usque plumoso-pennata, laterales duplo et ultra superante.

Habitat frequens in collinis arenosis siccissimis Distr. Mossamedes, ex Giraúl usque ad Cabo negro, imprimis

locis sabulosis oceano proximis, v. gr. ad "Praia da Amelia," denso agmine crescens, per totum fere annum florens et fructificans (Junio, Julio et Septb. 1859 legi). *Ezic.* Welw. Iter Angol. no. 2000.

Rhizoma abbreviatum, mox in fibras descendentes solutum; fibre perplures, elongatae, cylindraceae, simplices, pennae corvine crassiores, villo albedo, velutino, viscido undique obiectae et subsucculentae. Caespites pro soli et expositionis ratione nunc angusti et depressi, pauciculmes, nunc ampliores et altiores, culmos 8-10 et plures emittentes. *Folia* radicalia dense congesta, in macrioribus arcuato-ascendens, 1-2-pollicaria, in robustioribus erectiuscula, 3-5 pollices longa, angustissima, arcte plicata sive convoluta, subulatum acuminata, rigidula, cinereo-glauescentia, sub lente sulcato-striata et subtiliter scabrido-puberula, successive evoluta atque longe perennantia. *Culmi* simplices, a basi ascendent erecti, inferne nodosi, nunc 1-1½-pedales, gracillimi et debiles, nunc (in solo humidiusculo vel minus sterili) 2-3-pedales, pennae corvine fere crassitudine et firmiori, parce foliosi; nodi 2-4, constricti, glabri, fusco-purpurascens, 1-3 pollices inter se distantes; folia culmi radicalibus quoad figuram et indumentum similia, sed longe vaginata; vaginae glaucescentes, tenuiter puberulae, ad oram pilis albidis fasciculatis prompte deciduis barbulae, medio parvi tumentes, inferiores nodos decedentes, suprema longissima, lamina abbreviata, culmum non raro ad panicule basim usque vestiens. *Panicula* erecta, nunc vix 4-pollicaris, laxior et rariflora, sed plerumque elongata, 6-12 pollicaris, densior et multiflora, rachi compresso-angulata glabra, ramis 2-5 fasciculatis levigatis, erecto-patulis, parce ramulosi. *Spicule* graciles, absque arista 3-4 lin. longae, pedicellis gracillimis, ipsis aequilongis vel longioribus, apice incrassatis suffultae. *Glumae* fere aequales, concavae, carinatae, constanter acutae, basi semper, rarius omnino violaceae, dorso undique vel solum juxta carinam hirsutae (nunc peditus glabratae), basi prominenter trinervae. *Palea inferior* coriacea, glaberrima, trinervis; aristae seta intermedia 1-1½ poll. longa, a medio ad apicem pilis hyalinis, tenuissimis, elegantem plumosa, laterales ea dimidio saltem breviores, nuda, divergentes, tenuissime capillares; *palea superior* abbreviata, obtusa, membranacea; *squamulae* integre, acutiusculae, in diversis ejusdem paniculae flosculis diversae magnitudinis, quondam parum evolutae. *Ovarium* oblongo-ovoideum, stipitatum, glabrum, stigmatibus intense flavis, pilis simplicibus hyalinis plumosis, mucro copioso involutis. *Caryopsis* cylindracea, vertice obtuso stylorum rudimentis biapiculata, basin versus obconico-attenuata, longitudine lineam parum excedens, glaberrima, longitudinaliter unisulcata.

Observatio.—Gramen elegans sed sat polymorphum, uti in stirpe sub variis solis et expositionis conditionibus vigente expectandum. Formae hyemales, i. e. a Junio ad Septembris initium florentes, uti et illae in macrioribus et siccioribus obviae, foliis angustioribus et brevioribus nec non varie curvis vel arcuatis, panicula laxiore glumisque basi intensius violaceis et dorso hirsutis gaudent, dum individua mensibus vernis vel in solo minus arido aut juxta rivorum ripas crescentia foliis longioribus, erectiusculis vel leviter arcuatis, paniculis densioribus ac glumis pallidioribus et non raro omnino glabris sese distinguunt; ast glumarum magnitudinem et figuram, earumque inter se et cum flosculo relationem nec non aristae fabricam, in omnibus et quidem numerosis a me examinatis specimenibus semper easdem et constantes observavi. Proxima quidem et affinis hae praesens species videtur *Aristida ciliata* Desf., a qua tamen ex auctoritate acutissimi Agrostologi clar. Guill. Munro, cujus benevolum consilium in stabilienda et definienda hac specie secutus sum, in primis *glumis acutis* differt; ab *Aristida plumosa* Lin., etiam quodammodo affini, praecipue *aristae basi conica intus cava* distinguitur.

Prodigiosam hanc *Aristide* speciem vocavi, quoniam illa, etiamsi ob totius plantae gracilitatem et foliorum culmorumque indumentum cinereo-glauescens, solo arenoso quasi concolor, peregrinatoris oculis facile fugit, nihilo minus multitudini Zebrarum,

Antilopum atque Leporum, in istis desertis ab omni reliqua vegetatione fere penitus denu-
datis vagantium, et imo pecorum domesticorum gregibus, optimum lætumque, et quidem
durante hyemis siccissimo tempore unicum pabulum offert, et ita non minus ac *Acan-*
thosicyos supra descripta desertorum Africae calidae prodigiis adnumerari meretur.

EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA I.

Monodora Angolensis.

- | | |
|---|---|
| Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat. | Fig. 5. Ovarium. |
| 2. Flos, demto petalis exterioribus; paullo auct. | 6. Idem transverse sectum; auct. |
| 3. Stamen a latere, et | 7. Fructus; magn. nat. |
| 4. a fronte visum; auct. | 8. Semen; magn. nat. |
| | 9. Idem verticaliter sectum; paullo auctum. |

TABULA II.

Alsodeia (Ceranthera) ilicifolia.

- | | |
|--|--|
| Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat. | Fig. 9. Semina; magn. nat. |
| 2. Flos; auct. | 10. Semen testæ parte demta, albumen exhi-
bens; auct. |
| 3. Idem, demto calyce, a latere visus; auct. | 11. Albuminis pars, embryonem in situ exhi-
bens; auct. |
| 4. Flos vi apertus a fronte visus; auct. | 12. Embryo a fronte, et |
| 5. Stamina duo a fronte, et | 13. a latere visus; auct. |
| 6. a dorso visa; auct. | |
| 7. Ovarii pars cum stylo; auct. | |
| 8. Ramulus fructifer; magn. nat. | |

TABULA III.

Oncoba Welwitschii.

- | | |
|--|---|
| Fig. 1. Ramus florifer; magn. nat. | Fig. 5. Semina; magn. nat. |
| 2. Pistillum; paul. auct. | 6. Semen; auct. |
| 3. Ovarium transverse sectum; auct. | 7. Idem verticaliter sectum, embryonem ex-
hibens; auct. |
| 4. Ramulus fructifer, magn. nat., fructum
unum (inferiorem) ante, et alterum
(superiorem) post dehiscentiam repre-
sentans. | 8. Embryo, a latere visus; valde auct. |

TABULA IV.

Polygala Gomesiana. Caulis pars inferior et ejusdem apex florifer, magn. nat.

- | | |
|---|--------------------------------|
| Fig. 1. Flos c. bracteolis; auct. | Fig. 7. Stamen; auct. |
| 2. Flos a fronte visus. | 8. Pistillum; auct. |
| 3. Flos sepalis demptis; auct. | 9. Capsula; magn. nat. |
| 4. Idem sepalis et carina demptis; magis
auct. | 10. Eadem; auct. |
| 5. Carina; auct. | 11. Semen; magn. nat. |
| 6. Petalum laterale; auct. | 12. Idem; auct. |
| | 13. Idem a latere visum; auct. |

TABULA V.

Vatica africana.

- | | |
|--|--|
| <p>Fig. 1. Ramulus florifer; magn. nat.
 2. Alabastrum; auct.
 3. Flos expansus; auct.
 4. Stamen a fronte, et
 5. a dorso visum; auct.
 6. Calyx cum pistillo; auct.
 7. Pistillum dempto calyce; magis auct.</p> | <p>Fig. 8. Ovarium transverse sectum; magis auct.
 9. Idem verticaliter sectum; auct.
 10. Calyx fructifer; magn. nat.
 11. Fructus verticaliter sectus; auct.
 12. <i>Vatica africana</i> β. <i>hypoleuca</i>, ramulus
 florifer; magn. nat.</p> |
|--|--|

TABULA VI.

Octolobus spectabilis. Ramus florifer, magn. nat.

- | | |
|---|--|
| <p>Fig. 1. Flos masc. vi apertus; magn. nat.
 2. Flos fem. vi apertus; magn. nat.
 3. Gynæcium verticaliter sectum; auct.
 4. Gynæcii stamen imperfectum, a latere, et
 5. a fronte visum; auct.
 6. Carpellum; auct.
 7. Idem verticaliter sectum.
 8. Carpellum maturum; magn. nat.</p> | <p>Fig. 9. Idem apertum.
 10. Semen; magn. nat.
 11. Idem vertical. sectum, cotyledones exhibens.
 12. Idem cotyledone una dempta, plumulam exhibens.
 13. Plumula cum radícula; auct.</p> |
|---|--|

TABULA VII.

Paivausa dactylophylla.

- | | |
|---|--|
| <p>Fig. 1. Ramul. florib. masc.; magn. nat.
 2. Capitulum florum masc., et
 3. Idem verticaliter sectum; auct.
 4. Flos masc. singulus; valde auct.
 5. Stamen; auct.
 6. Ramulus florib. fem.; magn. nat.
 7. Flos fem.; auct.</p> | <p>Fig. 8. Idem calyce demto.
 9. Ovarium transverse sectum; auct.
 10. Ramus fructifer; magn. nat.
 11. Fructus, necdum bene maturus, verticaliter sectus; paullo auct.
 12. Ejusdem pyrenæ, altera abortiente; magis auct.</p> |
|---|--|

TABULA VIII.

Myrothamnus flabellifolia.

- | | |
|---|--|
| <p>Fig. 1. Ramus florib. masc.; magn. nat.
 2. et 3. Folia a facie et a dorso visa; auct.
 4. Flos. masc.; auct.
 5. Stamen; auct.
 6. Ramulus florib. fem.; magn. nat.
 7. Flores femin.; auct.
 8. Ovarium transverse sectum; auct.</p> | <p>9. Ramulus fructifer; magn. nat.
 10. Capsula matura; auct.
 11. Carpellum singulum seminiferum; auct.
 12. Semen; auct.
 13. Semen verticaliter sectum, albumen et embryonem exhibens; valde auct.</p> |
|---|--|

TABULA IX.

Basananthe nummularia. Planta integra c. flore et fr., magn. nat.

- | | |
|--|--|
| <p>Fig. 1. Folium; paullo auct.
 2. Flos habitu naturali; auct.
 3. Idem arte expansus; auct.
 4. Idem verticaliter sectus; magis auctus.
 5. Corollæ pars, fila seriei internæ appendiculata exhibens; auct.
 6. Eadem pars a facie externa visa.</p> | <p>Fig. 7. Stamen a fronte, et
 8. a dorso visum; auct.
 9. Gynophorum cum pistillo; auct.
 10. Capsula matura; modice auct.
 11. Eadem verticaliter secta; auct.
 12. Semen cum funiculo; pariter auct.</p> |
|--|--|

TABULA X.

Machadoa Huillensis. Planta integra c. flor. et fr., magn. nat.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Flos; parum auct.
 2. Idem vi aperta; magis auct.
 3. Idem dissectus et adhuc magis auct.
 4. Petalum; auct.
 5. Pars annuli staminiferi cum stamine; auct.</p> | <p>Fig. 6. Stamen a dorso visum; auct.
 7. Pistillum; auct.
 8. Ovarium transverse sectum; auct.
 9. Semina a facie et a latere visa; magn. nat.
 10. Semen; auct.
 11. Idem transverse sectum.</p> |
|--|---|

TABULA XI.

Acanthosicyos horrida.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Plantæ modum crescendi exhibens; dimin.
 2. Ramus sterilis, et
 3. Ram. florifer masc.; magn. nat.
 4. Flos masc.; auct.
 5. Idem apertus; auct.
 6. Calyx cum staminibus ab interna facie visis; auct.</p> | <p>Fig. 7. Pars calycis verticaliter dissecti, staminis insertionem illustrans; auct.
 8. Pilus singulus barbæ filamentorum; valde auct.
 9. Planta juvenilis; magn. nat.
 <i>Obs.</i> Hæc ultima figura perperam no. 8. designata.</p> |
|--|---|

TABULA XI. A.

Acanthosicyos horrida.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Ramus fructifer; magn. nat.
 2. Corticis fructus fragmentum; auct.
 3. et 4. Semina; magn. nat.
 5. Semen auctum, a facie, et
 6. a latere visum.</p> | <p>Fig. 7. Semen verticaliter dissectum; auct.
 8. Embryo a facie, et
 9. a latere visus; paullo auct.
 10. Cotyledon a facie interna visa cum plumula et radícula in situ; auct.</p> |
|--|---|

TABULA XII.

Corallocarpus Welwitschii.

- | | |
|---|--|
| <p>Fig. 1. Ramus florifer et simul fructifer; magn. nat.
 2. Flos masc.; auct.
 3. Idem expansus; auct.
 4. Idem arte apertus.
 5. Flos fem.; auct.
 6. Idem apertus.</p> | <p>Fig. 7. Ovarium transv. sectum.
 8. Fructus maturus; magn. nat.
 9. Idem transverse sectus; paullo auct.
 10. Semen; magn. nat.
 11. Idem; auct.
 12. Folium alterius speciminis ejusdem speciei, lobis lineari-angustatis.</p> |
|---|--|

TABULA XIII.

Mussenda splendida. Ramus florifer, magn. nat.

- | | |
|--|---|
| Fig. 1. Floris alabastrum; auct.
2. Corolla arte aperta; auct.
3. Ovarium demptis calycis lobis; auct. | Fig. 4. Idem transverse sectum; magis auct.
5. Fructus maturus; magn. nat. |
|--|---|

TABULA XIV.

Corynanthe paniculata. Ramus florifer, magn. nat.

- | | |
|---|--|
| Fig. 1. Flos nondum apertus, et
2. Idem expansus; auct.
3. Anthera a facie, et
4. a dorso visa; auct.
5. Ovarium, et
6. Idem transverse sectum; auct.
6a. Pars paniculae fructifera; magn. nat.
(N.B. Lit. a in icone omissa.) | Fig. 7. Capsula matura dehiscens; auct.
8. Ejusdem valvarum una, internam faciem
seminumque situm exhibens; auct.
9. Capsula paullo ante dehiscentiam trans-
verse secta; auct.
10. Semen; magn. nat.
11. Idem valde auctum. |
|---|--|

TABULA XV.

Schrebera Goluensis. Ramus florifer, magn. nat.

- | | |
|---|--|
| Fig. 1. Alabastrum; auct.
2. Corolla arte aperta; auct.
3. Stamen a latere, et
4. a facie visum; auct.
5. Pistillum; auct.
6. Ovarium verticaliter sectum; mag. auct.
7. Idem transverse sectum.
8. Capsula matura dehiscens; magnit. nat.
9. Ejusdem valvarum una, seminum situm
exhibens; magn. nat. | Fig. 10. Semen perfectum; magn. nat.
11. Semen abortivum; magn. nat.
12. Seminis pars basilaris, tegmine dempto,
embryonis situm exhibens; magn.
nat.
13. et 14. Embryo a facie et a latere visus;
magn. nat.
15. Ejusdem pars basilaris cum radícula;
auct. |
|---|--|

TABULA XVI.

Pachypodium Lealii.

- | | |
|---|---|
| Fig. 1. Stirpes duae integre, speciei habitum
exhibentes; diminut.
2. Ramus florifer; magnit. nat.
3. Pars rami junioris, superne folium inter
spinis sessile, inferne ejusdem delapsi
cicatricem exhibens; parum auct.
4. Corollae tubus arte apertus; auct. | Fig. 5. Stamen; auct.
6. Calyx cum pistillo; auct.
7. Ramuli fructif. apex, fructus juveniles et
maturus exhibens; magn. nat.
8. Semen; magnit. nat.
9. Embryo a facie et a latere visus; parum
auct. |
|---|---|

TABULA XVII.

Faroa salutaris.

- | | |
|--|--|
| Figs. 1. et 2. Plantae integre florentes diverse
aetatis; magn. nat.
3. Alabastr.; auct.
4. Flos expansus; auct.
5. Idem arte apertus; magis auct. | Fig. 6. Ovarium transverse sectum; auct.
7. Ramus fructifer; magn. nat.
8. Capsula matura dehiscens; auct.
9. Eadem transverse secta; auct.
10. Semen; valde auct. |
|--|--|

TABULA XVIII.

Sesamothamnus Benguellensis.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Imago diminuta speciminis vetustioris floriferi, fruticis habitum illustrans.</p> <p>2. Apex ramuli foliiferi; magn. nat.</p> <p>3. Ramulus florifer; magn. nat.</p> <p>4. Corollæ pars arte aperta, staminum situm exhibens; auct.</p> | <p>Fig. 5. Anthera a latere et a facie visa; auct.</p> <p>6. Calyx cum pistillo; auct.</p> <p>7. Ovarium; auct.</p> <p>8. Ramulus fructifer; magn. nat.</p> <p>9. Semen; magn. nat.</p> |
|--|---|

TABULA XIX.

Alcesia rosamarinifolia. A. Caulis pars cum ramo laterali florifero; magn. nat. B. Eiusdem caulis apex florifer et fructifer; magn. nat.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Flos; auct.</p> <p>2. Idem verticaliter sectus; magis auct.</p> <p>3. Pars superior filamenti cum anthera; auct.</p> <p>4. Calyx verticaliter sectus, gynophorum et pistillum exhibens.</p> | <p>Fig. 5. Calyx fructifer, arte dimidiatus, nuculam perfectam et abortientes exhibens; magn. naturali.</p> <p>6. Nucula singula; magis auct.</p> |
|--|---|

TABULA XX.

Faurca speciosa. Ramus floriger, spicam unam (ad dextram) florentem, alteram (ad sinistram) jam basi fructificantem exhibens; magn. nat.

- | | |
|---|--|
| <p>Fig. 1. Alabastrum et flos apertus; auct.</p> <p>2. Pistillum cum squamulis; auct.</p> | <p>Fig. 3. Ovarium; magis auct.</p> <p>4. Idem verticaliter sectum; itidem auct.</p> |
|---|--|

TABULA XXI.

Hydnora longicollis.

- | | |
|--|--|
| <p>Fig. 1. Pars caulis subterranei cum alabastris diversæ ætatis et flore uno aperto; magn. nat.</p> <p>2. Flos verticaliter sectus, ovarii et staminum situm exhibens.</p> <p>3. Pericarpium submaturum, adhuc perianthio (hoc quidem limbo 4-fido) munitum; magn. nat.</p> | <p>Fig. 4. Pericarpium maturum; parum auct.</p> <p>5. Idem transverse sectum, seminum conglutinatorum globulum exhibens.</p> |
|--|--|

TABULA XXII.

Pilostyles æthiopica.

- | | |
|--|---|
| <p>Fig. 1. Ramulus arboris e Cæsaliptearum tribu (<i>Berlinia paniculata</i>, Benth.), quæ parasitæ matrix, floribus <i>Pilostylis</i> feminis onustus; magn. nat.</p> <p>2. Sectio transversa ejusdem ramuli, parasitæ insertionem et evolutionem successivam illustrans; auct.</p> <p>3. Flos singulus [vel magis propriè specimen singulum] adhuc involuero hiantè munitus; auct.</p> | <p>Fig. 4. Idem magis evolutus, et</p> <p>5. Idem plene evolutus; magis auct.</p> <p>6. Flos bracteis sepalis petalisque demtis, ovarium exhibens; auct.</p> <p>7. Ovarium verticaliter, et</p> <p>8. transverse sectum; auct.</p> <p>9. Ovulum singulum; magis auct.</p> |
|--|---|

TABULA XXII. (*continuatio*).

Fig. 10. Ramus alterius arboris ejusdem *Berliniae paniculate*, floribus *Pilostylis* masculis onustus; magn. nat.

11. Flos masc. verticaliter sectus, columnam stamineam exhibens; auct.

12. Columnae staminis apex floris juvenilis, antheris necdum effctis; auct.

Fig. 13. Flos masculus centro verticaliter sectus, sepalis petaliisque demptis; valde auct.

14. Columna staminea verticaliter secta; adhuc magis auct.

Obs. Petalorum etc. denticuli, nec non tubi staminei costulae a pictore praetervisa.

TABULA XXIII.

Morus excelsa.

Fig. 1. Pars ramuli amenta masc. gerentis; magn. nat.

2. Flos masc. singulus; auct.

3. Ramus amenta feminea submatura gerens; magn. nat.

4. Flos femin.; auct.

Fig. 5. Ovarium adolescens; auct.

6. Achenium c. stylo exsiccato; auct.

7. Idem apertum, semen exhibens; auct.

8. Semen verticaliter sectum, embryonem et albumen parcum illustrans; auct.

9. Embryo; magis auct.

TABULA XXIV.

Asclepias speciosa.

Fig. 1. Planta integra florens; magn. nat.

2. Involucrum cum receptaculo spiculis nudato; quidpiam auct.

3. Spicula squamam florigeram et vacuum exhibens; auct.

Fig. 4. Squama florig. a fronte visa; auct.

5. Pistillum et stamina; magis auct.

6. Caryopses; magn. nat.

7. Caryopsis singula; valde auct.

8. Eadem transverse secta; mag. auct.

Asclepias anthemiflora.

Fig. 9. Capitulum florig.; magn. nat.

10. Spicula singula peripheriae; auct.

11. Spicula singula disci; auct.

Fig. 12. Caryopses; magnit. nat.

13. Caryopsis singula; valde auct.

TABULA XXV.

Aristida prodigiosa.

Fig. 1. Plantae pars inferior, et

2. Culmi pars florifera; magn. nat.

3. Spicula singula juvenilis; auct.

4. Eadem evoluta; magis aucta.

5. Eadem demptis glumis; iterum auct.

5a. [numerus in iconc omissus] Pistillum stamina et squamulae; valde auct.

Fig. 6. Pistillum cum squamulis et palea superiore; valde auct.

7. Squamula singula; v. auct.

8. Palea superior; v. auct.

9. Caryopsis matura; auct.

INDEX SYSTEMATICUS.

	Pag.	Tab.		Pag.	Tab.
ANONACEÆ	10		CACTACEÆ	35	
<i>Monodora Angolensis, Welw.</i>	10	I.	<i>Rhipsalis Cassyta, Gärtn.</i>	35	
<i>Xylopia odoratissima, Welw.</i>	12		RUBIACEÆ	36	
VIOLARIÆ	12		<i>Mussaenda splendida, Welw.</i>	36	XIII.
<i>Alsodeia ilicifolia, Welw.</i>	12	II.	<i>Corynanthe paniculata, Welw.</i>	37	XIV.
BIXACEÆ	13		JASMINACEÆ	38	
<i>Oncoba Welwitschii, Oliv.</i>	13	III.	<i>Schrebera Golumensis, Welw.</i>	40	XV.
POLYGALEÆ	14		<i>— trichoclada, Welw.</i>	41	
<i>Polygala Gomesiana, Welw.</i>	14	IV.	<i>— alata, Welw.</i>	41	
DIPHTEROCARPEÆ	15		<i>— —, β. tomentella</i>	42	
<i>Vatica africana, Welw.</i>	15	V.	APOCYNACEÆ	42	
<i>— —, α. denudans</i>	16	V.	<i>Pachypodium Lealii, Welw.</i>	43	XVI.
<i>— —, β. hypoleuca</i>	17	V.	GENTIANACEÆ	45	
		(fig. 12.)	<i>Faroea salutaris, Welw.</i>	46	XVII.
STERCULIACEÆ	17		<i>Belmontia gracilis, Welw.</i>	47	
<i>Ocoteoba spectabilis, Welw.</i>	18	VI.	<i>Exochlaenium primuleiflorum,</i>		
ZYGOPHYLLÆ	19		<i>Welw.</i>	47	
<i>Zygophyllum orbiculatum,</i>			<i>— —, β. nanum</i>	47	
<i>Welw.</i>	19		<i>— debile, Welw.</i>	48	
BURSERACEÆ	20		<i>— grande, Griseb.</i>	49	
<i>Paivacusa dactylophylla, Welw.</i>	21	VII.	BIGNONIACEÆ	49	
MELIACEÆ	21		<i>Sesamothamnus Benguelensis,</i>		
<i>Naregamia alata, Wight & Arn.,</i>			<i>Welw.</i>	50	XVIII.
<i>β. africana, Welw.</i>	21		<i>Sesamum Angolense, Welw.</i>	51	
HAMAMELIDEÆ	22		<i>— calycinum, Welw.</i>	52	
<i>Myrothamnus flabellifolia,</i>			<i>Pterodiscus aurantiacus, Welw.</i>	53	
<i>Welw.</i>	23	VIII.	<i>Linariopsis prostrata, Welw.</i>	54	
COMBRETACEÆ	24		LABIATÆ	55	
<i>Cucoucia platyptera, Welw.</i>	24		<i>Alvesia rosmarinifolia, Welw.</i>	55	XIX.
<i>Illigera pentaphylla, Welw.</i>	26		<i>Achyropermum æthiopicum,</i>		
PASSIFLOREÆ	27		<i>Welw.</i>	56	
<i>Basananthus litoralis, Peyr.</i>	28		<i>Tinnea antiscorbutica, Welw.</i>	58	
<i>— nummularia, Welw.</i>	28	IX.	<i>— ericalyx, Welw.</i>	59	
<i>Machadonia Huillensis, Welw.</i>	29	X.	POLYGONACEÆ	60	
ŒURBITACEÆ	30		<i>Oxygonum Acetosella, Welw.</i>	60	
<i>Acanthosicyos horrida, Welw.</i>	31	XI. & XI. A.	<i>Brunnichia africana, Welw.</i>	61	
<i>Corallocarpus Welwitschii,</i>			PROTEACEÆ	62	
<i>Hook. f.</i>	32	XII.	<i>Faurea speciosa, Welw.</i>	63	XX.
<i>Heterosicyos polymorpha,</i>			<i>— discolor, Welw.</i>	64	
<i>Welw.</i>	34		<i>— saligna, Harv.</i>	65	
<i>— stenoloba, Welw.</i>	34				

INDEX SYSTEMATICUS (contin.).

	Pag.	Tab.		Pag.	Tab.
RAFFLESACEÆ	66		CYPERACEÆ (continued).		
Hydnora africana, β. longi-			Ascolepis protea, β. bellidi-		
collis, Welw.	66	XXI.	flora	76	
Pilosyles aethiopica, Welw.	67	XXII.	— — — γ. mantolinoides	77	
MORACEÆ	69		— — — anthemiflora, Welw.	77	XXIV. (fig. 9-13.)
Morus excelsa, Welw.	69	XXIII.	— — — speciosa, Welw.	78	XXIV. (fig. 1-8.)
Dorstenia vivipara, Welw.	70		— — — elata, Welw.	79	
— — — Benguellensis, Welw.	71		Ancolepidis, spec. ? (Kyllingia		
— — — psilurus, Welw.	71		microcephala, Steud.)	80	
GNETACEÆ	73		— — — spec. ? (Isoplepis poly-		
Gnetum africanum, Welw.	73		phylla, A. Rich.)	80	
CYPERACEÆ	74		GRAMINEÆ.		
Ascolepis protea, Welw.	75		Aristida prodigiosa, Welw.	80	XXV.
— — —, a. kyllingioides	76				

INDEX ALPHABETICUS.

Obs.—Nomina stirpium descriptarum litteris romanis (ordialia majoribus), synonyma et nomina stirpium in observationibus commemoratarum litteris italicis traduntur.

A.	Pag.		Pag.
Acanthosicyos, Welw.	30	Alsodeieae	12
— — — horrida, Welw.	31	Alvardia spec.	8
Achyropermum aethiopicum, Welw.	56	Alvesia, Welw.	55
— — — densiflorum, Bl.	57	— — — rosmarinifolia, Welw.	55
— — — frutescens, Benth.	57	Ampelideae	30
— — — phlomoideae, Bl.	57	ANONACEÆ	10
Adansonia, L.	35	Anone spec.	17
Adeniopsis, Welw.	43, 45	Antrolepis anthemiflora, Welw.	78
Adenium, R. et Sch.	44, 45	— — — elata, Welw.	79
— — — Honghel, Alph. DC.	45	— — — leucantha, Welw.	77
— — — —, Lindl.	45	— — —, nov. spec., Thomson	77
— — — multiflorum, Klotsch.	44, 45	— — — santolina, Welw.	77
— — — Namaquanum, Wyley	43, 45	— — — sulphurea, Welw.	77
— — — speciosum, Fenzl	44, 45	Apodanthæ	67
Æchmandra conocarpa, Dalz.	33	Apodanthes, Poit.	69
— — — epigea, Arn.	33	APOCYNACEÆ	42, 44
— — — velutina, Dalz.	33	Aristida ciliata, Desf.	81
Alchornea spec.	24	— — — plumosa, L.	81
Alôe arboreascens, Mill.	26	— — — prodigiosa, Welw.	80, 81
Alsodeia ilicifolia, Welw.	12	Arachis hypogæa, L.	6

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
<i>Asclepis anthemiflora</i> , Welw.	77	COMBRETACEÆ	24
— <i>elata</i> , Welw.	79	Combretæ	24
— <i>criocauloides</i> , Nees	75, 80	Commelynacæ	75, 78
— <i>protea</i> , Welw.	75, 78	Corallocarpus, Welw.	32
— —, <i>a.</i> Kyllingioides	76	— Welwitschii, Hook. f.	32
— —, <i>β.</i> bellidiflora	76, 80	Corynanthe, Welw.	37
— —, <i>γ.</i> santalioides	77	— <i>paniculata</i> , Welw.	37
— <i>speciosa</i> , Welw.	78	<i>Cressa</i> , L.	9
<i>Azidas brava</i>	61	CUCURBITACEÆ	6, 30
		Cucurbitæ	30
B.		<i>Cuscuta</i> spec.	38
<i>Balanophoræ</i>	69	CYPERACEÆ	48, 49, 74
Balotæ	55	<i>Cyperus Papyrus</i> , L.	6
<i>Bandeiræa speciosa</i> , Welw.	26	<i>Cyrtandrea</i>	7
<i>Basanranthe</i> , Peyr.	27	<i>Cyrtopera longifolia</i> , Reichb. f.	35
— <i>litoralis</i> , Peyr.	28, 29		
— <i>nummularia</i> , Welw.	28, 29	D.	
Belmontia, E. M.	47, 49	<i>Dalhausia bracteata</i> , Wall.	26
— <i>gracilis</i> , Welw.	47	<i>Daphnoidæ</i>	7, 78
<i>Berlinia paniculata</i> , Benth.	67	<i>Dileniaceæ</i>	30
BIGNONIACEÆ	38, 39, 49	<i>Dissæ</i> spec.	77
<i>Bombax Buonopozense</i> , P. de B.	61	<i>Dombeyæ</i> spec.	42
<i>Brasenia peltata</i> , Pursh	36	<i>Dorstenia Benguelensis</i> , Welw.	71
<i>Brunnichia africana</i> , Welw.	61	— <i>Psilurus</i> , Welw.	71
— <i>cirrhusa</i> , Banks	62	— <i>vivipara</i> , Welw.	70
<i>Brunnichia</i>	61	<i>Drosera indica</i> , L.	79
BURSERACEÆ	20	<i>Droseræ</i> spec.	46, 48
Burseræ	20		
C.		E.	
<i>Cachinde candange</i>	24	Echitæ	42
<i>Cacocua</i> , Aubl. (nec Walp.)	24	<i>Echites succulenta</i> , Thunb.	42
— <i>coccinea</i> , Aubl.	26	<i>Elæodendron glaucum</i> , Pres.	38
— <i>cordifolia</i> , Walp.	24	<i>Elaia guineensis</i> , L.	7
— <i>platyptera</i> , Welw.	24	<i>Enicostema</i> , Bl.	45
— <i>species</i>	35	<i>Ericacæ</i>	7
CACTACEÆ	35	<i>Eriocauloneæ</i>	47, 75
<i>Camoënsia maxima</i> , Welw.	26	<i>Eriospermi</i> spec.	79
<i>Catete Bulla</i>	58	<i>Eucinehoneæ</i>	37, 38
<i>Ceratogonum</i> , Meisn.	9	<i>Euclea</i> , L.	9
<i>Ceranthra ilicifolia</i> , Welw. (conf. corrig.)	19	<i>Eupachypodium</i> , Welw.	43
<i>Chloræ</i>	45	<i>Eupassifloreæ</i>	28
<i>Cinchonæ</i>	37	<i>Eureiandra formosa</i> , Hook. f.	26
<i>Clematidis</i> spec.	30	<i>Eusesamum</i>	51
<i>Ciffortia? flabellifolia</i> , Sond.	22	<i>Exochonium</i> , Griseb.	47, 48, 49
<i>Cula acuminata</i>	35	— <i>debile</i> , Welw.	48
		— <i>grande</i> , Griseb.	48, 49

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

Exochænum primulaeflorum, Welw.	Pag. 47
— —, <i>β. nanum</i>	48

F.

Fabago (Sect. Zygophylli)	19
Faora, Welw.	45
— salutaris, Welw.	46, 47
Fici spec.	17
Faurea, Harv.	62
— discolor, Welw.	64
— saligna, Harv.	62, 63, 65
— speciosa, Welw.	63

G.

GENTIANACEÆ	45
Gentianeæ	45
Gipepe	11
Gloriosa abyssinica, A. Rich.	30
— superba, L.	30
GNETACEÆ	73
Gnetum africanum, Welw.	73
GRAMINEÆ	80
Gyrocarpæ	26

H.

HAMAMELIDÆE	22
Hartogia capensis, Thunb.	38
Heterosicyon, Welw.	30, 33
— polymorpha, Welw.	34, 35
— stenoloba, Welw.	34
Hippia, Speg.	45
Hydnora africana, Thunb. [conf. corrigenda]	67
— —, <i>β. longicollis</i> , Welw.	66
— capensis [conf. corrig.]	67
Hydnoræ	66
Hymenodactylon, Wall.	37
Hypolytræ	74, 75

I.

Illegia pentaphylla, Welw.	26
Illegia spec.	27
Iridæum spec.	7, 34
Isolepis Ascolepis, A. Rich.	75
— Kyllingioides, A. Rich.	76, 80
— polyphylla, A. Rich.	80

J.

JASMINACEÆ	Pag. 38
Jasmineæ	39
Jobo	11
Juncus, L.	9

K.

Kosaria, Hochst.	70, 71
Kyllingia microcephala, Steud.	80
Kyllingia spec.	74

L.

LABIATÆ	55
Labiatarum spec.	7
Lagenias, E. M.	49
Leca sambucina, Willd.	61
Leucospermum, R. Br.	62
Liliacearum spec.	7
Linariopsis, Welw.	53
— prostrata, Welw.	54
Lythracearum spec.	78

M.

Machados, Welw.	29
— Huillensis, Welw.	29
Macrolobii spec.	22
MELIACEÆ	21
Meliacearum spec.	7
Meliceæ	21
Mesembryanthemum, L.	9
Mimosæarum spec.	7
Mitrephoræ	10
M-nara	32
Modecca, Lam.	29
Modeccæ	28
Monodora Angolensis, Welw.	10, 11
— Myriatica, Dun.	10, 11
MOREÆ	69
Morus excelsa, Welw.	69
Mucamba-camba	69
Mussenda (Sect. Bclilla)	36
— erythrophylla, Schum.	37
— splendida, Welw.	36
Myrica spec.	23, 38
Myriatica moschata, L.	11
Myriaticæarum spec.	7

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
Myrothamnus, Welw.	22	Pistia spec.	6
— flabellifolia, Welw.	22, 23	Platylepis, Kunth	74, 75
Myrtacearum spec.	7	Plectranthe	55
N.		Polygala Gomesiana, Welw.	14
Nathusia alata, Hochst.	39, 41	POLYGALÆ	14
Nura	32	POLYGONACEÆ	60
Naras	32	Populi spec.	23
Naregamia alata, W. et Arn., β. africana, Welw.	21	Protea, L.	63
Nauclea, L.	37	PROTEACEÆ	7, 62
N-coca	74	Protea spec.	42
N-pepe	11	Protee	62
Nymphæacearum spec.	6	Protium, Burm.	20
O.		Pterocarpus spec.	22
Ocimeæ	55	Pterodiscus aurantiacus, Welw.	53
Octolobus, Welw.	17	— Gayi, Desm.	53
— spectabilis, Welw.	18	— speciosus, Hook.	53
Oleaceæ	38, 40	R.	
Oncoba Welwitschii, Oliv.	13	RAFFLESIACEÆ	66
Oncobæ	13	Raphia spec.	7
Opuntia	35	Rhipsalis Cassyta, Gürtn.	35
Orchideæ terrestres	7	Rhynchospora, Schrad.	32
Oxygonum Acetosella, Welw.	60	— Welwitschii, Naud.	32
— Dregei, Meisn.	61	Rosaceæ	23
P.		RUBIACEÆ	37
Pachypodium, Lindl.	42, 44, 45	Rubiacearum spec.	7
— bispinosum, Lindl.	45	S.	
— Lealii, Welw.	5, 43, 45	Salicinae	23
— Namaquanum, Welw.	45	Salicis spec.	65
— succulentum, Alph. DC.	45	Santalaceæ	7
— tuberosum, Lindl.	45	Sarna, Karst.	69
Paivacuosa, Welw.	20	Sauwageia erecta, L.	29
— dactylophylla, Welw.	21	Saxifragaceæ	23
Palmae	7	Schousbaa, Schum.	24
Parinariæ spec.	17	— cordifolia, Schum.	24
PASSIFLOREÆ	27, 28, 30	— Willd.	24
Pedaliaceæ	53	Schrebera, L.	38
Pedaliu, L.	54	— Retz.	38
Periloma, H. B. K.	58	Schrebera, Rozb.	38
Persooniæ	62	— alata, Welw.	39, 41
Phaseoli spec.	6	— —, β. tomentella	42
Pharus spinosa, Schum.	8	— Goulungensis, Welw.	39, 40
Pilostyles æthiopica, Welw.	67	— Saundersiæ, Harr.	39, 41
Piper	11	— Swietenoides, Rozb.	39, 42
		— trichoclada, Welw.	39, 41

INDEX ALPHABETICUS (contin.).

	Pag.		Pag.
<i>Schrebera</i> , Thunbg.	38	<i>Trymalococci</i> spec.	61
<i>Scirpea</i>	75	<i>Tryphostemma</i> , Harv.	28
<i>Scleria</i> spec.	49		
Scutellarinae	57, 58	U.	
<i>Sebaya</i> , Soland. (R. Br.)	46, 49	<i>Uncaria</i> , Schreb.	37
— <i>involuta</i> , Klotzsch	47	<i>Utricularia</i> spec.	47
— <i>pusilla</i> , Eckl.	48		
<i>Selagineae</i>	7	V.	
<i>Sesamese</i>	49	<i>Vatica africana</i> , Welw.	15
<i>Sesamothamnus</i> , Welw.	49	— —, α . <i>denudans</i>	16
— <i>Benguellensis</i> , Welw.	5, 50	— —, β . <i>hypoleuca</i>	17
<i>Sesamum Angolense</i> , Welw.	51	<i>Viola</i> , L.	29
— <i>calycinum</i> , Welw.	52, 54	VIOLARIAE	12, 29
<i>Sesuviorum</i> spec.	19	<i>Vitis Bainesii</i> , Hook.	5
<i>Spiraea</i>	23	— <i>macrophylla</i> , Welw.	5
Stachydeae	56	— <i>vinifera</i> , L.	9
STERCULIAE	17	<i>Vogelia africana</i> , Lam.	9, 19
<i>Sterculiae</i>	17		
Stipaceae	80	W.	
<i>Striga</i> spec.	49	<i>Welwitschia mirabilis</i> , Hook. f.	5
<i>Sychnium</i> , Desv.	71		
<i>Symphoniae</i> spec.	17	X.	
<i>Syzygii</i> spec.	35	<i>Xipepe</i>	11
T.		<i>Xylopia odoratissima</i> , Welw.	12
<i>Tarchonanthes</i> spec.	8	<i>Xylopiæ</i> spec.	42
<i>Tetracarpæa Tasmanica</i> , Hook. f.	23	<i>Xylopiæ</i>	12
<i>Tetracera</i> , L.	30	<i>Xyridearum</i> spec.	47, 79
<i>Tinnea</i> , Kotschy et Peyr.	57		
— <i>ethiopica</i> , Kotschy et Peyr.	58	Z.	
— <i>antiscorbutica</i> , Welw.	58	<i>Zea Mays</i> , L.	6
— <i>ericalyx</i> , Welw.	59	ZYGOPHYLLACEAE	19
<i>Trichomeria</i> , Hook. f.	33	<i>Zygophyllum orbiculatum</i> , Welw.	19, 66
<i>Triglochin</i> , L.	8	— <i>simplex</i> , L.	19

ADDENDA VEL CORRIGENDA.

- Pag. 6, lin. 11, loco quos lege quas
 8, 16, loco *xylovica* lege *sylvatica*
 8, 30, loco hibernum lege hiemem
 9, post lin. 33, adde: Quoad generalia de conformatione geognostica terrarum Angolensium conf.
 " *Voyage du Dr. Fr. Welwitsch dans les Royaumes d'Angola et de Benguela.* (Mol-
 lusques par A. Morlet.) Paris, 1885," pag. 5 et 6.
 9, 34, loco vegetabilium lege vegetabilium
 13, ultima, loco postero lege posterum
 14, 10, loco infra lege inferne
 14, 13, loco quidquam lege quidpiam
 15, 4, loco tri- lege tri-
 20, 37, loco *Burseracearum* lege *Burserarum*
 23, 3, loco quidquam lege quidpiam
 23, 12, loco *Spiracearum* lege *Spiricarum*
 23, 23, loco l. c. t. viii. lege Apontam. l. c. (Tab. VIII.)
 24, 40, loco Descr. lege Beskr.
 28, 5, loco *Tryphostemati* lege *Tryphostemati*.
 28, 6, loco *Moleccarum* lege *Moleccarum*.
 31, 4, loco Tab. XI. A et B lege (Tab. XI. et XI. A.)
 31, 44, loco Tab. XI. B. lege Tab. XI. A.
 34, 8, loco *Trideis* lege *Irideis*
 39, 24, loco peridermio lege spermodermio
 42, 23, loco *Xyloper* lege *Xyloper*
 63, 11, adde (*Trichostachya speciosa*, Welw. Synops. explic. pag. 19.)
 67, 9, loco ab *Hydnora capensis* Thunb. lege a stirpe capensi (*Hydnora africana* Thunb.)
 67, 15, loco capensi lege africanae
 Tab. 2, loco *Ceranthra ilicifolia* lege *Alsodeia* (*Ceranthra*) *ilicifolia*
 14, loco 6 (fig. paniculae fructiferae annexo) lege 6a
 21, loco *Hydnora longicollis* Welw. lege: *Hydnora africana* Thunb. β . *longicollis* Welw.


(Nota. De generibus speciebusve paucis, nostris supra descriptis valde affinis vel omnino synonymis, opusculo hocce jam prelo subjecto a variis phytographis in lucem editis, mox alio loco tracturus sum.



W H Fitch, del et lith

J N Fitch, imp

Monodora Angolensis Welw.




W H Fitch, del. et lith.

J N Fitch. imp.

Ceranthera ilicifolia, *Walt.*

Digitized by Google



W. H. Fitch del. et lith.

J. N. Fitch imp.

Oncoba Welwitschu, Olav.





W H Fitch del et lith

J N Fitch mpt

Vatica africana. Walp.




W. H. Fitch, del. et lith.

Octolobus spectabilis, Walp.

J. N. Fish, sculp.


Digitized by Google



W. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, sculp.

Paiverea dactylophylla, *Rehder*



W. Li, R. Chen, and L. Hu

J N Fitch, 1999

Myrothamnus flabellifolia, Welw.


Digitized by Google



W. H. Fitch, del. et lith.

J. H. Fitch, sculp.


Basananthus nummularia, *Walt.*



W H Fitch del et lith.

J N Fitch imp.

Machadocia Huillensis, Wein.



W H Fitch, del et h'ta

J N Pich, imp

Acanthoscyos horrida, Welw.





W H Fitch del et lith

Corallocarpus Welwitschii, Hook. f.

J N Fitch imp

Digitized by Google







W.H. Fish, del. et lith.

Corynanthe paniculata, HBK.

J.N. R. del.

Printed by Google



W. H. Fitch, del. et lith.

J. N. Fitch, imp.

Schrebera coluigensis, *Wilm.*




W H Fitch, del et lith

J N Fitch, map

Pachypodium Lealn, Wels


Digitized by Google





W. E. Fitch, del. et lith.

Sesamothamnus Benguelensis, Walp.



W H Fitch, del et lith

J N Fitch imp


Alvesia rosmarinifolia, Willd.



W. H. Fitch, del. et. lith.

J. N. Fitch, imp.


Faurea speciosa Welw.



W. H. Fitch del et lith

Vincent Brooks Day & Son, Imp.

Hydra longirostris Welw



Fresh flowers

Various flowers of the same tree


Pilostyles aethiopica Melw



W H Fitch del et lith

J N Fitch imp


Morus excelsa, Willd.



W. H. Fitch del et lith.

J. N. Fitch imp.

Ascolepis speciosa, Walp. (f. 1 & 8) | *Ascolepis anthemiflora* Walp. (f. 9, 12.)



W. H. Fitch, del. et sculp.

J. N. Fitch, imp.

Aristida prodigiosa, Welw.



